

Державний вищий навчальний заклад
«Запорізький національний університет»
Міністерства освіти і науки України

С.М. Гребенюк, Є.В. Панасенко, О.О. Тітова

МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ НЕКОРЕКТНИХ ЗАДАЧ

Навчальний посібник
для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
і освітнього рівня «магістр»
спеціальності «Математика»

ЗАТВЕРДЖЕНО
вченою радою ЗНУ
Протокол № 12 від 23.06.2015

Запоріжжя
2015

УДК 51 (076.1)

ББК: В1я73

Г79

Гребенюк С.М. Методи розв'язання некоректних задач: навчальний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і освітнього рівня «магістр» спеціальності «Математика» / С.М. Гребенюк, Є.В. Панасенко, О.О. Тітова. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – 64с.

Навчальний посібник призначений для студентів математичного факультету денної та заочної форм навчання спеціальності «Математика». Він охоплює матеріал одного з основних курсів – методів розв'язання некоректних задач – та має на меті допомогти студентам в оволодінні теоретичним матеріалом та практичними навичками розв'язання задач.

Навчальний посібник містить теоретичні відомості, варіанти індивідуальних завдань із прикладами їх розв'язання, перелік питань до заліку, список рекомендованої літератури. Довідковий матеріал наведено в додатку.

Рецензент *М.І. Клименко*

Відповідальний за випуск *С.М. Гребенюк*

ЗМІСТ

Вступ.....	4
1. Коректно і некоректно поставлені задачі. Методи розв'язання некоректних задач.....	6
1.1. Проблема коректності математичних задач.....	6
1.2. Операторні рівняння.....	9
1.3. Узагальнене поняття розв'язку.....	12
1.4. Псевдорозв'язок матричного рівняння.....	13
1.5. Метод розв'язків на компактах	16
1.6. Метод квазірозв'язків.....	19
1.6.1. Квазірозв'язки матричного рівняння	20
1.6.2. Квазірозв'язки некоректних задач для інтегрального рівняння Фредгольма першого роду.....	21
1.7. Метод регуляризації А.М. Тихонова	24
1.7.1. Метод регуляризації для матричного рівняння.....	24
1.7.2. Метод регуляризації для операторного рівняння.....	27
1.7.3. Особливості застосування методу Тихонова до розв'язання операторних рівнянь	29
1.7.4. Метод регуляризації для інтегрального рівняння Фредгольма першого роду	32
1.8. Некоректні екстремальні задачі	35
Питання до самоперевірки.....	42
2. Індивідуальне завдання.....	43
3. Зразок виконання індивідуального завдання	49
Предметний покажчик	59
Додаток А. Відомості з функціонального аналізу	60
Рекомендована література	62

ВСТУП

Інтуїтивно поняття коректності математичної задачі й потреба у введенні цього поняття в математику були зрозумілі вже досить давно. Однак, лише на межі XIX – XX століть французькому математику Жаку Адамару (франц. *Jacques Salomon Hadamard*) вдалося дати означення коректності математичної задачі, яке стало загальноновживаним.

Ще до 50-х років минулого століття некоректні задачі вважалися не вартими уваги й розглядалися як приклади математичної «аномалії». Панувала думка, що такі задачі не можуть виникати в ході математичного моделювання явищ та процесів. Але серед математичних задач виділяється клас задач, розв'язки яких нестійкі до малих змін вихідних даних. Вони характеризуються тим, що як завгодно малі зміни вихідних даних можуть призвести до довільно великих змін розв'язків. Задачі такого типу, по суті, є погано поставленими. Вони належать до класу некоректно поставлених задач.

Якщо вихідні дані відомі наближено, то згадана нестійкість приводить до практичної неєдиності розв'язків в рамках заданої точності та великих труднощів в з'ясуванні сенсу отриманого наближеного розв'язку. Саме в силу цих особливостей довгий час вважалось, що некоректно поставлені задачі не можуть мати практичного значення. Однак, як з'ясувалось, можна вказати некоректно поставлені задачі, які відносяться як до класичних розділів математики, так і до різноманітних практично важливих прикладних задач. Тому в останні десятиліття минулого століття думки істотно змінилися.

Мета цього навчального посібника – ознайомити студентів спеціальності «Математика», а також усіх зацікавлених фахівців з основними методами розв'язання типових задач з курсу теорії некоректних задач, допомогти їм набутти навичок застосування теоретичного матеріалу в багатьох випадках.

Навчальний посібник створений авторами на основі багаторічного досвіду викладання теорії некоректних задач студентам математичних спеціальностей. Основними завданнями вивчення даної дисципліни є надання студентам знань з теорії некоректних задач, підвищення рівня їх фундаментальної математичної підготовки з посиленням її прикладної спрямованості, а також отримання необхідної математичної бази для проведення сучасних математичних досліджень.

Завдяки вивченню даної дисципліни студент повинен отримати базові знання з теорії некоректних задач; знати: основні типи некоректних задач та методи їх розв'язання, зокрема методи псевдорозв'язків, квазірозв'язків, регуляризації; вміти: застосовувати теоретичні знання для розв'язання конкретних некоректних задач.

У сучасному навчальному процесі для активізації пізнавальної діяльності студентів, формування у них здатності самостійно розв'язувати достатньо складні проблеми, з метою якісного засвоєння курсу теорії некоректних задач, ефективного його застосування в практичній діяльності, кожен студент виконує індивідуальні завдання з обов'язковим контролем їх виконання і виставленням

відповідних балів. Індивідуальні завдання охоплюють задачі курсу. Кожне завдання містить 30 варіантів. Для зручності виконання цих завдань у третьому розділі навчального посібника наведено достатню кількість різноманітних задач з їх детальними розв'язаннями та теоретичними обґрунтуваннями.

Автори сподіваються, що даний навчальний посібник стане корисним студентам, які прагнуть отримати знання з некоректних задач, а також викладачам для проведення занять та організації самостійної роботи студентів.

1. КОРЕКТНО І НЕКОРЕКТНО ПОСТАВЛЕНІ ЗАДАЧІ. МЕТОДИ РОЗВ'ЯЗАННЯ НЕКОРЕКТНИХ ЗАДАЧ

1.1. Проблема коректності математичних задач

Розв'язання будь-якої кількісної задачі зазвичай полягає в знаходженні розв'язку z по заданим вихідним даним u :

$$z = R(u) \quad (1.1)$$

Будемо вважати їх елементами метричних просторів F і U з відстанями між елементами

$$\rho_F(z_1, z_2), \rho_U(u_1, u_2), z_1, z_2 \in F, u_1, u_2 \in U.$$

Метрики зазвичай визначають постановкою задачі.

Нехай визначено поняття розв'язку і кожному елементу $u \in U$ відповідає єдиний розв'язок $z = R(u)$ із простору F .

Означення 1.1. Задачу знаходження розв'язку $z = R(u)$ із простору F за вихідними даними $u \in U$ називають *стійкою на просторах F і U* , якщо для будь-якого числа $\varepsilon > 0$ можна вказати таке число $\delta(\varepsilon) > 0$, що із нерівності

$$\rho_U(u_1, u_2) < \delta(\varepsilon)$$

випливає нерівність $\rho_F(z_1, z_2) < \varepsilon$, де $z_1 = R(u_1)$, $z_2 = R(u_2)$, $z_1, z_2 \in F$, $u_1, u_2 \in U$.

Означення 1.2. Задачу знаходження розв'язку z із простору F за вихідними даними u із простору U будемо називати *коректно поставленою (за Адамаром)* на парі метричних просторів F і U , якщо виконуються умови [13, 16]:

- 1) для будь-якого елемента $u \in U$ існує розв'язок $z \in F$;
- 2) розв'язок z визначено однозначно;
- 3) задача є стійкою на просторах F і U .

Зауважимо, що в математичній літературі довгий час існувала точка зору, згідно якої будь-яка математична задача повинна задовольняти цим вимогам.

Означення 1.3. Задачі, які не задовольняють переліченим умовам (хоча б одній), будемо називати *некоректно поставленими* [13, 16].

Слід відмітити, що означення некоректно поставлених задач відноситься лише до даної пари метричних просторів F і U , оскільки в інших метриках та сама задача може бути коректно поставленою.

Якщо клас U вихідних даних вибрано природно для задачі то умови 1) і 2) характеризують математичну визначеність. Умова 3) має зв'язок з фізичною детермінованістю задачі, а також із можливістю застосування числових методів її розв'язання по наближеним вихідним даним.

Розв'язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР) завжди є однією із актуальних задач обчислювальної математики. Важливими є дослідження методів, пов'язаних із виникненням, аналізом та розв'язуванням погано обумовлених СЛАР.

При розв'язуванні СЛАР дуже часто трапляється, що малі похибки правих частин чи заданих коефіцієнтів призводять до великих похибок у розв'язках. Похибки можуть виникати під час вимірювання, обчислення чи заокруглення елементів матриць систем або правих частин. Такі СЛАР називаються *некоректно поставленими*, або *погано обумовленими*.

Отже, погано обумовленою може бути не сама задача, а лише алгоритм, вибраний для її розв'язування. Якщо обчислений розв'язок суттєво відрізняється від точного внаслідок виконання числового алгоритму, то такий алгоритм називають нестійким.

Розглянемо приклади некоректних задач.

Приклад 1.1. Розглянемо систему лінійних алгебраїчних рівнянь

$$Az = u, \quad (1.2)$$

де z – шуканий вектор, u – відомий вектор, $A = (a_{ij})_{n \times n}$ – квадратна матриця.

Якщо система (1.2) невироджена, то вона має єдиний розв'язок, який можна знайти за відомими формулами Крамера або іншими способами. Звідси випливає неперервна залежність розв'язку від правої частини.

Якщо система (1.2) вироджена, то вона має розв'язок (причому не єдиний) лише при виконанні умови сумісності, яка складається із рівності нулю відповідних визначників.

Таким чином, перш ніж розв'язати систему (1.2), треба перевірити, вироджена вона чи ні. Для цього потрібно обчислити визначник системи.

З якою б ми точністю не проводили обчислення $\det A$, при достатньо великому значенні n (порядку системи), внаслідок накопичення помилок обчислення, ми можемо отримати значення $\det A$, яке буде як завгодно відрізнятися від точного. Тому бажано мати такі алгоритми знаходження розв'язку системи (1.2), які не потребують попереднього з'ясування виродженості або невиродженості системи (1.2).

У практичних задачах часто права частина u та елементи матриці A , тобто коефіцієнти системи рівнянь (1.2), відомі нам наближено. В таких випадках замість системи (1.2) маємо справу з деякою іншою системою $A\tilde{z} = \tilde{u}$ такою, що $\|\tilde{A} - A\| \leq h$, $\|\tilde{u} - u\| \leq \delta$, де зміст норм зазвичай визначається характером задачі. Маючи замість матриці A матрицю $\tilde{A}$, ми тим більше не можемо висловити певного судження про виродженість або невиродженість системи (1.2).

У таких випадках про точну систему $Az = u$ відомо лише те, що для матриці A та правої частини u виконуються нерівності $\|\tilde{A} - A\| \leq h$ та $\|\tilde{u} - u\| \leq \delta$. Але систем з такими вихідними даними нескінченно багато, і при відомій похибці вони не чіткі.

Оскільки замість точної системи (1.2) маємо наближену систему $A\tilde{z} = \tilde{u}$, то мова може йти лише про знаходження наближеного розв'язку. Але наближена система може бути і нерозв'язною. Виникає питання: що треба розуміти під наближеним розв'язком системи? Він повинен бути також стійким

до малих змін вихідних даних. Чи буде одержаний наближений розв'язок розв'язком некоректної задачі [13].

Розглянемо систему (1.2) наступного вигляду:

$$\begin{cases} x_1 + 1,001x_2 = 2; \\ x_1 + x_2 = 2. \end{cases} \quad (1.3)$$

Очевидно, що система (1.3) має розв'язок $x_1 = 2$ і $x_2 = 0$. Нехай тепер права частина першого рівняння системи (1.3) обчислена з відносною похибкою 0,05% і дорівнює 2,001, тобто замість системи (1.3) одержимо систему

$$\begin{cases} x_1 + 1,001x_2 = 2,001; \\ x_1 + x_2 = 2, \end{cases}$$

яка має розв'язок $x_1 = 1$ і $x_2 = 1$.

Нарешті, нехай права частина першого рівняння дорівнює 1,999 (відносна похибка – 0,05%). Тоді відповідна система

$$\begin{cases} x_1 + 1,001x_2 = 1,999; \\ x_1 + x_2 = 2 \end{cases}$$

має розв'язок $x_1 = 3$ і $x_2 = -1$.

Отже, в розглянутих системах лінійних алгебраїчних рівнянь лише праві частини мають відмінність в межах відносної похибки 0,05%, однак розв'язки систем відрізняються досить істотно. Це означає, що задача розв'язання системи (1.3) є некоректною з погляду третьої умови Адамара.

З'ясуємо джерело такої некоректності. Знайдемо визначник матриці системи:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1,001 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -0,001.$$

Як бачимо, визначник системи близький до нуля, тобто матриця системи є майже виродженою. Звичайно, цей приклад системи другого порядку є штучний. Однак, із зростанням порядку системи кількість ситуацій, за яких визначник наближається до нуля, стає набагато більшою, причому джерело таких некоректних систем становлять цілком реальні та практично важливі проблеми.

Проаналізуємо одну з задач (приклад Адамара: задача Коші для рівняння Лапласа) для рівняння з частинними похідними, запропоновану Ж.Адамаром для ілюстрації некоректності за третьою умовою.

Приклад 1.2. Розглянемо задачу знаходження функції $u(x, y)$, гармонічної на всій площині, тобто

$$\Delta u(x, y) \equiv 0,$$

якщо задані значення $u(x, y) = f(x)$ цієї функції та її похідної

$$\left. \frac{\partial u(x, y)}{\partial y} \right|_{y=0} = \varphi(x)$$

на осі абсцис.

Для спрощення аналізу вважатимемо, що $f(x) \equiv 0$.

Нехай функція $\varphi(x)$ має вигляд

$$\varphi(x) \equiv \varphi_\varepsilon(x) = \varepsilon \sin \frac{x}{\varepsilon}.$$

Переконаємося, що функція

$$u_\varepsilon(x, y) = \varepsilon^2 \sin \frac{x}{\varepsilon} \operatorname{sh} \frac{y}{\varepsilon}$$

буде розв'язком сформульованої задачі Коші за будь-яких значень ε . Справді, маємо

$$\frac{\partial^2 u_\varepsilon}{\partial x^2} = -\sin \frac{x}{\varepsilon} \operatorname{sh} \frac{y}{\varepsilon}; \quad \frac{\partial^2 u_\varepsilon}{\partial y^2} = \sin \frac{x}{\varepsilon} \operatorname{sh} \frac{y}{\varepsilon};$$

$$\Delta u_\varepsilon = \frac{\partial^2 u_\varepsilon}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u_\varepsilon}{\partial y^2} = 0.$$

Також очевидно, що

$$u_\varepsilon(x, 0) \equiv 0, \quad \left. \frac{\partial u_\varepsilon}{\partial y} \right|_{y=0} = \varepsilon \sin \frac{x}{\varepsilon} \operatorname{ch} \frac{y}{\varepsilon} \Big|_{y=0} = \varepsilon \sin \frac{x}{\varepsilon}.$$

Розглянемо тепер поведінку цих функцій при $\varepsilon \rightarrow 0$:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \varphi_\varepsilon(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \varepsilon \sin \frac{x}{\varepsilon} = 0.$$

Це означає, що при малих ε функція $\varphi_\varepsilon(x)$ мало відрізняється від нуля. Водночас при $\varphi(x)$ розв'язок сформульованої задачі такий:

$$u(x, y) \equiv 0.$$

Слід було б чекати, що тоді й $u_\varepsilon(x, y)$ за малих ε також буде набувати значень, близьких до нуля. Однак для $x \neq k\pi$ одержано

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \varepsilon^2 \sin \frac{x}{\varepsilon} \operatorname{sh} \frac{y}{\varepsilon} = \infty,$$

тобто малим змінам у значеннях функції $\varphi(x)$ відповідають великі зміни в розв'язку задачі. Отже, ця задача Коші є некоректною в сенсі третьої умови Адамара.

1.2. Операторні рівняння

Більшість математичних моделей розв'язання природознавчих задач будують за допомогою термінів, означень теорії функціонального аналізу.

Розглянемо рівняння вигляду:

$$Az = u, \tag{1.4}$$

де A – оператор, який діє з метричного простору F в метричний простір U , до того ж $u \in U$, $z \in F$. Припустимо, що існує обернений оператор A^{-1} , але він не є цілком неперервним.

Означення 1.4. Рівняння (1.4) з оператором A , який має вище вказані властивості, будемо називати *операторним рівнянням першого роду* [13]. Задачі розв’язання таких рівнянь, як правило, некоректні.

Означення 1.5. Операторне рівняння вигляду

$$z - Az = u,$$

де припущення стосовно просторів і елементів аналогічні, будемо називати *операторним рівнянням другого роду*. Задачі розв’язання таких рівнянь, як правило, коректні.

У загальному випадку:

$$\alpha z - Az = u \quad (1.5)$$

є загальним операторним рівнянням і задача його розв’язання буде коректною, якщо α не є власним значенням оператора A .

Операторні рівняння можуть мати різноманітний вигляд, тому доцільно їх класифікувати по виду оператора A . Розрізняють наступні рівняння:

1) Якщо оператор A представлений у вигляді матриці, а простори F та U – лінійні векторні простори, то рівняння називають *матричними рівняннями*. Коректність задачі залежить в більшості випадків від вибору матриці A та правої частини рівняння (дивись приклад 1.1).

2) Якщо F та U – простори неперервних на відрізку функцій, а оператор A має вигляд інтегрального оператора, тоді рівняння називають *інтегральним рівнянням*. Зокрема, найчастіше розглядають інтегральні рівняння наступного вигляду:

$$\int_a^b k(x, s)z(s)ds = u(x) - \text{інтегральне рівняння Фредгольма першого роду};$$

$$z(x) + \int_a^b k(x, s)z(s)ds = u(x) - \text{інтегральне рівняння Фредгольма другого}$$

роду;

$$\int_a^x k(x, s)z(s)ds = u(x) - \text{інтегральне рівняння Вольтера першого роду};$$

$$z(x) + \int_a^x k(x, s)z(s)ds = u(x) - \text{інтегральне рівняння Вольтера другого роду}.$$

Більш простими є рівняння другого роду. Для їх розв’язання використовують ітераційні методи, розвинення в ряди тощо. Інтегральні рівняння другого роду приводять до коректних задач, а рівняння першого роду є більш складними і приводять до некоректних задач. Зауважимо, що в залежності від просторів, в яких розглядають задачу, і від умов гладкості ядра $k(x, s)$ і правої частини $u(x)$ одне і те саме рівняння може приводити як до коректної, так і до некоректної задачі.

Ще наприкінці XIX століття шведський математик Івар Фредгольм звернув увагу на деякий клас лінійних інтегральних рівнянь і одержав перші глибокі результати з їх аналізу. У подальшому інтегральні рівняння привернули увагу найвизначніших математиків світу, і за короткий час була створена теорія лінійних інтегральних рівнянь, які одержали назву Фредгольма. Незабаром ця теорія набула значного поширення в різних галузях науки та техніки.

Приклад 1.3. Розглянемо інтегральне рівняння Фредгольма першого роду:

$$\int_a^b k(x, s)z(s)ds = u(x). \quad (1.6)$$

Нехай $u \in U$, $z \in F$ і нехай $k(x, s)$ – неперервне за змінним x та s , а також має неперервні частинні похідні за цими змінним. Нехай простори $U = C[a; b]$ і $F = C[a; b]$ – простори неперервних на відрізку $[a; b]$ функцій. Задача знаходження елемента u за елементом z при таких положеннях буде коректною.

Доведення. $\triangleright$ Дійсно $\forall z \in C[a; b]$ по формулі (1.6) інтеграл існує і є неперервною функцією по змінній x , ця функція визначена однозначно. Таким чином умови коректності 1) і 2) в означенні 1.2 виконано. Доведемо умову 3).

Нехай $k_1 = \max_{\substack{x \in [c, d] \\ s \in [a, b]}} |k(x, s)|$, $u_1(x)$ і $u_2(x)$ – деякі функції із простору $C[c; d]$,

що відповідають елементам $z_1(x)$ і $z_2(x)$ із простору $C[a; b]$. Тоді

$$\|u_1 - u_2\|_{C[c, d]} \leq k_1 \|b - a\| \|z_1 - z_2\|_{C[a, b]}.$$

Із означення норми маємо доведення умови 3). $\blacktriangleleft$

Розглянемо обернену задачу, тобто задачу знаходження елемента z за елементом u . Така задача буде некоректною.

Доведення. $\triangleright$ Розглянемо першу умову коректності. Розв'язок оберненої задачі існує не для усіх правих частин. Нехай $u(x)$ – неперервна функція, тоді існує $u(x) \in C[c, d]$, яка не є диференційованою функцією. Оскільки розв'язок z шукаємо в класі неперервних функцій, то в результаті підстановки z в ліву частину рівняння (1.6) ліворуч одержуємо диференційовану функцію. Отримали протиріччя – ліворуч і неперервна і диференційована функція, а праворуч неперервна. При перевірці умови 3) в просторі F виберемо послідовність $z_n = z_0 + n \sin(n^2 s)$, підставляємо z_n в ліву частину рівності (1.6), одержимо $u_n(x)$

$$u_n(x) = \int_a^b k(x, s)z_n(s)ds = \int_a^b k(x, s)(z_0 + n \sin(n^2 s))ds.$$

Оцінимо модуль різниці

$$|u_n(x) - u_0(x)| = \left| \int_a^b k(x, s)(z_0 + n \sin(n^2 s))ds - \int_a^b z_0 k(x, s)ds \right| \leq \left| \int_a^b k(x, s)n \sin(n^2 s)ds \right|.$$

Розглянемо величину $|z_n(s) - z_0(s)| = |n \sin(n^2 s)|$. Використовуючи умову диференційованості ядра, проінтегруємо частинами та одержимо наступне:

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b k(x, s) n \sin(n^2 s) ds \right| &= \left| - \int_a^b k(x, s) \frac{n}{n^2} d \cos(n^2 s) \right| = \\ &= \left| - \frac{k(x, s)}{n} \cos(n^2 s) \Big|_a^b + \frac{1}{n} \int_a^b k'(x, s) \cos(n^2 s) ds \right| \leq \frac{k_1}{n}, \end{aligned}$$

тоді при $n \rightarrow \infty$ одержимо $|u_n(x) - u_0(x)| \rightarrow 0 \Rightarrow \|u_n - u_0\|_{C[c, d]} \leq \frac{k_1}{n} \rightarrow 0$. Для

елементів z одержимо інше: $|z_n(s) - z_0(s)| = |n \sin(n^2 s)| \nrightarrow 0$,

Таким чином, третю умову коректності не виконано. Зауважимо, що друга умова коректності теж не завжди виконується, все залежить від вибору ядра рівняння. ◀

1.3. Узагальнене поняття розв'язку

Перш ніж перейти до розгляду методів наближеного розв'язання погано обумовлених систем, необхідно з'ясувати питання про те, що слід розуміти під розв'язком системи рівнянь (СЛАР)

$$Ax = b, \quad (1.7)$$

котра в загальному випадку може бути перевизначеною, недовизначеною, тобто такою, коли апріорі невідомо існування і єдиність розв'язку.

Позначимо через $\bar{x}$ вектор, який реалізує мінімум нев'язки, тобто норми

$$\|A \cdot \bar{x} - b\|^2 = \min_x \{ \|A \cdot x - b\|^2 : x \in R^n \}. \quad (1.8)$$

Величину $\bar{x}$ називають розв'язком системи (1.7) в сенсі методу найменших квадратів. Необхідною умовою мінімуму функціонала $I(x) = \|A \cdot x - b\|^2$ в (1.8) є умова $\delta I(\bar{x}) = 0$, де I – варіація функціонала. Оскільки для приросту функціонала має місце представлення

$$I(\bar{x} + h) - I(\bar{x}) = 2(A\bar{x}, Ah) - 2(Ah, b) + (Ah, Ah),$$

то $\delta I(\bar{x}) = 2(A^* A \bar{x} - A^* b) = 0$. Таким чином, $\bar{x}$ задовольняє системі рівнянь

$$A^* A \bar{x} = A^* b, \quad (1.9)$$

де A^* – транспонована до A матриця. Неважко показати, що справедливе й обернене твердження: кожний розв'язок (1.9) мінімізує нев'язку в (1.8). Із елементарних геометричних міркувань можна встановити, що задача (1.8) завжди має розв'язок, можливо не один. З цієї причини через встановлений факт еквівалентності система (1.9) також має розв'язок для будь-якої матриці A та вектору b .

Позначимо $\bar{X}$ – множину розв’язків системи (1.9) (а значить, і задачі (1.8)). Задавши деякий фіксований елемент x^0 , який відіграє роль пробного розв’язку (наприклад, можна покласти $x^0 = 0$), розглянемо задачу на мінімум:

$$\min \left\{ \|x - x^0\|^2 : x \in \bar{X} \right\}. \quad (1.10)$$

Розв’язок $\tilde{x}$ задачі (1.10) існує і єдиний, що випливає з того факту, що строго опуклий функціонал досягає найменшого значення на опуклій замкнутій множині в єдиній точці. Вектор $\tilde{x}$ будемо називати псевдорозв’язком задачі (1.7).

Із співвідношень

$$\begin{aligned} A^*Au &= 0, \\ (A^*Au, u) &= \|Au\|^2 = 0, \\ Au &= 0, \\ Ax &= 0, \\ A^*Ax &= 0 \end{aligned}$$

випливає, що множина розв’язків однорідних систем $A^*Au = 0$, $Ax = 0$ збігається. Звідси негайно випливає наступний важливий факт. Якщо система (1.7) сумісна, то псевдорозв’язок $\tilde{x}$ збігається з нормальним розв’язком цієї системи, тобто є розв’язком, який найменше відхиляється за нормою від вектору x^0 . І в частинному випадку, якщо (1.7) однозначно розв’язується, то псевдорозв’язок співпадає зі звичайним розв’язком.

1.4. Псевдорозв’язок матричного рівняння

Означення 1.6. Матрицю Q^+ розмірності $m \times n$ називають *псевдооберненою* до матриці Q розмірності $m \times n$, якщо виконуються рівності:

$$QQ^+Q = Q, \quad Q^+QQ^+ = Q^+, \quad (QQ^+)^* = QQ^+, \quad (Q^+Q)^* = Q^+Q. \quad (1.11)$$

Означення 1.7. Нехай ранг матриці Q доівнює n_1 : $\text{rang} Q = n_1$. Скелетним розкладом матриці Q називають добуток:

$$Q = RS, \quad (1.12)$$

де $m \times n_1$ -вимірна матриця R і $n_1 \times n$ -вимірна матриця S повного рангу:

$$\text{rang} Q = \text{rang} R = \text{rang} S = n_1.$$

Для знаходження псевдооберненої матриці застосовують формулу

$$Q^+ = S^+R^+ = S^*(SS^*)^{-1}(R^*R)^{-1}R^*. \quad (1.13)$$

Псевдообернена матриця існує для будь-якої матриці, крім цього вона єдина.

Для того, щоб отримати розклад (1.13), достатньо в якості стовпців матриці R взяти будь-які n_1 лінійно незалежних стовпців матриці Q , або будь-які n_1 лінійно незалежних стовпців, через які лінійно виражаються стовпці

матриці Q . Тоді будь-який j -ий стовпець матриці Q буде лінійною комбінацією стовпців матриці R .

Припустимо далі, що матриця Q повного рангу. В цьому випадку скелетний розклад матриці Q має вигляд $Q = QI_n$, де I_n – одинична матриця, що звичайно приводить до більш простої, ніж (1.13) формули

$$Q^+ = (Q^*Q)^{-1}Q^*. \quad (1.14)$$

Для знаходження псевдооберненої матриці можна застосувати також формулу

$$Q^+ = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} Q^*(QQ^* + \varepsilon I_n)^{-1}. \quad (1.15)$$

Приклад 1.4. Знайдемо псевдообернену матрицю Q^+ до матриці $Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Для розв’язання задачі, використаємо формулу (1.15). Запишемо матриці:

$$QQ^* + \varepsilon I_2 = \begin{pmatrix} 1+\varepsilon & 0 \\ 0 & \varepsilon \end{pmatrix}, \quad (Q^+ + \varepsilon I_2)^{-1} = \frac{1}{\varepsilon(1+\varepsilon)} \cdot \begin{pmatrix} \varepsilon & 0 \\ 0 & 1+\varepsilon \end{pmatrix},$$

$$Q^*(QQ^* + \varepsilon I_n)^{-1} = \frac{1}{1+\varepsilon} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Таким чином,

$$Q^+ = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{1+\varepsilon} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Відмітимо наступні властивості псевдооберненої матриці:

$$(Q^*)^+ = (Q^+)^*, \quad (Q^+)^+ = Q, \quad (QQ^+)^2 = QQ^+, \quad Q^+Q^2 = Q^+Q.$$

Для наближеного знаходження псевдообернених матриць можна використовувати розклад псевдообернених матриць в ряди чи нескінченні добутки.

Означення 1.8. Ортопроектором P_Q для $m \times n$ -вимірної матриці Q називають $n \times n$ -вимірну матрицю, що задовольняє наступним умовам:

$$QP_Q = 0, \quad (P_Q)^* = P_Q, \quad (P_Q)^2 = P_Q.$$

Аналогічно вводять поняття для $m \times m$ -вимірної матриці-ортопроектора P_{Q^*} :

$$Q^*P_{Q^*} = 0, \quad (P_{Q^*})^* = P_{Q^*}, \quad (P_{Q^*})^2 = P_{Q^*}.$$

Ортопроектори P_Q та P_{Q^*} можна знайти, якщо відома псевдообернена до Q матриця Q^+ , за формулами:

$$P_{Q^*} = I_m - QQ^+, \quad (1.16)$$

$$P_Q = I_n - Q^+Q. \quad (1.17)$$

Означення 1.9. Нуль-простором $N(Q)$ $m \times n$ -вимірної матриці Q називають множину векторів $c_n \in R^n$ з характерною властивістю $Qc_n = 0$.

Аналогічно можна ввести нуль-простір $N(Q^*)$ матриці Q^* :

$$N(Q^*) = \{c_m \in R^m : Q^*c_m = 0\}.$$

Для знаходження векторів із нуль-просторів матриць Q та Q^* можна використовувати ортопроектори. Дійсно, для будь-якого вектору $c_n \in R^n$ вектор $P_Q c_n \in N(Q)$; таким чином, ортопроектор P_Q проектує евклідовий простір R^n в нуль-простір матриці Q :

$$P_Q : R^n \rightarrow N(Q).$$

Аналогічно будь-який вектор $c_m \in R^m$ ортопроектор P_{Q^*} проектує в нуль-простір матриці Q^* : $P_{Q^*} c_m \in N(Q^*)$, отже

$$P_{Q^*} : R^m \rightarrow N(Q^*).$$

Дослідимо задачу про знаходження умов існування і побудови розв'язку системи

$$Qc = b$$

з постійною $m \times n$ -вимірною матрицею Q , невідомим вектором $c \in R^n$ та даним вектором $b \in R^m$. Умови існування розв'язку цієї системи визначає наступна теорема [13].

Теорема 1.1. (Кронекера-Капеллі) Система лінійних рівнянь

$$Qc = b \tag{1.18}$$

сумісна тоді і тільки тоді, коли ранг $n \times n$ -вимірної матриці Q співпадає з рангом розширеної $n \times (n+1)$ -вимірної матриці $[Q, b]$.

Якщо лінійна алгебраїчна система задовольняє умовам теореми Кронекера-Капеллі, для побудови її розв'язку можна використовувати різні модифікації методу Гауса та матричний метод (існує обернена матриця).

Лінійні алгебраїчні системи з квадратною матрицею Q будемо називати фредгольмовими.

Теорема 1.2. (Альтернатива Фредгольма). Або неоднорідна система (1.18) має єдиний розв'язок при будь-яких правих частинах ($b \neq 0$), або однорідна система ($b = 0$), яка відповідає системі (1.18), має нетривіальний розв'язок.

Теорема 1.3. Алгебраїчна система (1.18) з $m \times n$ -вимірною матрицею Q має розв'язок тоді і тільки тоді, коли

$$P_{Q^*} \cdot b = 0. \tag{1.19}$$

Якщо умова (1.19) виконується, то розв'язок системи (1.18) має вигляд

$$c = Q^+ b + P_Q \bar{c}, \quad \bar{c} \in R^n. \tag{1.20}$$

Нехай умова (1.19) не виконана: $P_Q \cdot b \neq 0$. При цьому система (1.18) немає розв'язку, однак вона завжди має псевдорозв'язок $c^+ \in R^n$, який мінімізує нев'язку

$$\|Qc - b\| = \sqrt{\sum_{i=1}^m \left| \sum_{k=1}^n q_{ik} c_k - b_i \right|^2}$$

для системи (1.18). Вектор $c^+ \in R^n$ має найменшу довжину

$$\|c\| = c^* c = \sqrt{\sum_{i=1}^n c_i^2}.$$

Система (1.18) завжди має один і тільки один псевдорозв'язок $c^+ \in R^n$, який визначають формулою $c^+ = Q^+ b$. При цьому норма нев'язки дорівнює нормі виразу, що входить в ліву частину рівняння (1.19):

$$\|Qc^+ - b\| = \|P_{Q^*} \cdot b\|.$$

Не дивлячись на те, що псевдорозв'язок єдиний, розв'язок несумісної системи

$$c = Q^+ b + P_Q \bar{c}, \quad \bar{c} \in R^n$$

не єдиний. Це пояснюється тим, що нев'язка будь-якого з цих розв'язків

$$\|Q(Q^+ b + P_Q \bar{c}) - b\| = \|P_{Q^*} \cdot b\|$$

така ж, як і для псевдорозв'язку.

1.5. Метод розв'язків на компактах

Розглянемо некоректну задачу для операторного рівняння. Виникає питання: як використовуючи апіорну інформацію звужити множину розв'язків, а ще краще, одержати коректну задачу. Тихонову А.Н. належить наступна думка: якщо відомо, що множина розв'язків є компактом, то задача розв'язку операторного рівняння коректна при умові, що наближена права частина операторного рівняння теж належить образу компакта. Для доведення цього твердження Тихонов А.Н. застосував наступну теорему [16].

Теорема 1.4. Нехай ін'єктивний неперервний оператор A діє із $M \in F \rightarrow AM \in U$, де F і U – нормовані простори, M – компакт. Тоді обернений оператор A^{-1} неперервний на AM .

Теорема є справедливою і для нелінійних операторів. Таким чином розв'язок операторного рівняння на компактi є коректною задачею при умові, що наближена права частина належить AM . Ця ідея дозволила М.М. Лаврент'єву ввести поняття задачі, коректної за Тихоновим (припускається існування множини коректності, на якій задача є коректною), а В.К. Іванову дати означення квазірозв'язку некоректної задачі.

Розглянемо операторне рівняння першого роду $Az = u$, де оператор $A: F \rightarrow U$, де F і U – метричні простори, A – лінійний і неперервний. Нехай для точного $\bar{u}$ існує єдиний розв’язок $\bar{z}$, тобто $A\bar{z} = \bar{u}$, причому $\bar{z} \in M$, де M – компакт із простору F . Точна права частина $\bar{u}$ невідома, а відомо $u_\delta: \rho(u_\delta, u) \leq \delta$. Будемо вважати, що задача розв’язання рівняння $Az = u$ є некоректною. Потрібно знайти $z_\delta \rightarrow \bar{z}$ при $\rho(z_\delta, \bar{z}) \rightarrow 0$, якщо $\delta \rightarrow 0$. Для звуження множини M введемо множину $Z_\delta = \{z: \rho(Az, u_\delta) \leq \delta\}$. Тоді $\bar{z} \in M \cap Z_\delta$.

Теорема 1.5. При виконанні перелічених вище умов при $\delta \rightarrow 0$ виконується умова: $\sup_{z \in Z_\delta} \rho(z, \bar{z}) \rightarrow 0$.

Зауважимо, що умова компактності є обов’язковою, інакше не завжди $z \rightarrow \bar{z}$ при $\delta \rightarrow 0$. Наведемо приклад.

Приклад 1.5. Розглянемо оператор $A: R^1 \rightarrow R^1$. Нехай $Az = \frac{z}{z^2 + 1}$. Тоді при $\bar{u} = 0$ маємо $\bar{z} = 0$. Нехай права частина визначена з точністю δ і нехай $u_\delta = \frac{\delta}{2}$.

Множину Z_δ визначимо за допомогою співвідношення: $Z_\delta = \{z: \rho(Az_\delta, u_\delta) \leq \delta\}$. У просторі R^1 маємо: $\rho(u_1, u_2) = |u_1 - u_2|$, тоді $Z_\delta = \left\{z: \left| \frac{z}{z^2 + 1} - \frac{\delta}{2} \right| \leq \delta \right\}$.

Розглянемо $z_\delta = \frac{2}{\delta}$. Покажемо, що $z_\delta \in Z_\delta$. Маємо:

$$\left| \frac{\frac{2}{\delta}}{\frac{4}{\delta^2} + 1} - \frac{\delta}{2} \right| = \left| \frac{2\delta}{4 + \delta^2} - \frac{\delta}{2} \right| = \left| \frac{4\delta - 4\delta - \delta^3}{2(4 + \delta^2)} \right| = \frac{\delta^3}{2(4 + \delta^2)} \leq \delta.$$

Перейдемо до границі при $\delta \rightarrow 0$. Маємо, що $z_\delta = \frac{2}{\delta} \nrightarrow 0$ при $\delta \rightarrow 0$. Покажемо як працює теорема при введенні компакта $M = [-1, 1]$. Знайдемо перетин $M \cap Z_\delta$. Розв’яжемо спочатку нерівність:

$$\begin{cases} \left| \frac{z}{z^2 + 1} - \frac{\delta}{2} \right| \leq \delta, \\ \frac{z}{z^2 + 1} - \frac{\delta}{2} \leq \delta, \\ \frac{z}{z^2 + 1} - \frac{\delta}{2} \geq -\delta, \end{cases}$$

$$\begin{cases} -2z + 3\delta z^2 + 3\delta \geq 0, \\ 2z + z^2\delta - \delta \geq 0. \end{cases}$$

Введемо компакт. Тоді на $[-1,1]$ маємо розв'язок:

$$\frac{-1 + \sqrt{1 - \delta^2}}{\delta} \leq z \leq \frac{1 - \sqrt{1 - 9\delta^2}}{3\delta}.$$

При $\delta \rightarrow 0$ ліва границя

$$\frac{-1 + \sqrt{1 - \delta^2}}{\delta} = \frac{-1 + 1 - \delta^2}{\delta(1 + \sqrt{1 - \delta^2})} = \frac{-\delta}{1 + \sqrt{1 - \delta^2}} \rightarrow 0.$$

Аналогічно права границя $\frac{1 - \sqrt{1 - 9\delta^2}}{3\delta} \rightarrow 0$, із цього випливає, що $z \rightarrow \bar{z} = 0$.

У теорії некоректних задач відомі множини коректності, які достатньо часто зустрічаються в прикладних задачах. Перш за все, відомо, що якщо точний розв'язок належить скінченно-параметричному сімейству функцій, то ставиться задача відшукування параметрів, яка може бути коректною і в тому випадку, якщо задача без цієї апіорної інформації є некоректною. Наприклад, якщо в операторному рівнянні невідомою є функція $z(s)$, $s \in [a; b]$, про яку відомо, що вона є монотонною і обмеженою, то цієї інформації достатньо для виділення компакта в просторі $L_2[a, b]$.

Далі наведемо метод розширюючихся компактів, ідея якого належить В.К. Іванову та І.Н. Домбровській.

Нехай лінійний оператор A ін'єктивний, неперервний, $A: F \rightarrow U$, де F і U – нормовані простори. Нехай також відома апіорна інформація, яка зустрічається при розв'язанні багатьох фізичних задач. Відомо, що точний розв'язок $\bar{z}$ для рівняння $A\bar{z} = \bar{u}$ можна представити у вигляді $B\bar{v} = \bar{z}$, де $\bar{v} \in V$, оператор $B: V \rightarrow F$, B – ін'єктивний, цілком неперервний оператор, V – гільбертовий простір. Вважаються відомими $u_\delta: \|u_\delta - \bar{u}\| \leq \delta$ і похибка $\delta > 0$.

Спочатку номер ітерації вважають $n=1$ і визначають замкнуту кулю в просторі V : $\overline{S_n}(0) = \{v: \|v\| \leq n\}$. Її образ при дії оператора B є компактом $Z_n = B\overline{S_n}(0)$, оскільки B – цілком неперервний оператор, а V – гільбертовий простір. Далі знаходять $\min_{z \in B\overline{S_n}(0)} \|Az - u_\delta\|$. Існування мінімуму обумовлюється

постановкою задачі, компактністю $Z_n = B\overline{S_n}(0)$, неперервністю оператора A . Якщо $\min_{z \in B\overline{S_n}(0)} \|Az - u_\delta\| \leq \delta$, то процес припиняється і вважають $n(\delta) = n$, в якості

наближеного розв'язку вибирають будь-який елемент $z_{n(\delta)}: z_{n(\delta)} \in B\overline{S_{n(\delta)}}(0)$ і $\|Az_{n(\delta)} - u_\delta\| \leq \delta$. Якщо ж $\min_{z \in B\overline{S_n}(0)} \|Az - u_\delta\| > \delta$, то потрібно розширювати

компакт, для чого n збільшують на одиницю, процес повторюється.

Теорема 1.6. Наведений вище процес збігається: $n(\delta) < +\infty$. Існує $\delta_0 > 0$ (яке взагалі залежить від $\bar{z}$) таке, що $n(\delta) = n(\delta_0) \quad \forall \delta \in (0, \delta_0]$. Наближений розв'язок $z_{n(\delta)}$ збігається до точного розв'язку $\bar{z}$ при $\delta \rightarrow 0$.

Наведений метод дозволяє побудову так званої апостеріорної оцінки похибки, тобто існує функція $\chi(u_\delta, \delta)$ така, що $\chi(u_\delta, \delta) \rightarrow 0$ при $\delta \rightarrow 0$ і $\chi(u_\delta, \delta) \geq \|z_{n(\delta)} - \bar{z}\|$ при достатньо малих $\delta > 0$. В якості апостеріорної оцінки можна вибрати $\chi(u_\delta, \delta) = \max \{ \|z_{n(\delta)} - z\| : z \in Z_{n(\delta)}, \|Az - u_\delta\| \leq \delta \}$.

Апостеріорна оцінка похибки не є оцінкою похибки в повному розумінні цього слова, побудова оцінки похибки розв'язків некоректно поставлених задач неможлива. Однак при достатньо малих $\delta > 0$, а саме $\forall \delta \in (0, \delta_0]$, апостеріорна оцінка похибки є оцінкою похибки розв'язку некоректної задачі при наявності апріорної інформації у даній постановці задачі.

Наведений підхід можна узагальнити на випадок, коли оператори A та B задано з похибками, а також на нелінійні некоректні задачі. Розроблено чисельні методи розв'язання таких задач. Використання послідовності натуральних чисел в якості радіусів куль в просторі V не є обов'язковим. Можна вибрати будь-яку монотонно зростаючу необмежену послідовність додатних чисел.

1.6. Метод квазірозв'язків

Нехай оператор A в рівнянні $Az = u$ – цілком неперервний. Побудова стійкого до малих змін правої частини u наближеного розв'язку рівняння $Az = u$ за формулою

$$z = A^{-1}u \quad (1.21)$$

можлива в тих випадках, коли розв'язок шукають на компактi $M \subset F$ та права частина рівняння належить множині $N = AM$.

Зазвичай не існує ефективних критеріїв, які дозволяють встановити належність елемента u множині N . В практичних задачах часто замість точного значення правої частини $\bar{u}$ нам відомо її наближене значення $\tilde{u}$, яке може не належати множині $N = AM$. В таких випадках не можна будувати наближений розв'язок рівняння $Az = u$ за формулою (1.21), оскільки символ $A^{-1}\tilde{u}$ може не мати змісту.

Прагнення усунути труднощі, пов'язані з відсутністю розв'язку рівняння $Az = u$ при неточній правій частині, привело В.К. Іванова до поняття квазірозв'язку рівняння – узагальненого поняття розв'язку цього рівняння.

Означення 1.10. Елемент $\tilde{z} \in M$, мінімізуючий при даному u функціонал $\rho_U(Az, u)$ на множині M , називають квазірозв'язком рівняння $Az = u$ на M , якщо [16]

$$\rho_U(A\tilde{z}, u) = \inf_{z \in M} \rho_U(Az, u). \quad (1.22)$$

Якщо M – компакт, то квазірозв’язок існує $\forall u \in U$ і якщо, крім того, $u \in AM$, квазірозв’язок співпадає зі звичайним (точним) розв’язком рівняння $Az = u$. Квазірозв’язок може бути і не один. У цьому випадку під квазірозв’язком будемо розуміти будь-який елемент із множини квазірозв’язків.

Можна вказати достатні умови, при яких квазірозв’язок єдиний і неперервно залежить від правої частини. Наведемо ці умови.

Означення 1.11. Нехай елемент y та множина Q належать простору U . Елемент $q \in Q$ називають проекцією елемента y на множину Q , $q = Py$, якщо

$$\rho_U(y, q) = \rho_U(y, Q),$$

$$\text{де } \rho_U(y, Q) = \inf_{h \in Q} \rho_U(y, h).$$

Теорема 1.7. Якщо рівняння $Az = u$ може мати на компактi M не більше одного розв’язку і проекція кожного елемента $u \in U$ на множину $N = AM$ єдина, то квазірозв’язок рівняння $Az = u$ єдиний і неперервно залежить від правої частини u .

Теорема 1.8. Нехай рівняння $Az = u$ лінійне, однорідне рівняння $Az = 0$ має лише нульовий розв’язок, множина M випукла, а будь-яка сфера у просторі U строго випукла. Тоді квазірозв’язок рівняння $Az = u$ на компактi M єдиний і неперервно залежить від правої частини u .

1.6.1. Квазірозв’язки матричного рівняння

Розглянемо операторне рівняння $Az = u$, де оператор A діє з лінійного векторного простору в лінійний векторний простір і, який задано в матричній формі наступним чином:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

$$\text{Права частина } u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \dots \\ u_n \end{pmatrix}, \quad z = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \dots \\ z_n \end{pmatrix}.$$

Нехай компакт M задано умовами на границі: $f_i(z_1, z_2, \dots, z_n) = 0$, $i = 1, 2, \dots, k$.

Задача знаходження розв’язку такого операторного рівняння буде некоректною, коли матриця A буде виродженою. Алгоритм побудови квазірозв’язків такої некоректної задачі наступний.

Згідно з означенням квазірозв'язку потрібно знаходити $\inf_{z \in M} \rho_U(Az, u)$, тобто мінімізувати функціонал. Для цього знайдемо $\min_{z \in M} \|Az - u\|_U^2$ і отримаємо задачу на умовний екстремум.

Якщо потрібно знайти $\min_{z \in M} \|Az - u\|_U^2$, де компакт M обмежений одним контуром, тобто заданий, наприклад, у вигляді $\|z\| \leq q$, $q \in R$, то будуємо функцію Лагранжа:

$$\begin{aligned} F(z_1, z_2, \dots, z_n, \lambda) &= \|Az - u\|_U^2 + \lambda(\|z\|_F^2 - q^2) = \\ &= (a_{11}z_1 + a_{12}z_2 + \dots + a_{1n}z_n - u_1)^2 + (a_{21}z_1 + a_{22}z_2 + \dots + a_{2n}z_n - u_2)^2 + \dots + \\ &\quad + (a_{n1}z_1 + a_{n2}z_2 + \dots + a_{nn}z_n - u_n)^2 + \lambda(z_1^2 + z_2^2 + \dots + z_n^2 - q^2) \end{aligned}$$

та знаходимо розв'язок задачі на умовний мінімум. Використаємо необхідну умову екстремуму. Одержимо при цьому систему:

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial z_1} = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial z_2} = 0, \\ \dots \\ \frac{\partial F}{\partial z_n} = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = 0. \end{cases}$$

Із отриманої системи алгебраїчних рівнянь знаходимо значення $z_1, z_2, \dots, z_n$ та відповідні λ . Підставляємо отримані значення в функцію:

$$f(z_1, z_2, \dots, z_n) = (a_{11}z_1 + a_{12}z_2 + \dots + a_{1n}z_n - u_1)^2 +$$

$$+ (a_{21}z_1 + a_{22}z_2 + \dots + a_{2n}z_n - u_2)^2 + \dots + (a_{n1}z_1 + a_{n2}z_2 + \dots + a_{nn}z_n - u_n)^2$$

і знаходимо значення функції $f(z_1, z_2, \dots, z_n)$. Вибираємо найменше значення і у відповідь записуємо ті $z_1, z_2, \dots, z_n$, які дають це значення.

Отже, знайдений розв'язок буде квазірозв'язком задачі.

Якщо компакт M обмежений декількома контурами, то задачу на умовний екстремум розв'язуємо для кожного контуру окремо, а потім із усіх знайдених значень змінної функції $f(z_1, z_2, \dots, z_n)$ обираємо найменше і записуємо у відповідь ті $z_1, z_2, \dots, z_n$, які дають це значення.

1.6.2. Квазірозв'язки некоректних задач для інтегрального рівняння Фредгольма першого роду

Розглянемо задачу розв'язання рівняння Фредгольма першого роду

$$Az = \int_a^b K(x, s)z(s)ds = u(x), \quad x \in [a, b], \quad (1.23)$$

де $K(x, s)$ – ядро інтегрального оператора A , $z(s)$ – невідома функція, $u(x)$ – права частина. Для розв'язку рівняння (1.23) (з наближеними даними) слід застосовувати методи розв'язку некоректно поставлених задач [7].

Так під квазірозв'язком некоректної задачі для рівняння (1.23) будемо розуміти функцію z_M , для якої

$$\|Az_M - u\|_U = \inf_{z \in M} \|Az - u\|_U, \quad (1.24)$$

де U – це $L_2[a, b]$ або $C[a, b]$, M – компакт. Квазірозв'язок при деяких припущеннях стійкий по відношенню до збурження вхідних даних $K(x, s)$ і $u(x)$ й тому може бути ефективним наближенням до точного розв'язку, якщо останній належить M . Множину M обирають найчастіше так, щоб її елементи мали всі відомі властивості точного розв'язку. Часто M задають умовою:

$$\|z\| \leq c, \quad (1.25)$$

де c – константа. Досить загальним та зручним способом задання компактної множини M є наступна умова: $z \in M$, якщо

$$z(x) = \int_a^b l(x, s)\varphi(s)ds, \quad \|\varphi\| \leq 1, \quad (1.26)$$

де $l(x, s)$ – ядро, для якого інтегральний оператор цілком неперервний, тобто перетворює будь-яку обмежену множину в компакту.

У випадку лінійного рівняння (1.23) задача знаходження квазірозв'язку, де M задано однією із умов (1.25), (1.26), є задачею випуклого програмування, для наближеного розв'язку якої може бути застосовано багато чисельних методів. Покладемо, зокрема,

$$\varphi(s) \approx \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j(s), \quad \left\| \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j(s) \right\|^2 = \sum_{j=1}^n \alpha_j^2 \leq 1,$$

тобто представимо φ у вигляді частини ряду Фур'є по ортогональній системі функцій $e_j(s)$. В якості $e_j(s)$ можемо прийняти, наприклад, многочлени Лежандра, функції Хаара, систему $\sin 2\pi js$ та $\cos 2\pi js$ і т.д. Тоді

$$z_M(s) \approx \sum_{j=1}^n \alpha_j z_j(s), \quad \text{де } z_j(x) = \int_a^b l(x, s)e_j(s)ds, \quad \sum_{j=1}^n \alpha_j^2 \leq 1,$$

і задачу (1.24) знаходження квазірозв'язку приводимо до знаходження коефіцієнтів α_j^M із умови:

$$\left\| \sum_{j=1}^n \alpha_j^M Az_j - u \right\|_U = \inf_{\sum_{j=1}^n \alpha_j^2 \leq 1} \left\| \sum_{j=1}^n \alpha_j Az_j - u \right\|_U, \quad (1.27)$$

де $Az_j = \int_a^b K(x, s)z_j(s)ds$.

У випадку, якщо безумовний мінімум $\left\| \sum_{j=1}^n \alpha_j Az_j - u \right\|$ по $\alpha_j, j=1,2,\dots,n$,

задовольняє умові $\sum_{j=1}^n \alpha_j^2 \leq 1$ він і є шуканим розв'язком задачі (1.40). В іншому

випадку обмеження задачі (1.27) зводиться до рівності $\sum_{j=1}^n \alpha_j^2 = 1$.

У випадку простору $L_2[a; b]$ остання задача зводиться до мінімізації функції Лагранжа

$$F(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \lambda) = \left\| \sum_{j=1}^n \alpha_j Az_j - u \right\|_{L_2[a, b]}^2 + \lambda \left(\sum_{j=1}^n \alpha_j^2 - 1 \right),$$

що рівносильно розв'язку алгебраїчної системи

$$\sum_{j=1}^n \alpha_j (Az_j, Az_i) + \lambda \alpha_j = (u, Az_i), \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

де скалярні добутки мають вигляд:

$$(Az_j, Az_i) = \int_a^b Az_j Az_i dx, \quad (u, Az_i) = \int_a^b u(x) Az_i dx,$$

та до відшукування множника Лагранжа λ із умови:

$$\sum_{j=1}^n \alpha_j^2 = 1.$$

У випадку простору $C_{[a, b]}$ зручно приводити задачу знаходження квазірозв'язку до задачі лінійного програмування, для якого існують ефективні методи та програми на ЕОМ. Представимо інтеграл (1.26) у вигляді відповідної квадратурної формули, отримаємо

$$z_M(s) \approx \sum_{j=1}^n B_j l(x, x_j) \varphi_j, \quad |\varphi_j| \leq 1,$$

де B_j – коефіцієнти квадратурної формули, і

$$\|Az_M - u\| \approx \inf_{|\varphi_j| \leq 1} \max_{x_j} \left| B_j \varphi_j \int_a^b K(x_j, s) l(s, x_j) ds - u(x_j) \right|.$$

Остання задача легко зводиться до наступної задачі лінійного програмування: потрібно знайти $\min z$ при умові:

$$-z \leq \sum_{i=1}^n B_i \varphi_i \int_a^b K(x_j, s) l(s, x_i) ds - u(x_j) \leq z, \quad |\varphi_i| \leq 1.$$

1.7. Метод регуляризації А.М. Тихонова

1.7.1. Метод регуляризації для матричного рівняння

В основі побудови стійких методів розв'язку некоректних задач лежить поняття регуляризуючого алгоритму (РА) і пов'язаного з ним поняття регуляризованого сімейства розв'язків, введеного А.М. Тихоновим. Погано обумовлені СЛАР слід розглядати як некоректно поставлені задачі і при їх наближеному розв'язанні необхідно застосовувати ідеї регуляризації.

Домовимося розрізняти точні дані – пару $\{A, b\}$, котрі формують задачу (1.7) і нам не відомі, і наближені дані $\{A_h, b_\delta\}$, $\|A_h - A\| \leq h$, $\|b_\delta - b\| \leq \delta$ з рівнем похибок h, δ , якими ми володіємо. Суть методу регуляризації наближеного розв'язання стосується побудови послідовності векторів $x_{h,\delta}$, яка збігається до розв'язку або псевдорозв'язку рівняння (1.7) при $\delta \vee h \rightarrow 0$. За наближений розв'язок $x_{h,\delta}$ не можна брати точний розв'язок або квазірозв'язок рівняння з даними

$$A_h \cdot x = b_\delta \quad (1.28)$$

Нехай ми маємо спосіб (правило), який по парі $\{A_h, b_\delta\}$ і додатньому параметру α однозначно будує вектор $x^\alpha(A_h; b_\delta)$. Якщо існує залежність параметра $\alpha(\delta, h)$ від похибок δ, h вихідних даних така, що

$$\lim_{\substack{\delta \rightarrow 0 \\ h \rightarrow 0}} \|x^{\alpha(\delta, h)}(A_h; b_\delta) - \tilde{x}\| = 0, \quad (1.29)$$

тоді множину $\{x^{\alpha(\delta, h)}(A_h; b_\delta)\}$ називають регуляризованим сімейством наближених розв'язків, а сам спосіб побудови $x^\alpha(A_h; b_\delta)$ – регуляризуючим алгоритмом для задачі (1.7). Тут вектор $\tilde{x}$ – розв'язок, нормальний розв'язок або псевдорозв'язок системи (1.7) залежно від того, чи розв'язується ця система однозначно, чи має множину розв'язків чи немає.

Співвідношення (1.29) засвідчує, що наближений розв'язок $x^\alpha(A_h; b_\delta)$ тим краще апроксимує точний розв'язок $\tilde{x}$, чим менша похибка вихідних даних δ, h . Таким чином, регуляризуючий алгоритм дає теоретичну базу для конструювання стійкого до збурень вихідних даних наближеного розв'язку системи (1.7) загального виду, включаючи погано обумовлені системи.

Важливо розуміти наступну обставину. Якщо A^{-1} існує, тобто A – невинроджена матриця, то для достатньо малих h A_h^{-1} теж існує і розв'язок $x_{h,\delta}$ рівняння (1.28) теоретично буде збігатися до розв'язку рівняння (1.7) при $\delta, h \rightarrow 0$. Однак якщо A – погано обумовлена матриця ($\mu(A)$ – велике, $\mu(A)$ – число обумовленості [13, с.37]), то величина похибки $\|\tilde{x} - x_{\delta, h}\|$, навіть при малих δ, h , може бути недопустимо великою і задачу слід вважати практично

нестійкою (некоректною). Метод регуляризації саме і направлений на те, щоб зменшити вплив похибок (вхідних даних, обчислень) і одержати практично стійкий наближений розв'язок в цих несприятливих обставинах.

Тепер перейдемо до опису конкретних процедур побудови регуляризованих наближених розв'язків $x^\alpha(A_h; b_\delta)$. Далі для скорочення запису будемо опускати залежність $x^\alpha(A_h; b_\delta)$ від $(A_h; b_\delta)$ і записувати просто $x^{\alpha(\delta, h)}$.

Розглянемо спочатку частинний випадок – схему М.М. Лаврент'єва, коли A – симетрична додатня напіввизначена матриця, для якої система (1.7) при заданому векторі b може бути розв'язаною.

Перейдемо від (1.6) до регуляризованої системи

$$(A + \alpha E)x^\alpha = b + \alpha x^0, \quad (1.30)$$

де α – додатній параметр, E – одинична матриця, x^0 – пробний розв'язок, тобто деяке наближення до шуканого розв'язку (якщо інформація про розв'язок відсутня, то можна позначити $x^0 = 0$).

При зроблених припущеннях, СЛАР (1.30) має єдиний розв'язок x^α , який збігається при $\alpha \rightarrow 0$ до нормального розв'язку $\tilde{x}$.

Твердження 1.1. Нехай $\{A_h, b_\delta\}$, $\|A_h - A\| \leq h$, $\|b_\delta - b\| \leq \delta$ – наближені дані задачі і A_h – симетрична додатня напіввизначена матриця. Тоді СЛАР

$$(A_h + \alpha E)x^\alpha = b_\delta + \alpha x^0 \quad (1.31)$$

однозначно розв'язана і при зв'язку параметра α з похибками δ, h такими, що $\alpha(\delta, h) \rightarrow 0$, $\frac{h + \delta}{\alpha(\delta, h)} \rightarrow 0$, коли $\delta \rightarrow 0$, $h \rightarrow 0$, тобто $x^{\alpha(\delta, h)}$ збігається до нормального розв'язку $\tilde{x}$ рівняння (1.7). Це і є розв'язок, який найменше ухиляється від вектору x^0 .

Таким чином, згідно з означенням, наведеним вище, розв'язки СЛАР (1.31) $\{x^{\alpha(\delta, h)}\}$ утворюють регуляризоване сімейство наближених розв'язків для системи (1.7); причому, вибір параметра за формулою $\alpha = \sqrt[p]{\delta + h}$ ($p > 1$) задовольняє необхідним вимогам, оскільки $\alpha = \sqrt[p]{\delta + h} \rightarrow 0$, $\frac{\delta + h}{\sqrt[p]{\delta + h}} = (\delta + h)^{1 - \frac{1}{p}}$, коли $\delta, h \rightarrow 0$.

Зауваження 1.1. Нехай A – додатня напіввизначена вироджена матриця і $\|A\| = 1$. Якщо $\mu(A) = \infty$, то $\mu(A + \alpha E) \leq \frac{1 + \alpha}{\alpha}$. З цієї причини при розумному виборі параметра α можна досягти гарної обумовленості систем (1.30), (1.31) і задовільної апроксимації $x^\alpha \approx \tilde{x}$, не зважаючи на те, що ці вимоги мають протиріччя.

Роль параметра регуляризації α добре видно, якщо записати розв'язок системи $(\mu(A))$ (при $x^0 = 0$) у вигляді

$$x^\alpha = \sum_{i=1}^n \frac{b_i}{\lambda_i + \alpha} \cdot u_i,$$

де λ_i власні значення ($\lambda_i \geq 0$), а u_i ортонормовані власні вектори матриці A . Це зображення показує, що при малих λ_i додавання додатного параметра суттєво збільшує знаменник і тим самим послаблює вплив можливих похибок у відповідних компонентах b_i ($\tilde{b}_i = b_i + \Delta b_i$). Одночасно для $\lambda_i \geq 0$ вплив малого параметра α незначний (і навіть такий, що ним можна знехтувати).

Тепер відмовимося від вимоги симетричності і додатності матриці A . Нехай матриця B така, що для деякого α_0 $(A + \alpha_0 B)$ є невиродженою матрицею і, значить, існує й обернена матриця. Тоді можлива регуляризація в наступній формі:

$$(A + \alpha B)x^\alpha = b, \quad (1.32)$$

де параметр α довільного знака і $|\alpha| \leq |\alpha_0|$.

Зауваження 1.2. Нехай $\|(A + \alpha B)^{-1} A\| \leq c < \infty$ (при $\alpha \rightarrow 0$), $\|A_h - A\| \leq h$, $\|B_\mu - B\| \leq \mu$, $\|b_\delta - b\| \leq \delta \|b\|$. Тоді при достатньо малих h, μ, δ СЛАР

$$(A_h + \alpha B_\mu)x^\alpha = b_\delta \quad (1.33)$$

має єдиний розв'язок x^α і справедлива оцінка похибки

$$\|x^\alpha - \tilde{x}_B\| \leq c \cdot \frac{|\alpha| + \mu + \delta + h}{|\alpha|}, \quad (1.34)$$

де $\tilde{x}_B$ – розв'язок системи (1.7), що задовольняє умові ($\bar{X}$ – множина розв'язків системи (1.7))

$$\|B\tilde{x}\| = \min \{ \|B_x\| : x \in \bar{X} \}.$$

Із оцінки (1.34) одразу випливає, що якщо $\alpha(\delta, h, \mu) \rightarrow 0$, $\frac{\delta + h}{|\alpha(\delta, h, \mu)|} \rightarrow 0$

при $\delta, h, \mu \rightarrow 0$, має місце збіжність δ, h, μ

$$\lim_{\delta, h, \mu \rightarrow 0} \|x^\alpha - \tilde{x}_B\| = 0.$$

Найбільш важливим моментом в описаній регуляризації є підбір матриці B , для якої $(A + \alpha_0 B)$ невироджена і $\|(A + \alpha B)^{-1} A\| < \infty$.

Дослідимо, врешті, загальну ситуацію, коли система (1.7), взагалі кажучи, нерозв'язна. В цьому випадку шуканим є псевдорозв'язок. Розв'язується задача стійкої апроксимації цього псевдорозв'язку в умовах задання вхідних даних з похибкою. В якості регуляризованого наближення розв'язку приймемо вектор x^α , що задовольняє СЛАР

$$(A_h^* A_h + \alpha E)x^\alpha = A_h^* b_\delta + \alpha x^0. \quad (1.35)$$

Твердження 1.2. Нехай $\|A_h - A\| \leq h$, $\|b_\delta - b\| \leq \delta$, $\alpha > 0$. Тоді СЛАР (1.35) однозначно розв'язана і справедлива оцінка

$$\|\tilde{x} - x^\alpha\| \leq c_1 \alpha + \frac{h}{\alpha} \left(\|A\tilde{x} - b\| + 2c_2^2 \alpha^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{\sqrt{a}} (c_3 h + \delta), \quad (1.36)$$

де c_i ($i=1,2,3$) константи, які залежать від норми $\|\tilde{x}\|$ псевдорозв'язку.

Наслідок 1.1. Нехай h, δ величини порядку ε , причому, ε достатньо мале число. Якщо точне рівняння (1.7) має розв'язок, (тобто $\|A\tilde{x} - b\| = 0$), тоді права частина оцінки (1.36) за характером залежності від α та ε , є функція вигляду

$$\varphi(\alpha) = \alpha + \varepsilon + \frac{\varepsilon}{\sqrt{\alpha}}. \quad (1.37)$$

При $\alpha = \varepsilon^{\frac{2}{3}}$ вона набуває значення порядку $\varepsilon^{\frac{2}{3}}$. Якщо СЛАР (1.6) нерозв'язна ($\|A\tilde{x} - b\| \neq 0$), то права частина нерівності (1.36) є функція вигляду

$$\psi(\alpha) = \alpha + \frac{\varepsilon}{\alpha} + \frac{\varepsilon}{\sqrt{\alpha}}. \quad (1.38)$$

При $\alpha = \sqrt{\varepsilon}$ вона набуває значення порядку $\varepsilon^{\frac{1}{2}}$. Ці порядки одержуються за допомогою мінімізації функцій $\varphi(\alpha)$, $\psi(\alpha)$ (тобто є розв'язками рівнянь $\varphi'(\alpha) = 0$, $\psi'(\alpha) = 0$).

Таким чином, якщо вхідні дані рівняння (1.7) задані з точністю порядку ε , то псевдорозв'язок може бути визначений з точністю порядку $\varepsilon^{\frac{2}{3}}$, у випадку розв'язності точного рівняння, і з точністю порядку $\varepsilon^{\frac{1}{2}}$ – в оберненому випадку. Помітимо, однак, що більш складний спосіб вибору параметра α дозволяє апроксимувати псевдорозв'язок з точністю порядку апроксимації $h + \delta$.

Задача (1.35) еквівалентна задачі на мінімум

$$\min \left\{ \|A_h x - b_\delta\|^2 + \alpha \|x - x^0\|^2 : x \in R^n \right\}, \quad (1.39)$$

При $\alpha = 0$ (1.39) переходить в метод найменших квадратів (МНК), який нестійкий відносно збурень матриці. Перехід від МНК до його регуляризованого аналога (1.39) відтворює стійкість наближеного розв'язку.

1.7.2. Метод регуляризації для операторного рівняння

Нехай U , F – гільбертові простори, D – замкнута випукла множина апріорних обмежень задачі, $D \subseteq F$, оператори A , A_h – лінійні обмежені оператори, $A: F \rightarrow U$, A_h – апроксимуючий оператор, $h \geq 0$ – похибка апроксимації, тобто $\|A - A_h\| \leq h$. Побудуємо наближений розв'язок рівняння

$$Az = u, \quad (1.40)$$

який належить множині D , по заданому набору даних $\{A_h, u_\delta, \eta\}$, де $\eta = (\delta, h)$, $\delta > 0$ – похибка задання правої частини рівняння (1.40), тобто $\|u - u_\delta\| \leq \delta$.

Введемо сгладжуючий функціонал [21]

$$M^\alpha[z] = \|A_h z - u_\delta\|^2 + \alpha \|z\|^2, \quad (1.41)$$

де $\alpha > 0$ – параметр регуляризації. Розглянемо екстремальну задачу, знайдемо

$$\min_{z \in D} M^\alpha[z]. \quad (1.42)$$

Має місце наступний результат [21].

Для будь-яких $\alpha > 0$, $z_\delta \in F$ і лінійного обмеженого оператора A_h задача

$$(1.42) \text{ має єдиний розв'язок } z_\eta^\alpha \in D, \text{ причому } \|z_\eta^\alpha\| \leq \frac{\|z_\eta\|}{\sqrt{\alpha}}.$$

Вибір параметра регуляризації виконують у відповідності до принципу узагальненої нев'язки [21], тобто α знаходять із рівняння:

$$\rho(\alpha) = \|A_h z_\eta^\alpha - u_\delta\|^2 - (\delta + h \|z_\eta^\alpha\|)^2 - \mu^2(u_\delta, A_h) = 0, \quad (1.43)$$

де $\mu(u_\delta, A_h) = \inf_{z \in D} \|A_h z - u_\delta\|$ – міра невідповідності рівняння (1.40) наближеним даним.

При цьому, якщо виконується умова $\|u_\delta\|^2 \geq \delta^2 + \mu^2(u_\delta, A_h)$, то рівняння (2.3) має один додатний корінь, який вибирають в якості параметра регуляризації в методі А.М. Тихонова.

Для знаходження кореня рівняння (2.3) можна використовувати модифікацію метода хорд. Наведемо ітераційну процедуру знаходження параметра регуляризації.

Нехай $\varepsilon > 0$. Задамо початкове значення параметра регуляризації α_0 і виберемо наступне значення α_1 ($\alpha_1 < \alpha_0, |\alpha_1 - \alpha_0| > \varepsilon$), вважаємо що $\alpha_1 = \frac{\alpha_0}{2}$ і обчислюємо $\rho(\alpha_0), \rho(\alpha_1)$. Далі виконуємо процедуру доки виконується умова $|\alpha_{n-2} - \alpha_{n-1}| \geq \varepsilon$, будуємо ітераційну послідовність по наступній рекурентній формулі:

$$\alpha_n = \frac{\alpha_{n-2}}{1 - \frac{\alpha_{n-1} - \alpha_{n-2}}{\alpha_{n-1}} \frac{\rho(\alpha_{n-2})}{\rho(\alpha_{n-2}) - \rho(\alpha_{n-1})}},$$

причому, якщо $\rho(\alpha_{n-2})\rho(\alpha_{n-1}) > 0$, то $\alpha_{n-2} = \alpha_{n-1}$, $\alpha_{n-1} = \alpha_n$

якщо $\rho(\alpha_{n-2})\rho(\alpha_{n-1}) < 0$, то $\begin{cases} \text{якщо } \rho(\alpha_{n-2})\rho(\alpha_n) < 0, \text{ то } \alpha_{n-1} = \alpha_n, \\ \text{якщо } \rho(\alpha_{n-1})\rho(\alpha_n) < 0, \text{ то } \alpha_{n-2} = \alpha_n. \end{cases}$

В якості значення параметра регуляризації вибирають $\alpha = \alpha_{n-1}$.

1.7.3. Особливості застосування методу Тихонова до розв'язання операторних рівнянь

Нехай u – точна права частина операторного рівняння, а z – відповідний точний розв'язок операторного рівняння. Припустимо, що права частина задана з деякою похибкою δ у метриці ρ_F , тобто

$$\rho_U(u_\delta, u) < \delta.$$

Через u_δ позначимо наближену праву частину операторного рівняння. Оскільки права частина операторного рівняння відома тільки наближено, то зрозуміло, що під час розв'язання операторного рівняння може йти мова лише про наближений розв'язок, який ми позначимо через z_δ . Введемо множину Z_δ наближених розв'язків:

$$Z_\delta = \{z \in F : \rho_U(Az, u_\delta) < \delta\}.$$

Оскільки задача вважається некоректною, то в множині Z_δ існує елемент, досить «далекій» від точного розв'язку в метриці простору F .

Задача полягає в доборі серед елементів множини Z_δ саме елементів, близьких до точного розв'язку в метриці F , які і вважаються “справжніми” наближеними розв'язками.

Проаналізуємо спочатку спосіб добору наближеного розв'язку, який ґрунтується на ідеї методу відхилів. Нагадаємо, що в задачах мінімізації стабілізатора на множині елементів, для яких значення функціонала мало відрізняються від значення точної нижньої грані. Розглянемо застосування цього методу для випадку некоректних задач розв'язання операторних рівнянь.

Нехай $\Omega(z)$ – стабілізатор, визначений на множині $U_\delta \subseteq V$. Введемо множину $F_{\delta, \Omega} = F_\Omega \cap Z_\delta$. Інакше кажучи, у множині $F_{\delta, \Omega}$ включимо всі елементи множини F_Ω , для яких виконується умова

$$\rho_U(Az, u_\delta) < \delta,$$

тобто відхил лівої та правої частин операторного рівня не перевищує δ . Розуміючи під функціоналом $J(z)$ функціонал $\rho_U(Az, u_\delta)$, визначений на Z_δ , і згадуючи ідею методу відхилів, знаходимо елемент z^* , для якого досягається значення нижньої грані стабілізатора $\Omega(z)$ на множині $F_{\delta, \Omega}$.

Звернемо увагу на таку обставину. У процесі розв'язання некоректних екстремальних задач за допомогою методу відхилів (або інших методів) вважалося, що задачу пошуку точної нижньої грані можна розв'язати з будь-якою якнайменшою похибкою за значенням функціонала

$$J(v) = \rho_F(Av, f_\delta)$$

визначається похибкою в значенні правої частини u_δ . Величина такої похибки лежить за межами математичного дослідження. Тому тут немає можливості будувати послідовності чисел, що прямують до нуля, та відповідні мінімізуючі послідовності. Однак можна стверджувати, що наближений розв'язок z_δ^* , одержаний у ході мінімізації стабілізатора на множині $F_{\delta, \Omega}$, досить близький

по нормі простору F до точного розв'язку z^* , що відповідає точній правій частині u . Недолік методу відхилів полягає в тому, що непросто побудувати множину $F_{\delta,\Omega}$ або врахувати умову $\rho_U(Az, u_\delta) < \delta$ під час розв'язання задачі мінімізації $\Omega(z)$ на F_Ω .

Розглянемо тепер особливості застосування методу Тихонова; одночасно з'ясуємо зв'язок між цими 2 методами розв'язання некоректних задач для операторних рівнянь.

Нехай Ω_* – точна нижня грань стабілізатора на F_Ω :

$$\Omega_* = \inf_{z \in F_\Omega} \Omega(z).$$

Позначимо через M_* множину елементів $z_* \in F_\Omega$, для яких стабілізатор $\Omega(z)$ досягає значення точної нижньої грані. Розглянемо перетин множин M_* $F_{\delta,\Omega}$. Можливі 2 варіанти:

а) множини M_* і $F_{\delta,\Omega}$ мають спільні елементи, тобто

$$M_* \cap F_{\delta,\Omega} \neq \emptyset;$$

б) множини M_* і $F_{\delta,\Omega}$ не мають спільних елементів, тобто

$$M_* \cap F_{\delta,\Omega} = \emptyset.$$

У першому випадку кожен елемент множини M_* буде регулярним розв'язком операторного рівняння. Такий варіант зустрічається не часто й не викликає особливого інтересу.

Розглянемо другий варіант: $M_* \cap F_{\delta,\Omega} \neq \emptyset$. Уведемо поняття квазімонотонного стабілізатора $\Omega(z)$.

Означення 1.12. Функціонал $\Omega(z)$ називають квазімонотонним на множині F_Ω , якщо на множині $F_\Omega \setminus M_*$ він не має локальних мінімумів.

Для квазімонотонного оператора $\Omega(z)$ доведено таку лему.

Лема 1.1. Точна нижня грань квазімонотонного стабілізатора $\Omega(z)$ на множині $F_{\delta,\Omega}$ за умови, що $M_* \cap F_{\delta,\Omega} = \emptyset$, досягається на елементі $z_\delta \in F_{\delta,\Omega}$, для якого

$$\rho_U(Az_\delta, u_\delta) = \delta.$$

Інакше кажучи, точна нижня грань квазімонотонного стабілізатора досягається на «межі» множини $F_{\delta,\Omega}$.

Ґрунтуючись на цій лемі, можна зробити висновок, що точну нижню грань квазімонотонного стабілізатора слід шукати не на всій множині $F_{\delta,\Omega}$, а лише на «межі» цієї множини, тобто на елементах, які задовольняють строгу рівність

$$\rho_U(Az_\delta, u_\delta) = \delta.$$

Одержуємо задачу мінімізації функціонала $\Omega(z)$ за додаткової умови $\rho_U(Az_\delta, u_\delta) = \delta$. Замінімо цю умову еквівалентною умовою

$$\rho_U^2(Az_\delta, u_\delta) = \delta^2.$$

Застосуємо метод множників Лагранжа. Уведемо множник Лагранжа λ і побудуємо функцію Лагранжа:

$$L(z, \lambda) = \Omega(z) + \lambda [\rho_U^2(Az, u_\delta) - \delta^2] = \Omega(z) + \lambda \rho_U^2(Az, u_\delta) - \lambda \delta^2.$$

Відкинемо $-\lambda \delta^2$, оскільки цей доданок не містить v і тому не впливає на розв'язок задачі мінімізації. Запишемо $L(z, \lambda)$ таким чином:

$$L(z, \lambda) = \lambda \left[\frac{1}{\lambda} \Omega(z) + \rho_U^2(Az, u_\delta) \right] = \lambda \left[\rho_U^2(Az, u_\delta) + \frac{1}{\lambda} \Omega(z) \right].$$

Позначимо $\alpha = \frac{1}{\lambda}$ і введемо функціонал

$$T(z, \lambda) = \rho_U^2(Az, u_\delta) + \alpha \Omega(z).$$

Тоді $L(z, \lambda) = \lambda T(z, \alpha)$.

Оскільки сталий множник не впливає на розв'язок задачі мінімізації то замість функції Лагранжа можна взяти функцію $T(z, \alpha)$. Нехай $J(z) = \rho_U^2(Az, u_\delta)$, тоді функціонал $T(z, \alpha)$ є фактично функціонал Тихонова для задачі мінімізації відхилю $J(z) = \rho_U^2(Az, u_\delta)$. Отже, виникає задача мінімізації функціонала Тихонова F_Ω . Множник α , який відіграє роль параметра регуляції, повинен вибиратися таким чином, щоб для розв'язку z_α задачі мінімізації функціонала Тихонова на F_Ω виконувалась умова

$$\rho_U(Az_\alpha, u_\delta) = \delta.$$

Те, що α не прямує до нуля, а набуває певного конкретного значення, не повинно дивувати, оскільки похибка в правій частині u_δ операторного рівняння також фіксована й не прямує до нуля.

Розглянемо один з можливих алгоритмів визначення α . Задаємо деяку скінчену послідовність $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ значень α і для кожного з цих значень знайдемо елементи $u_1, u_2, \dots, u_k$, для яких функціонал Тихонова $T(z, \alpha)$ досягає значення точної нижньої грані. Для кожного $z_1, z_2, \dots, z_k$ знайдемо відповідні відхилю

$$\rho_U^2(Az, u_\delta), \quad i = 1, 2, \dots, k$$

і побудуємо відповідні точки в системі координат $\alpha \sim \rho_U^2(Az, u_\delta)$.

За цими точками побудуємо графік (Рисунок 1) і знайдемо α_* , таке що

$$\rho_U(Az_\delta, u_\delta) = \delta,$$

як абсцису перетину побудованої кривої з прямою

$$\rho_U^2(Az_\delta, u_\delta) = \delta^2.$$




Рисунок 1.

Саме такий підхід застосовується найчастіше, оскільки він до кінця алгоритмізується. Описаний прийом отримав назву «визначення параметра регуляризації за відхилом».

Доведено, що функція

$$\varphi(\alpha) = \rho_U^2(Az_\alpha, u_\delta)$$

є монотонна і не спадна.

У разі більш сильних припущень функція $\varphi(\alpha)$ є строго монотонно зростаюча, причому завжди існує таке α_* , що $\rho_U(Az_{\alpha_*}, u_\delta) = \delta$.

Зауважимо також, що ми почали виклад із застосування методу відхилів до розв'язання операторних рівнянь і фактично перейшли до методу Тихонова шляхом конкретної реалізації методу відхилів за додаткового припущення, що стабілізатор є квазімонотонний.

1.7.4. Метод регуляризації для інтегрального рівняння Фредгольма першого роду

За допомогою регуляризуючого алгоритму для рівняння Фредгольма I роду з гладким ядром на основі методу А. М. Тихонова, знайдемо наближений розв'язок, який задовольняє інтегральному рівнянню

$$Az = \int_a^b K(x, s)z(s)ds = u(x), \quad x \in [c, d], \quad (1.44)$$

$$K(x, s) \in C([c, d] \times [a, b]), \quad u(x) \in L_2[c, d].$$

Нехай замість u нам відоме таке її наближення u_δ , що $\|u - u_\delta\|_{L_2} \leq \delta$. Нехай із апіорних даних відомо, що $z(s)$ – кусочно-гладка, тоді виберемо $F = W_2^1[a, b]$. Нехай замість $K(x, s)$ відома функція $K_h(x, s)$, що $\|K - K_h\| \leq h$,

тоді $\|A - A_h\|_{W_2^1 \rightarrow L_2} \leq h$, де A_h – інтегральний оператор, який відповідає ядру $K_h(x, s)$.

Використаємо схему побудови регуляризуючого алгоритму А.М. Тихонова, перейдемо від (1.44) до мінімізації функціонала $M^\alpha[z]$, який має вигляд:

$$M^\alpha[z] = \|A_h z - u_\delta\|_{L_2}^2 + \alpha \|z\|_{W_2^1}^2 = \int_c^d \left(\int_a^b K_h(x, s) z(s) ds - u_\delta(x) \right)^2 dx + \alpha \int_a^b [z^2(s) + (z'(s))^2] ds, \quad (1.45)$$

Будуємо скінченновимірну апроксимацію функціонала $M^\alpha[z]$, використовуємо квадратурні формули, для чого вводимо рівномірні сітки по x і по s з кроками відповідно $h_s = (b - a)/n$, $h_x = (d - c)/m$, $s_j = a + (j - 1)h_s$, $x_i = c + (i - 1)h_x$. Позначимо $z(s_j) = z_j$, $u(x_i) = u_i$, $K(x_i, s_j) = a_{ij}$, використаємо квадратурну формулу прямокутників для обчислення інтегралів і апроксимуємо похідну скінченною різницею $z'(s) = \frac{z_{j+1} - z_j}{h_s}$. Таким чином скінченновимірна апроксимація функціонала має вигляд:

$$M^\alpha(z_i) = h_x \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n h_s a_{ij} z_j - u_i \right)^2 + \alpha h_s \sum_{j=1}^n [z_j^2 + z_j'^2] h_s. \quad (1.46)$$

Використаємо необхідну умову мінімуму функціонала:

$$\frac{\partial M^\alpha[z_j]}{\partial z_k} = h_x \sum_{j=1}^m \left(h_s \sum_{i=1}^n a_{ji} z_i - u_j \right) 2 h_s a_{jk} + \alpha h_s \left[2 z_k + 2 \sum_{j=1}^{n-1} \frac{z_j - z_{j+1}}{h_s^2} (\delta_{j+1k} - \delta_{jk}) \right] = 0$$

приходимо до лінійної алгебраїчної системи з симетричною матрицею:

$$B^\alpha z = U, \quad (1.47)$$

де

$$B^\alpha = B + \alpha C, B = \{b_{ik}\}, \quad b_{ik} = h_x h_s \sum_{j=1}^n a_{ji} a_{jk}, U = \{u_k\}, \quad u_k = h_x \sum_{j=1}^m u_j a_{jk}, \quad (1.48)$$

$$C = E + C_1, C_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{h_s^2} & -\frac{1}{h_s^2} & 0 & \dots & 0 \\ -\frac{1}{h_s^2} & \frac{2}{h_s^2} & -\frac{1}{h_s^2} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & -\frac{1}{h_s^2} \\ \dots & \dots & \dots & -\frac{1}{h_s^2} & \frac{1}{h_s^2} \end{pmatrix}. \quad (1.49)$$

Для розв'язання системи (1.47) можна використати різні чисельні методи. При цьому слід враховувати, що матриця системи є симетричною і додатньо визначеною. Одним із найбільш ефективних методів розв'язання таких систем є метод квадратного кореня [16].

В цьому методі симетричну додатньо визначену матрицю B^α записують у вигляді добутку верхньо і нижньо трикутних матриць $B^\alpha = (T^\alpha)^* T^\alpha$, де T^α :

$$T^\alpha = \begin{pmatrix} t_{11}^\alpha & t_{12}^\alpha & \dots & t_{1n}^\alpha \\ 0 & t_{22}^\alpha & \dots & t_{2n}^\alpha \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & t_{nn}^\alpha \end{pmatrix}$$

причому елементи матриці T^α знаходять за формулою:

$$t_{11}^\alpha = \sqrt{b_{11}^\alpha}, \quad t_{1j}^\alpha = \frac{b_{1j}^\alpha}{t_{11}^\alpha}, \quad (j > 1), \quad t_{ii}^\alpha = \left(b_{ii}^\alpha - \sum_{k=1}^{i-1} (t_{ki}^\alpha)^2 \right)^{1/2}, \quad (i = 2, \dots, n),$$

$$t_{ij}^\alpha = \frac{\left(b_{ij}^\alpha - \sum_{k=1}^{i-1} t_{ki}^\alpha t_{kj}^\alpha \right)}{t_{ii}^\alpha}, \quad (i < j); \quad t_{ij}^\alpha = 0, \quad (i > j), \quad (1.50)$$

Таким чином, від системи (1.47) приходимо до розв'язання системи

$$(T^\alpha)^* T^\alpha z_\alpha = U,$$

або, до розв'язання двох систем з трикутними матрицями:

$$\begin{cases} (T^\alpha)^T y = U, \\ T^\alpha u_\alpha = y. \end{cases} \quad (1.51)$$

Слід зауважити, що при виборі параметра регуляризації по принципу узагальненої невязки при розв'язанні (1.44), слід неодноразово при різних α розв'язувати системи (1.51), при цьому права частина системи U і матриця B не залежать від α . Це дозволяє будувати спеціальні економічні методи розв'язання систем (1.51).

Нехай для різних $\alpha > 0$ необхідно розв'язати систему (1.51) або

$$(A_h^* A_h + \alpha C) z^\alpha = A_h^* u, \quad (1.52)$$

де $z^\alpha \in R^n$, $u \in R^m$. Матрицю C визначаємо відповідно до формули (1.49).

Представимо матрицю C у вигляді $C = S^* S$, де S – двухдіагональна матриця. Виконаємо заміну в (1.52) $y^\alpha = S z^\alpha$, ($z^\alpha = S^{-1} y^\alpha$), одержимо

$$(A_h^* A_h + \alpha C) S^{-1} y^\alpha = A_h^* u. \quad (1.53)$$

Домножимо це рівняння зліва на $(S^{-1})^*$, одержимо

$$(D^* D + \alpha E) y^\alpha = D_h^* u, \quad D = A_h S^{-1}. \quad (1.54)$$

Представимо матрицю D у вигляді: $D = QPR$, де $Q(m \times m)$, $R(n \times n)$ – ортогональні матриці, P – права двухдіагональна матриця [16].

Тепер у рівнянні (1.54) зробимо заміну змінних $x^\alpha = R y^\alpha$, ($y^\alpha = R^{-1} x^\alpha$), в результаті одержимо

$$(R^* P^* Q^* QPR + \alpha E) R^{-1} x^\alpha = D_h^* u \quad \text{або} \\ (P^* P + \alpha E) x^\alpha = R D_h^* u = U, \quad (1.55)$$

де матриця $P^* P$ – трьохдіагональна і рівняння (1.55) без проблем розв'язують, наприклад, методом прогонки [16]. Початковий невідомий вектор: $z^\alpha = S^{-1} R^{-1} x^\alpha$, однак, часто немає необхідності повертатись до вектора z^α , оскільки, наприклад, якщо $h=0$, то необхідно лише перевірити умову $\|A_h z^\alpha - u\| = \delta$, яка еквівалентна умові $\|P x^\alpha - Q^* u\| = \delta$.

1.8. Некоректні екстремальні задачі

Переважають більшість математичних задач, виникнення яких обумовлене потребами практики, можна подати у вигляді таких основних форм:

- а) розв'язання операторних рівнянь;
- б) пошук мінімуму функціонала на деякій множині.

Поставимо у відповідність кожному елементу $u \in U$ деяке число $J(v)$. У таких випадках говорять, що на множині V задано функціонал $J(v)$. Екстремальна задача для функціонала $J(v)$ полягає в знаходженні такого елемента $u \in U$, для якого

$$J(u) = \inf_{v \in U} J(v)$$

Для багатьох екстремальних задач можливі формулювання як у вигляді операторного рівняння, так і у вигляді екстремальної задачі. Для прикладу розглянемо задачу Діріхле, тобто задачу знаходження розв'язку $u(x, y)$ рівняння Лапласа

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

в області G двомірного простору.

На межі ∂G області G функція $u(x, y)$ повинна задовольняти умову Діріхле

$$u|_{\partial G} = g(x, y).$$

Так форма запису є операторним рівнянням; роль оператора A відіграє оператор Лапласа Δ ; за множину U можна взяти підмножину метричного простору $C^2(G)$, усі елементи якої задовольняють умову

$$u|_{\partial G} = g.$$

Водночас цю саму задачу можна записати як задачу мінімізації функціонала. Відомо, що формулювання цієї задачі має вигляд: знайти функцію $u \in V$, для якої функціонал

$$J(v) = \int_G \left[\left(\frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right)^2 \right] dG$$

набуває значення точної нижньої грані V . Множина V є підмножиною метричного простору, для всіх елементів якого значення функціонала визначене; на межі ∂G області G функції з V набувають заданих значень.

У загальному випадку перехід від задачі розв'язування операторного рівняння до задачі пошуку мінімуму функціонала можна здійснити за допомогою методу найменших квадратів. Нехай ρ_U – метрика простору, якому належать елементи множини U . Тоді задачі розв'язання операторного рівняння

$$Az = u$$

на множині U відповідає задача пошуку на множині F такого елемента z^* , для якого

$$J(z^*) = \rho_U(Az^*, u) = \inf_{v \in F} \rho_U(Az^*, u) = J(z)$$

Розглянемо тепер сутність проблеми некоректності екстремальних задач. Наведемо спочатку приклад. Розглянемо задачу пошуку функції $y(x)$, для якої функціонал

$$J[y] = \left[\int_0^\pi (x - y(x)) dx \right]^2$$

досягає найменшого значення. Функцію $y(x)$ шукаємо на множині Π неперервних функцій, визначених на відрізку $[0, \pi]$ і так, що $y(0) = 0$, $y(\pi) = \pi$.

Очевидно, що $J[y] \geq 0$, причому $J[y] = 0$ при $y(x) \equiv x$, тобто функція $y(x) = x$ – один із розв'язків варіаційної задачі.

Розглянемо послідовність $\{y_n(x)\}$ функцій вигляду $y_n(x) = x + \sin nx$. Очевидно, що при всіх натуральних n функції $y_n(x)$ належать до множини Π . Тоді

$$J[y_n(x)] = \left[\int_0^\pi \sin nx dx \right]^2 =$$

$$= \left[-\frac{1}{n} \cos nx \Big|_0^\pi \right]^2 = \frac{1}{n^2} [1 - (-1)^n]^2.$$

Очевидно, що

$$\lim_{n \rightarrow \infty} J[y_n(x)] = 0 = J[x].$$

Можна було б сподіватися, що одночасно і $y_n(x) \rightarrow y(x)$. Проте, як не важко переконатися, послідовність функцій $y_n(x) = x + \sin nx$ при $n \rightarrow \infty$ є взагалі розбіжна (у метриці простору $C[0, \pi]$). Це свідчить про те, що малим змінам у значенні функціонала можуть відповідати істотні зміни функції $y(x)$.

Звернемо увагу на те, що під задачею пошуку мінімуму ми фактично розуміємо задачу пошуку точної нижньої грані. Нагадаємо, у чому полягає відмінність між цими поняттями. З одного боку, мінімум функціонала $J(z)$ на множині V – це найменше з усіх значень $J(z)$ для всіх $z \in F$. З іншого боку, число J_* називається точною нижньою гранню функціонала $J(z)$ на множині F , якщо виконуються такі умови:

а) $J(z) \geq J_*, \forall z \in F$;

б) для кожного $\varepsilon > 0$ можна вказати такий елемент $z_\varepsilon \in F$, що

$$J(z_\varepsilon) < J_* + \varepsilon.$$

Пояснимо різницю між мінімумом та точною нижньою гранню. Відмінність полягає в тому, що значення точної нижньої грані не обов'язково є деяке значення функціонала. Для прикладу розглянемо функцію $f(x)$, графік якої показаний на Рисунку 2.




Рисунок 2.

Очевидно, що задача знаходження мінімуму цієї функції не має розв'язку. Проте точна нижня грань існує:

$$\inf_{x \in R} f(x) = 1,$$

але не існує значення x^* , при якому $f(x^*)=1$. Звичайно, такий ефект цілком зрозумілий, оскільки, при $x=0$ функція має розрив. Неперервна функція, задана на замкненому відрізку, згідно з теоремою Вейєрштраса досягає значення точної нижньої грані. Однак теорема Вейєрштраса безпосередньо не переноситься на випадок загальних неперервних функціоналів.

Розглянемо тепер проблеми, що виникають у разі наближеної мінімізації функціоналів. Процедура більшості існуючих методів полягає фактично в побудові так званої мінімізуючої послідовності. Це поняття близько 100 років тому ввів Д. Гільберт в процесі аналізу принципів проблем існування розв'язку екстремальних задач. Послідовність $z^{(0)}, z^{(1)}, \dots, z^{(n)}, \dots, z^{(n)} \in F$ називають мінімізуючою для функціонала $J(v)$, якщо:

- а) $J(z^{(0)}) \geq J(z^{(1)}) \geq \dots \geq J(z^{(n)}) \geq J(z^{(n+1)}) \geq \dots$;
- б) $\lim_{n \rightarrow \infty} J(z^{(n)}) = J_* = \inf_{z \in F} J(z)$.

Якщо точна нижня грань $J(z)$ на множині F є скінченна, то мінімізуючи послідовність завжди існує. Наприклад, задана послідовність чисел $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n, \dots$ таких що

- а) $\varepsilon_1 > \varepsilon_2 > \dots > \varepsilon_n > \varepsilon_{n+1} > \dots$;
- б) $\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_n = 0$.

Згідно з означенням точної нижньої грані для кожного ε_n побудуємо відповідне $z^{(n)} \in F$ з умови

$$J(z^{(n)}) < J_* + \varepsilon_n.$$

Очевидно, що побудована послідовність $\{z^{(n)}\}$ буде мінімізуючою. Ця мінімізуюча послідовність не єдина; згідно з наведеною побудовою існує безліч мінімізуючих послідовностей для даної екстремальної задачі.

Як бачимо, знаходження значення точної нижньої грані функціонала не супроводжується принциповими проблемами. Інша справа – знаходження елемента $u^* \in V$, на якому функціонал $J(v)$ досягає значення точної нижньої грані, тобто такого елемента u^* , для якого

$$J(u^*) = J_* = \inf_{z \in F} J(z). \quad (1.56)$$

Фактично проблема містить 2 питання:

- а) чи буде мінімізуюча послідовність збіжною в метриці відповідного метричного простору;
- б) якщо мінімізуюча послідовність збіжна, то чи буде її границя задовольняти умову (1.56).

Розглянемо приклади, на яких проаналізуємо можливі варіанти поведінки мінімізуючої послідовності.

Дослідимо екстремальну задачу для функції

$$f(x) = \frac{x^2}{1+x^4}.$$

Під множиною F будемо розуміти множину R дійсних чисел із відповідною метрикою.

Неважко переконатися, що точна нижня грань $f(x)$ дорівнює $J_* = 0$ і досягає при $x_* = 0$. Побудуємо приклади мінімізуючи послідовностей.

Очевидно, що послідовність

$$\{x_n\}, x_n = \frac{1}{n}, n = 1, 2, \dots$$

буде мінімізуюча:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x) = 0 = J_*.$$

Розглянемо тепер послідовність

$$\{x_n\}, x_n = n, n = 1, 2, \dots$$

Ця послідовність також є мінімізуюча:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{1 + n^4} = 0 = J_*,$$

однак її границі не існує (мінімізуюча послідовність є розбіжна).

Отже, серед мінімізуючи послідовностей можуть бути і збіжні, і розбіжні. Цікаво, що одна й та ж мінімізуюча послідовність може бути як збіжною, так розбіжною залежно від вибору метрики.

Як приклад, розглянемо задачу мінімізації функціонала

$$J(v) = \int_0^1 v^2(x) dx.$$

Під множиною V будемо розуміти множину всіх функцій $v(x)$, визначених на неперервних на відрізку $[0;1]$. Зрозуміло, що екстремальна задача має єдиний розв'язок $u_* \equiv 0$, причому $J(u_*) = 0$. Надамо множині V властивостей метричного простору, вводючи спосіб вимірювання віддалей. Відомо, що такий спосіб буде не єдиний. Розглянемо такі метрики:

а) метрику гільбертового простору $L_2[0;1]$;

б) метрику простору $C[0;1]$.

У гільбертовому просторі $L_2[0;1]$ віддаль між елементами $u^{(n)}$ мінімізуючої послідовності та розв'язком u_* екстремальної задачі дорівнює

$$\rho^2(u^{(n)}, u_*) = \int_0^1 [u^{(n)}(x) - u_*(x)]^2 dx = \int_0^1 [u^{(n)}(x)]^2 dx = J(u^{(n)}).$$

Згідно з означенням мінімізуючої послідовності

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho^2(u^{(n)}, u_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} J(u^{(n)}) = J_* = 0,$$

тобто будь-яка мінімізуюча послідовність буде збіжною в метриці простору $L_2[0;1]$.

У просторі $C[0;1]$ метрика визначається співвідношенням

$$\|v\|_{C[0,1]} = \max_{x \in [0,1]} |v(x)|.$$

Розглянемо послідовність $\{u^{(n)}(x)\}$, де

$$u^{(n)}(x) = \begin{cases} 1 - |2nx - 1|, & 0 \leq x \leq \frac{1}{n}, \\ 0, & x > \frac{1}{n}. \end{cases} \quad (1.57)$$

Обчислимо значення функціонала на елементах мінімізуючої послідовності:

$$J(u^{(n)}) = \int_0^1 [u^{(n)}(x)]^2 dx = \int_0^{\frac{1}{n}} (1 - |2nx - 1|)^2 dx.$$

Згідно з теоремою про середнє значення

$$J(u^{(n)}) = (1 - |2n\xi - 1|)^2 \frac{1}{n}, \quad \xi \in \left(0, \frac{1}{n}\right).$$

Оскільки функція $1 - |2nx - 1|$ обмежена на $\left[0, \frac{1}{n}\right]$, то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} J(u^{(n)}) = 0 = \inf_{v \in V} (J(v)).$$

Отже, послідовність (1.57) є мінімізуюча. Дослідимо збіжність цієї послідовності в метриці простору $C[0;1]$:

$$\rho(u^{(n)}, u_*) = \max_{x \in [0,1]} |u^{(n)}(x)| = 1 \neq 0.$$

Доходимо висновку, що послідовність (1.57) є розбіжною в $C[0;1]$. Нагадаємо, що в просторі $L_2[0;1]$ будь-яка мінімізуюча послідовність є збіжна, зокрема послідовність (1.57). Як бачимо, проблема розв'язання екстремальних задач тісно пов'язана з вибором метрики та простору.

Ми з'ясували проблеми, які виникають під час мінімізації функціоналів. Сформулюємо тепер поняття коректності екстремальної задачі. Нехай задача

$$J(u) = \inf_{v \in V} J(v). \quad (1.58)$$

має розв'язок, можливо, не єдиний. Позначимо через U_* множину розв'язків цієї екстремальної задачі:

$$U_* = \left\{ u \in V \mid J(u) = J_* = \inf_{v \in V} J(v) \right\}.$$

Позначимо через ρ метрику в метричному просторі, якому належить множина V .

Означення 1.13. Задача (1.58) називається ρ -коректною або коректно сформульованою в метриці ρ , якщо виконуються умови:

- а) точна нижня грань функціонала $J(v)$ є скінченною;
- б) множина U_* розв'язків не порожня;
- в) будь-яка мінімізуюча послідовність $\{u_n\}$ збігається в метриці ρ до одного з елементів множини U_* :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(u^n, u_*) = 0.$$

Підкреслимо, що за такого визначення ми передбачаємо можливість існування не єдиного розв'язку. Зрозуміло, що ключовою в цьому визначенні є умова в). Надалі некоректність екстремальної задачі будемо розуміти саме як порушення умови в).

Означення 1.14. Задачу (1.58) будемо називати ρ -некоректною, якщо:

- а) точна нижня грань $J(v)$ скінченна;
- б) множина U_* не порожня;
- в) існує принаймні одна мінімізуюча послідовність $\{u_n\}$, яка не збігається до жодного з елементів множини U_* .

З'ясуємо, яким чином зроблені визначення узгоджуються з класичним поняттям коректності за Адамаром.

Якщо врахувати зроблене раніше зауваження відносно єдності розв'язку, то мова фактично йде про зв'язок між третьою умовою Адамара та умовою в) в визначенні коректності екстремальної задачі.

Нехай значення J_* відоме з деякою похибкою $\varepsilon > 0$. Тоді екстремальна задача (1.58) – це фактично задача знаходження такого u_* , для якого

$$J(u_*) < J_* + \varepsilon.$$

Зрозуміло, що тоді формально кожен елемент $u^{(n)}$ будь-якої мінімізуючої послідовності, починається з деякого $n > N(\varepsilon)$, може вважатися наближеним розв'язком екстремальної задачі (1.58). Але насправді наближеним розв'язком можуть бути лише елементи мінімізуючої послідовності, яка збігається до точного розв'язку задачі (1.58). Отже, вимога в) фактично означає, що малим відхиленням від значення точної нижньої грані функціонала, тобто малим похибкам в умові задачі, повинні відповідати малі відхилення наближеного розв'язку від точного.

Питання до самоперевірки

1. Які задачі відносяться до некоректно поставлених задач? Навести приклади.
2. Сформулюйте проблема коректності математичних задач.
3. Сформулюйте особливості постановок некоректних задач.
4. Наведіть приклади коректних та некоректних задач (інтегральне рівняння Фредгольма, системи лінійних алгебраїчних рівнянь).
5. У чому полягає некоректність операторних рівнянь?
6. Охарактеризуйте поняття узагальненого розв'язку.
7. Що називають мінімум нев'язки?
8. Вкажіть як знаходиться норма нев'язки.
9. Що називають псевдорозв'язком матричного рівняння?
10. Сформулюйте поняття нормального псевдорозв'язку системи.
11. Наведіть означення псевдооберненої матриці.
12. Що розуміють під скелетним розкладом матриці.
13. Охарактеризуйте поняття ортопроектора.
14. Сформулюйте теорему Кронекера-Капеллі та теорему про альтернативу Фредгольма.
15. У чому полягає метод розв'язків на компактах.
16. Сформулюйте означення квазірозв'язку.
17. Охарактеризуйте процедуру знаходження квазірозв'язків матричного рівняння.
18. Наведіть алгоритм побудови квазірозв'язків некоректних задач для інтегрального рівняння Фредгольма першого роду.
19. У чому полягає метод регуляризації А.М. Тихонова для матричного рівняння?
20. У чому полягає метод регуляризації А.М. Тихонова для операторного рівняння?
21. Вкажіть особливості застосування методу А.М. Тихонова до розв'язання операторних рівнянь.
22. Охарактеризуйте метод регуляризації для інтегрального рівняння Фредгольма першого роду.
23. Охарактеризуйте некоректні екстремальні задачі.

2. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

1. Для матриць вигляду $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \\ b_{41} & b_{42} & b_{43} \end{pmatrix},$

$\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & c_{14} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & c_{24} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} & c_{34} \\ c_{41} & c_{42} & c_{43} & c_{44} \end{pmatrix}$ знайти псевдообернену матрицю двома способами.

Зробити перевірку отриманих результатів.

$$1) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -3 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$2) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 2 & 5 & 0 & 4 \\ 1 & 8 & 0 & 7 \\ 9 & 4 & 0 & 0 \\ 7 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$3) \begin{pmatrix} 6 & 4 & 6 & 1 \\ 4 & 3 & 3 & 3 \\ 4 & 7 & 4 & 6 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 6 & 3 & 4 \\ 0 & 7 & 1 \\ 4 & 6 & 3 \\ 4 & 3 & 6 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & 5 & 1 & 6 \\ 2 & 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$4) \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 5 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 5 \\ 5 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 5 \end{pmatrix}.$$

$$5) \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 5 & 0 & 3 \\ 4 & 0 & 2 \\ 0 & 5 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned}
6) & \begin{pmatrix} 1 & 6 & -7 & -1 \\ 5 & 0 & 3 & -2 \\ -7 & 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 0 & 5 & 7 \\ 1 & -4 & -6 \\ -2 & 0 & 6 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 5 & 7 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \end{pmatrix}. \\
7) & \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}. \\
8) & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \\
9) & \begin{pmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 2 & 0 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 7 & 2 & 0 \\ 8 & 0 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 5 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 6 \\ 0 & 2 & 7 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}. \\
10) & \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ -2 & 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -2 & 0 \\ 2 & 4 & -2 & -2 \end{pmatrix}. \\
11) & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 & 2 \end{pmatrix}. \\
12) & \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 0 & 5 \\ 2 & 6 & 1 & 0 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 5 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 6 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 3 & 6 & 4 & 3 \\ 1 & 1 & 5 & 8 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}. \\
13) & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 5 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
14) & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 10 \\ 2 & 3 & 12 & 9 \\ 4 & 6 & 1 & 1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 0 \\ 4 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 5 \\ 4 & 3 & 6 & 9 \\ 2 & 0 & 4 & 10 \\ 0 & 2 & 7 & 1 \end{pmatrix}. \\
15) & \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}. \\
16) & \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 4 & 5 & 0 & 6 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 8 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 1 \\ 4 & 2 & 5 \\ 6 & 4 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 2 & 3 & 8 & 3 \\ 0 & 4 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}. \\
17) & \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 1 \\ 5 & 1 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & 4 & 7 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 1 & 4 & 3 \\ 0 & 2 & 5 \\ 8 & 1 & 1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 & 5 & 9 & 3 \\ 2 & 6 & 10 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 8 & 2 & 6 \end{pmatrix}. \\
18) & \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \\ 6 & 1 & 3 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \\ 3 & 9 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}. \\
19) & \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -3 \\ 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}. \\
20) & \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 5 & 1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & -1 \\ 2 & -2 & 0 & -3 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}. \\
21) & \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -2 & 6 & -1 \\ 0 & 0 & -3 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
22) & \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 & 1 \\ 3 & 2 & 9 & 2 \\ 2 & 4 & 14 & 4 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 8 & 5 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \\ 7 & 9 & 3 \\ 4 & 6 & 5 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 1 & -5 & 3 & 1 \\ 3 & -7 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -6 & 3 & 1 \end{pmatrix}. \\
23) & \begin{pmatrix} -2 & -3 & 0 & 1 \\ 1 & 5 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} -2 & -3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ -2 & -3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \\
24) & \begin{pmatrix} -3 & 1 & 4 & 0 \\ 3 & -1 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 7 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 3 & -3 \\ 0 & 3 & 3 & 0 \end{pmatrix}. \\
25) & \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ -2 & -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 8 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & 4 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & -1 & -3 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}. \\
26) & \begin{pmatrix} -1 & 0 & -4 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 3 & -4 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} -4 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 0 & -5 & 0 & -4 \\ 0 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 7 & -7 & 0 \end{pmatrix}. \\
27) & \begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 2 \\ -6 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} -3 & 0 & -5 \\ 4 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ -2 & 3 & 6 & 7 \end{pmatrix}. \\
28) & \begin{pmatrix} 5 & 5 & -5 & -5 \\ 2 & 2 & -2 & -2 \\ -4 & -4 & 4 & 4 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} -5 & 1 & 2 \\ -3 & -1 & -2 \\ -6 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 6 \\ 1 & 0 & 0 & -6 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \\
29) & \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 3 & 4 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 8 & 1 & 8 \\ 1 & 9 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} -5 & -4 & 3 & 0 \\ 5 & 4 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

$$30) \begin{pmatrix} 5 & 5 & 1 & 5 \\ 6 & 1 & 6 & 6 \\ -1 & -6 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} -8 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 9 & 9 & -1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. Знайти псевдорозв'язок $\tilde{x} = (\tilde{x}_1, \tilde{x}_2)^T$ рівняння $Ax = b$, де A – матричний оператор. Знайти регуляризований розв'язок $\tilde{x} = (x_1^\alpha, x_2^\alpha)^T$, який апроксимує псевдорозв'язок $\tilde{x} = (\tilde{x}_1, \tilde{x}_2)^T$ з точністю до 3-х правильних знаків методом регуляризації академіка А.М. Тихонова.

- | | |
|--|---|
| 1. $\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 = 5,9999; \\ 3x_1 + 4x_2 = 6. \end{cases}$ | 16. $\begin{cases} -2x_1 + 9x_2 = 3,9999; \\ -2x_1 + 9x_2 = 4. \end{cases}$ |
| 2. $\begin{cases} -x_1 + 4x_2 = 8,9999; \\ -x_1 + 4x_2 = 9. \end{cases}$ | 17. $\begin{cases} 10x_1 - 2x_2 = 2,9999; \\ 10x_1 - 2x_2 = 3. \end{cases}$ |
| 3. $\begin{cases} 5x_1 - 9x_2 = 0,9999; \\ 5x_1 - 9x_2 = 1. \end{cases}$ | 18. $\begin{cases} -7x_1 + 5x_2 = 10,9999; \\ -7x_1 + 5x_2 = 11. \end{cases}$ |
| 4. $\begin{cases} -2x_1 + 3x_2 = 8,9999; \\ -2x_1 + 3x_2 = 9. \end{cases}$ | 19. $\begin{cases} 6x_1 + 3x_2 = 4,9999; \\ 6x_1 + 3x_2 = 5. \end{cases}$ |
| 5. $\begin{cases} 7x_1 - 5x_2 = 1,9999; \\ 7x_1 - 5x_2 = 2. \end{cases}$ | 20. $\begin{cases} -10x_1 + 7x_2 = 7,9999; \\ -10x_1 + 7x_2 = 8. \end{cases}$ |
| 6. $\begin{cases} -5x_1 + 6x_2 = 3,9999; \\ -5x_1 + 6x_2 = 4. \end{cases}$ | 21. $\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 = 0,9999; \\ 3x_1 + 4x_2 = 1. \end{cases}$ |
| 7. $\begin{cases} 2x_1 + 6x_2 = 9,9999; \\ 2x_1 + 6x_2 = 10. \end{cases}$ | 22. $\begin{cases} -7x_1 + 4x_2 = 2,9999; \\ -7x_1 + 4x_2 = 3. \end{cases}$ |
| 8. $\begin{cases} x_1 - 11x_2 = 1,9999; \\ x_1 - 11x_2 = 2. \end{cases}$ | 23. $\begin{cases} 5x_1 - 9x_2 = 4,9999; \\ 5x_1 - 9x_2 = 5. \end{cases}$ |
| 9. $\begin{cases} 12x_1 + 7x_2 = 5,9999; \\ 12x_1 + 7x_2 = 6. \end{cases}$ | 24. $\begin{cases} -12x_1 + x_2 = 1,9999; \\ -12x_1 + x_2 = 2. \end{cases}$ |
| 10. $\begin{cases} -3x_1 + 8x_2 = 7,9999; \\ -3x_1 + 8x_2 = 8. \end{cases}$ | 25. $\begin{cases} 7x_1 + 6x_2 = 3,9999; \\ 7x_1 + 6x_2 = 4. \end{cases}$ |
| 11. $\begin{cases} 10x_1 + 3x_2 = 9,9999; \\ 10x_1 + 3x_2 = 10. \end{cases}$ | 26. $\begin{cases} -5x_1 + 4x_2 = 6,9999; \\ -5x_1 + 4x_2 = 7. \end{cases}$ |
| 12. $\begin{cases} -6x_1 + x_2 = 0,9999; \\ -6x_1 + x_2 = 1. \end{cases}$ | 27. $\begin{cases} 5x_1 + 6x_2 = 2,9999; \\ 5x_1 + 6x_2 = 3. \end{cases}$ |

$$13. \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 = 5,9999; \\ 3x_1 + 2x_2 = 6. \end{cases}$$

$$14. \begin{cases} -11x_1 + 3x_2 = 6,9999; \\ -11x_1 + 3x_2 = 7. \end{cases}$$

$$15. \begin{cases} 9x_1 + 4x_2 = 7,9999; \\ 9x_1 + 4x_2 = 8. \end{cases}$$

$$28. \begin{cases} -3x_1 - 11x_2 = 8,9999; \\ -3x_1 - 11x_2 = 9. \end{cases}$$

$$29. \begin{cases} x_1 + 7x_2 = 5,9999; \\ x_1 + 7x_2 = 6. \end{cases}$$

$$30. \begin{cases} -5x_1 + x_2 = 0,9999; \\ -5x_1 + x_2 = 1. \end{cases}$$

3. Знайти квазірозв'язок рівняння $Ax=b$, де $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 5 & -2 & -3 \\ n+1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,

$b = \begin{pmatrix} n+2 \\ n+5 \\ n+3 \end{pmatrix}$, n – номер варіанту. У якості норми розглянути $\|x\|_3 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$; у

якості компакта використовувати $M: \|x\|_3 \leq 1$:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 5 & -2 & -3 \\ n+1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} n+2 \\ n+5 \\ n+3 \end{pmatrix}, \quad n - \text{номер варіанту.}$$

Знайти псевдорозв'язок рівняння $Ax=b$. Знайти псевдорозв'язок рівняння $Ax=b$, використовуючи теорію псевдообертання. Порівняти отримані результати. Зробити висновки.

3. ЗРАЗОК ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

Приклад 3.1. Знайти двома способами псевдообернену матрицю для матриці:

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Розв'язання. Для розв'язання задачі використаємо теорію з підпункту 1.4. Знайдемо псевдообернену матрицю за означенням, тобто за формулою $Q^+ = S^+ R^+ = S^* (SS^*)^{-1} (R^* R)^{-1} R^*$, де $Q = RS$ – скелетний розклад матриці Q , а $*$ означає операцію транспонування.

Ранг матриці Q дорівнює 3, тому виберемо в якості матриці R матрицю:

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Тоді, очевидно, що в якості матриці S треба взяти матрицю:

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Запишемо транспоновані матриці:

$$R^* = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad S^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Перемноживши матриці S і S^* та R і R^* , знайдемо матриці, обернені до добутоків:

$$(SS^*)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (R^* R)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{12}{41} & -\frac{7}{41} & \frac{6}{41} \\ -\frac{7}{41} & \frac{15}{41} & -\frac{7}{82} \\ \frac{6}{41} & -\frac{7}{82} & \frac{59}{246} \end{pmatrix}.$$

Далі обчислимо Q^+ :

$$Q^+ = S^* (SS^*)^{-1} (R^* R)^{-1} R^* =$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{12}{41} & -\frac{7}{41} & \frac{6}{41} \\ -\frac{7}{41} & \frac{15}{41} & -\frac{7}{82} \\ \frac{6}{41} & -\frac{7}{82} & \frac{59}{246} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \\
&= \begin{pmatrix} \frac{13}{41} & \frac{5}{41} & -\frac{3}{41} & \frac{17}{41} \\ -\frac{11}{41} & \frac{1}{82} & \frac{12}{41} & -\frac{13}{82} \\ \frac{40}{123} & -\frac{67}{246} & \frac{16}{123} & \frac{17}{82} \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Знайдемо псевдообернену матрицю Q^+ іншим способом, а саме за формулою $Q^+ = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} Q^*(QQ^* + \varepsilon I_n)^{-1}$, ($n=4$):

$$W = QQ^* + \varepsilon I_n = \begin{pmatrix} 2+\varepsilon & -3 & -2 & -1 \\ -3 & 9+\varepsilon & 3 & 5 \\ -2 & 3 & 11+\varepsilon & 5 \\ -1 & 5 & 5 & 5+\varepsilon \end{pmatrix}.$$

Знайдемо обернену матрицю W^{-1} , до матриці W . Елементи матриці W^{-1} дорівнюють:

$$\begin{aligned}
w_{11} &= \frac{\varepsilon^3 + 25\varepsilon^2 + 140\varepsilon + 100}{\varepsilon(\varepsilon^3 + 27\varepsilon^2 + 176\varepsilon + 246)}, \quad w_{12} = \frac{3\varepsilon^2 + 37\varepsilon + 70}{\varepsilon(\varepsilon^3 + 27\varepsilon^2 + 176\varepsilon + 246)}, \\
w_{13} &= \frac{2(\varepsilon^2 + 7\varepsilon + 20)}{\varepsilon(\varepsilon^3 + 27\varepsilon^2 + 176\varepsilon + 246)}, \quad w_{14} = \frac{\varepsilon^2 - 5\varepsilon - 90}{\varepsilon(\varepsilon^3 + 27\varepsilon^2 + 176\varepsilon + 246)}, \\
w_{21} &= \frac{3\varepsilon^2 + 37\varepsilon + 70}{\varepsilon(\varepsilon^3 + 27\varepsilon^2 + 176\varepsilon + 246)}, \quad w_{22} = \frac{\varepsilon^3 + 18\varepsilon^2 + 57\varepsilon + 49}{\varepsilon(\varepsilon^3 + 27\varepsilon^2 + 176\varepsilon + 246)}, \\
w_{23} &= -\frac{3\varepsilon^2 - 10\varepsilon - 28}{\varepsilon(\varepsilon^3 + 27\varepsilon^2 + 176\varepsilon + 246)}, \quad w_{24} = -\frac{5\varepsilon^2 + 47\varepsilon + 63}{\varepsilon(\varepsilon^3 + 27\varepsilon^2 + 176\varepsilon + 246)}, \\
w_{31} &= \frac{2(\varepsilon^2 + 7\varepsilon + 20)}{\varepsilon(\varepsilon^3 + 27\varepsilon^2 + 176\varepsilon + 246)}, \quad w_{32} = -\frac{3\varepsilon^2 - 10\varepsilon - 28}{\varepsilon(\varepsilon^3 + 27\varepsilon^2 + 176\varepsilon + 246)}, \\
w_{33} &= \frac{\varepsilon^3 + 16\varepsilon^2 + 38\varepsilon + 16}{\varepsilon(\varepsilon^3 + 27\varepsilon^2 + 176\varepsilon + 246)}, \quad w_{34} = -\frac{5\varepsilon^2 + 38\varepsilon + 36}{\varepsilon(\varepsilon^3 + 27\varepsilon^2 + 176\varepsilon + 246)}, \\
w_{41} &= \frac{\varepsilon^2 - 5\varepsilon - 90}{\varepsilon(\varepsilon^3 + 27\varepsilon^2 + 176\varepsilon + 246)}, \quad w_{42} = -\frac{5\varepsilon^2 + 47\varepsilon + 63}{\varepsilon(\varepsilon^3 + 27\varepsilon^2 + 176\varepsilon + 246)}, \\
w_{43} &= -\frac{5\varepsilon^2 + 38\varepsilon + 36}{\varepsilon(\varepsilon^3 + 27\varepsilon^2 + 176\varepsilon + 246)}, \quad w_{44} = -\frac{\varepsilon^3 + 22\varepsilon^2 + 117\varepsilon + 81}{\varepsilon(\varepsilon^3 + 27\varepsilon^2 + 176\varepsilon + 246)}.
\end{aligned}$$

Знайдемо матрицю $V = Q^*(QQ^* + \varepsilon I_n)^{-1}$. Елементи матриці V дорівнюють:

$$\begin{aligned} v_{11} &= \frac{2(5\varepsilon + 39)}{\varepsilon^3 + 27\varepsilon^2 + 176\varepsilon + 246}, \quad v_{12} = \frac{2\varepsilon^2 + 23\varepsilon + 30}{\varepsilon^3 + 27\varepsilon^2 + 176\varepsilon + 246}, \\ v_{13} &= \frac{\varepsilon^2 - 18}{\varepsilon^3 + 27\varepsilon^2 + 176\varepsilon + 246}, \quad v_{14} = \frac{2\varepsilon^2 + 29\varepsilon + 102}{\varepsilon^3 + 27\varepsilon^2 + 176\varepsilon + 246}, \\ v_{21} &= -\frac{\varepsilon^2 + 156\varepsilon + 66}{\varepsilon^3 + 27\varepsilon^2 + 176\varepsilon + 246}, \quad v_{22} = \frac{\varepsilon^2 + \varepsilon + 3}{\varepsilon^3 + 27\varepsilon^2 + 176\varepsilon + 246}, \\ v_{23} &= \frac{3\varepsilon^2 + 38\varepsilon + 72}{\varepsilon^3 + 27\varepsilon^2 + 176\varepsilon + 246}, \quad v_{24} = \frac{\varepsilon^2 + \varepsilon - 39}{\varepsilon^3 + 27\varepsilon^2 + 176\varepsilon + 246}, \\ v_{31} &= -\frac{\varepsilon^2 + 21\varepsilon + 80}{\varepsilon^3 + 27\varepsilon^2 + 176\varepsilon + 246}, \quad v_{32} = -\frac{2\varepsilon^2 + 36\varepsilon + 67}{\varepsilon^3 + 27\varepsilon^2 + 176\varepsilon + 246}, \\ v_{33} &= \frac{\varepsilon^2 + 24\varepsilon + 32}{\varepsilon^3 + 27\varepsilon^2 + 176\varepsilon + 246}, \quad v_{34} = \frac{3(2\varepsilon + 17)}{\varepsilon^3 + 27\varepsilon^2 + 176\varepsilon + 246}. \end{aligned}$$

Знайдемо Q^+ , обчисливши границю:

$$Q^+ = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} V = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \begin{pmatrix} v_{11} & v_{12} & v_{13} & v_{14} \\ v_{21} & v_{22} & v_{23} & v_{24} \\ v_{31} & v_{32} & v_{33} & v_{34} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{13}{41} & \frac{5}{41} & -\frac{3}{41} & \frac{17}{41} \\ -\frac{11}{41} & \frac{1}{82} & \frac{12}{41} & -\frac{13}{82} \\ \frac{40}{123} & -\frac{67}{246} & \frac{16}{123} & \frac{17}{82} \end{pmatrix}.$$

Приклад 3.2. Знайти псевдорозв'язок $\tilde{x} = (\tilde{x}_1, \tilde{x}_2)^*$ рівняння $Ax = b$.

Знайти регуляризований розв'язок $\tilde{x} = (x_1^\alpha, x_2^\alpha)^*$, який апроксимує псевдорозв'язок $\tilde{x} = (\tilde{x}_1, \tilde{x}_2)^*$ з точністю до 3-х правильних знаків методом регуляризації академіка А.М. Тихонова.

Розв'язання. Нехай $Ax = b$ має вигляд:

$$\begin{cases} 3x_1 - 7x_2 = 0,9999; \\ 3x_1 - 7x_2 = 1. \end{cases}$$

Знайдемо ранг матриці A і ранг розширеної матриці:

$$\text{rang } A = \text{rang} \begin{pmatrix} 3 & -7 \\ 3 & -7 \end{pmatrix} = 1; \quad \text{rang}(A|B) = \text{rang} \begin{pmatrix} 3 & -7 & 0,9999 \\ 3 & -7 & 1 \end{pmatrix} = 2,$$

отже, система $Ax = b$ несумісна, тобто розв'язку в звичайному сенсі не існує. Знайдемо псевдорозв'язок цього рівняння.

Для цього знайдемо розв'язок системи:

$$A^*Ax = A^*b,$$

де $A^* = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ -7 & -7 \end{pmatrix}$. Обчислимо елементи відповідних матриць:

$$A^* \cdot A = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ -7 & -7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -7 \\ 3 & -7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 18 & -42 \\ -42 & 98 \end{pmatrix},$$

$$A^* \cdot b = \begin{pmatrix} 5,9997 \\ -13,9993 \end{pmatrix}.$$

Система $A^*Ax = A^*b$ приймає вигляд:

$$\begin{cases} 18x_1 - 42x_2 = 5,9997; \\ -42x_1 + 98x_2 = -13,9993, \end{cases} \text{ або } \begin{cases} -42x_1 + 98x_2 = -13,9993; \\ -42x_1 + 98x_2 = -13,9993. \end{cases}$$

Нехай x_1 – довільна змінна, тоді маємо що:

$$x_2 = \frac{18x_1 - 5,9997}{42}.$$

Псевдорозв'язок задачі знаходимо на основі розв'язку задачі мінімізації квадрата норми $\|x\|^2 = x_1^2 + x_2^2$, тобто знайдемо:

$$\min \left\{ x_1^2 + \left(\frac{18x_1 - 5,9997}{42} \right)^2 \right\}.$$

Позначимо $\varphi(x_1) = x_1^2 + \left(\frac{18x_1 - 5,9997}{42} \right)^2$ і використовуючи необхідну умову екстремуму $\varphi'(x_1) = 0$, знайдемо x_1 . Спростимо $\varphi(x_1)$:

$$\begin{aligned} \varphi(x_1) &= x_1^2 + \left(\frac{18x_1 - 5,9997}{42} \right)^2 = \\ &= 1,183673469x_1^2 - 0,1224428571x_1 + 0,020406122250. \end{aligned}$$

Обчислимо похідну:

$$\begin{aligned} \varphi'(x_1) &= 2,367346938x_1 - 0,1224428571, \\ 2,367346938x_1 - 0,1224428571 &= 0, \end{aligned}$$

тоді маємо:

$$x_1 = 0,05172155172$$

$$\text{Позначимо } \tilde{x}_1 \approx 0,05172, \text{ тоді } \tilde{x}_2 = \frac{18 \cdot 0,05172 - 5,9997}{42} \approx -0,12068.$$

Далі будемо вважати систему $\begin{cases} 3x_1 - 7x_2 = 0,9999; \\ 3x_1 - 7x_2 = 1, \end{cases}$ – точною, а систему

$\begin{cases} 3x_1 - 7,0001x_2 = 1; \\ 3x_1 - 7x_2 = 1, \end{cases}$ наближеною. Запишемо матриці (згідно з теорією підрозділу 1.5):

$$A_h = \begin{pmatrix} 3 & -7,0001 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}, b_h = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Тоді маємо:

$$\|b_\delta - b\| = 0,0001, \quad \delta = 0,0001, \quad h = 0,0001.$$

Застосуємо метод регуляризації. Виберемо $\alpha = \sqrt{\delta} = \sqrt{h} = 0,01$. Запишемо систему:

$$\begin{aligned} (A_h^* \cdot A_h + \alpha E)x^\alpha &= A_h^* \cdot b_\delta \\ \begin{cases} 18,01x_1 - 42,0003x_2 = 6; \\ -42,0003x_1 + 98,0114x_2 = -14,0001. \end{cases} \end{aligned}$$

Розв'яжемо її:

$$\begin{cases} x_1^\alpha = 0,05171903335; \\ x_2^\alpha = -0,1206786668. \end{cases}$$

Тоді розв'язок $(x_1^\alpha; x_2^\alpha)^*$ – апроксимує псевдорозв'язок $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2)^*$ з точністю до чотирьох знаків після коми.

Приклад 3.3. Знайти квазірозв'язок рівняння $Ax=b$, де $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 7 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 6 \end{pmatrix}$,

$b = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$. У якості норми розглянути $\|x\|_3 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$; у якості компакта

використовувати $M: \|x\|_3 \leq 1$. Знайти псевдорозв'язок рівняння $Ax=b$. Знайти псевдорозв'язок рівняння $Ax=b$, використовуючи теорію псевдообертання.

Розв'язання. Очевидно, що $\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 7 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 6 \end{vmatrix} = 0$. Задача є некоректно

поставленою, знайдемо її квазірозв'язок. Складемо функціонал:

$$f(x) = f(x_1, x_2, x_3) = \|Ax - b\|_3^2,$$

$$\|Ax - b\|_3^2 = (2x_1 - 2)^2 + (7x_1 - 2)^2 + (x_1 + 5x_2 + 6x_3 - 2)^2,$$

де потрібно знайти $\min f(x)$ при $\|x\|_3 \leq 1$, тобто маємо задачу на умовний екстремум. Складемо допоміжну функцію Лагранжа ($\varphi(x_1, x_2, x_3) = \|x\|_3^2 - 1$ – рівняння зв'язку):

$$F(x_1, x_2, x_3, \lambda) = \|Ax - b\|_3^2 + \lambda(\|x\|_3^2 - 1),$$

$$F(x_1, x_2, x_3, \lambda) = (2x_1 - 2)^2 + (7x_1 - 2)^2 + (x_1 + 5x_2 + 6x_3 - 2)^2 + \lambda(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 1).$$

Знайдемо екстремум функції $F(x_1, x_2, x_3, \lambda)$. Використаємо необхідну умову екстремуму:

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x_1} = 108x_1 + 10x_2 + 12x_3 - 40 + 2\lambda x_1 = 0; \\ \frac{\partial F}{\partial x_2} = 10x_1 + 50x_2 + 60x_3 - 20 + 2\lambda x_2 = 0; \\ \frac{\partial F}{\partial x_3} = 12x_1 + 60x_2 + 72x_3 - 24 + 2\lambda x_3 = 0; \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 1 = 0. \end{cases} \quad (3.1)$$

Розглянемо перші три рівняння системи (3.1), та розв'яжемо отриману систему відносно параметра λ .

$$\begin{cases} x_1(54 + \lambda) + 5x_2 + 6x_3 = 20; \\ 5x_1 + x_2(25 + \lambda) + 30x_3 = 10; \\ 6x_1 + 30x_2 + x_3(36 + \lambda) = 12. \end{cases} \quad (3.2)$$

Розв'яжемо цю систему методом Крамера, тобто: $x_i = \frac{\Delta_i}{\Delta}$, $i = 1, 2, 3$, де

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} 54 + \lambda & 5 & 6 \\ 5 & 25 + \lambda & 30 \\ 6 & 30 & 36 + \lambda \end{vmatrix} = \lambda^3 + 115\lambda^2 + 3233\lambda, \\ \Delta_1 &= \begin{vmatrix} 20 & 5 & 6 \\ 10 & 25 + \lambda & 30 \\ 12 & 30 & 36 + \lambda \end{vmatrix} = 20\lambda^2 + 1098\lambda, \\ \Delta_2 &= \begin{vmatrix} 54 + \lambda & 20 & 6 \\ 5 & 10 & 30 \\ 6 & 12 & 36 + \lambda \end{vmatrix} = 10\lambda^2 + 440\lambda, \\ \Delta_3 &= \begin{vmatrix} 54 + \lambda & 5 & 20 \\ 5 & 25 + \lambda & 10 \\ 6 & 30 & 12 \end{vmatrix} = 12\lambda^2 + 528\lambda. \end{aligned}$$

Одержимо розв'язки у вигляді:

$$x_1 = \frac{20\lambda^2 + 1098\lambda}{\lambda^3 + 115\lambda^2 + 3233\lambda} = \frac{20\lambda + 1098}{\lambda^2 + 115\lambda + 3233}, \quad (3.3)$$

$$x_2 = \frac{10\lambda^2 + 440\lambda}{\lambda^3 + 115\lambda^2 + 3233\lambda} = \frac{10\lambda + 440}{\lambda^2 + 115\lambda + 3233}, \quad (3.4)$$

$$x_3 = \frac{12\lambda^2 + 528\lambda}{\lambda^3 + 115\lambda^2 + 3233\lambda} = \frac{12\lambda + 528}{\lambda^2 + 115\lambda + 3233}. \quad (3.5)$$

Підставимо (3.3)-(3.5) в четверте рівняння системи (3.1), отримаємо рівняння відносно параметра λ :

$$\left(\frac{20\lambda + 1098}{\lambda^2 + 115\lambda + 3233}\right)^2 + \left(\frac{10\lambda + 440}{\lambda^2 + 115\lambda + 3233}\right)^2 + \left(\frac{12\lambda + 528}{\lambda^2 + 115\lambda + 3233}\right)^2 - 1 = 0,$$

$$(20\lambda + 1098)^2 + (10\lambda + 440)^2 + (12\lambda + 528)^2 - (\lambda^2 + 115\lambda + 3233)^2 = 0,$$

$$\lambda^4 + 230\lambda^3 + 19047\lambda^2 + 678198\lambda + 8774301 = 0. \quad (3.6)$$

Застосуємо програмний пакет СКА *Maple* для знаходження коренів рівняння (3.6), а саме функцію *fsolve*:

$$fsolve(\lambda^4 + 230\lambda^3 + 19047\lambda^2 + 678198\lambda + 8774301 = 0, \lambda).$$

Маємо два корні: $\lambda_1 = -90,53351324$ та $\lambda_2 = -35,53306653$. Знайдені корені λ_1 та λ_2 підставляємо у формули (3.3)-(3.5).

Для λ_1 :

$$x_1 = -0,700094468; \quad (3.7)$$

$$x_2 = -0,4571238173; \quad (3.8)$$

$$x_3 = -0,5485485809. \quad (3.9)$$

Для λ_2 :

$$x_1 = 0,946353036; \quad (3.10)$$

$$x_2 = 0,20686656923; \quad (3.11)$$

$$x_3 = 0,248238830. \quad (3.12)$$

Підставимо знайдені значення (3.7)-(3.12) у функцію $\|Ax - b\|_3^2$:

$$f(x) = \|Ax - b\|_3^2 = (2x_1 - 2)^2 + (7x_1 - 2)^2 + (x_1 + 5x_2 + 6x_3 - 2)^2,$$

$$f_1(x) = f_1(x_1, x_2, x_3) = 127,6892233, \quad (3.13)$$

$$f_2(x) = f_1(x_1, x_2, x_3) = 23,55848293. \quad (3.14)$$

Серед знайдених значень (3.13)-(3.14) вибираємо найменше. В даному випадку — це $f_2(x) = 23,55848293$, тобто значення (3.10)-(3.12) утворюють квазірозв'язок операторного рівняння $Ax = b$:

$$x = \begin{pmatrix} 0,946353036 \\ 0,20686656923 \\ 0,248238830 \end{pmatrix}.$$

Знайдемо псевдорозв'язок рівняння $Ax = b$. Для цього необхідно знайти розв'язок системи $A^*Ax = A^*b$ з найменшою нормою. Запишемо необхідні матриці:

$$A^* = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 1 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix},$$

$$A^*A = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 1 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 7 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 54 & 5 & 6 \\ 5 & 25 & 30 \\ 6 & 30 & 36 \end{pmatrix},$$

$$A^*b = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 1 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 \\ 10 \\ 12 \end{pmatrix}.$$

В результаті одержимо систему $A^*Ax = A^*b$ у вигляді:

$$\begin{cases} 54x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 20; \\ 5x_1 + 25x_2 + 30x_3 = 10; \\ 6x_1 + 30x_2 + 36x_3 = 12. \end{cases} \quad (3.15)$$

Знайдемо ранг матриці системи, а потім ранг розширеної матриці системи. Для цього виконаємо такі перетворення:

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 54 & 5 & 6 \\ 5 & 25 & 30 \\ 6 & 30 & 36 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & -1325 & -1590 \\ 5 & 25 & 30 \\ 6 & 30 & 36 \end{pmatrix} \sim \\ & \sim \begin{pmatrix} 0 & -1325 & -1590 \\ 0 & 0 & 0 \\ 6 & 30 & 36 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 6 & 30 & 36 \\ 0 & -1325 & -1590 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ & \text{тобто } \text{rang}(A^*A) = \text{rang} \begin{pmatrix} 6 & 30 & 36 \\ 0 & -1325 & -1590 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2. \end{aligned}$$

У системи (3.15) визначник дорівнює нулю, тому приведемо розширену матрицю системи (3.15) до трикутного вигляду і одну з змінних, наприклад x_3 , позначимо через λ :

$$\begin{pmatrix} 54 & 5 & 6 & 20 \\ 5 & 25 & 30 & 10 \\ 6 & 30 & 36 & 12 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 5 & 6 & 2 \\ 0 & 265 & 318 & 88 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Враховуючи позначення $x_3 = \lambda$, маємо таку систему:

$$\begin{cases} x_1 + 5x_2 + 6\lambda = 2; \\ 265x_2 + 318\lambda = 88. \end{cases} \quad (3.16)$$

Остаточно маємо:

$$x_1 = \frac{18}{53}, \quad x_2 = \frac{88}{265} - \frac{6}{5}\lambda, \quad x_3 = \lambda. \quad (3.17)$$

Оскільки норма розв'язку повинна бути мінімальною, то псевдорозв'язок знаходимо на основі розв'язку задачі $\min \{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2\}$:

$$\min \{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2\} = \min \left\{ \left(\frac{18}{53} \right)^2 + \left(\frac{88}{265} - \frac{6}{5}\lambda \right)^2 + \lambda^2 \right\}.$$

Позначивши мінімізуючу функцію через $\varphi(\lambda)$ і використовуючи необхідну умову екстремуму $\varphi'(\lambda) = 0$, знаходимо

$$\varphi(\lambda) = \frac{61}{25}\lambda^2 - \frac{1056}{1325}\lambda + \frac{15844}{70225},$$

$$\varphi'(\lambda) = \frac{122}{25}\lambda - \frac{1056}{1325} = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{528}{3233}.$$

Враховуючи (3.17), псевдорозв'язок системи дорівнює:

$$x = \begin{pmatrix} 0,3396226415 \\ 0,1360965048 \\ 0,1633158058 \end{pmatrix}.$$

Знайдемо псевдорозв'язок рівняння $Ax = b$, використовуючи теорію псевдообертання.

Система завжди має єдиний псевдорозв'язок, який визначається формулою $x^+ = A^+b$, де A^+ можна знайти за наступною формулою:

$$A^+ = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} A^* (AA^* + \varepsilon I_n)^{-1},$$

де I_n – одинична матриця. Запишемо необхідні матриці:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 7 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 6 \end{pmatrix}, \quad A^* = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 1 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix},$$

$$AA^* + \varepsilon I_n = \begin{pmatrix} 4 & 14 & 2 \\ 14 & 49 & 7 \\ 2 & 7 & 62 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \varepsilon & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4+\varepsilon & 14 & 2 \\ 14 & 49+\varepsilon & 7 \\ 2 & 7 & 62+\varepsilon \end{pmatrix}.$$

Знайдемо обернену матрицю $(AA^* + \varepsilon I_n)^{-1}$. Для цього обчислимо визначник і відповідні алгебраїчні доповнення до елементів матриці. Маємо наступне:

$$\det(AA^* + \varepsilon I_n) = \begin{vmatrix} 4+\varepsilon & 14 & 2 \\ 14 & 49+\varepsilon & 7 \\ 2 & 7 & 62+\varepsilon \end{vmatrix} = \varepsilon(\varepsilon^2 + 115\varepsilon + 3233),$$

$$(AA^* + \varepsilon I_n)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{\varepsilon^2 + 111\varepsilon + 2989}{\varepsilon(\varepsilon^2 + 115\varepsilon + 3233)} & -\frac{14(\varepsilon + 61)}{\varepsilon(\varepsilon^2 + 115\varepsilon + 3233)} & -\frac{2}{\varepsilon^2 + 115\varepsilon + 3233} \\ -\frac{14(\varepsilon + 61)}{\varepsilon(\varepsilon^2 + 115\varepsilon + 3233)} & \frac{\varepsilon^2 + 66\varepsilon + 244}{\varepsilon(\varepsilon^2 + 115\varepsilon + 3233)} & -\frac{7}{\varepsilon^2 + 115\varepsilon + 3233} \\ -\frac{2}{\varepsilon^2 + 115\varepsilon + 3233} & -\frac{7}{\varepsilon^2 + 115\varepsilon + 3233} & \frac{\varepsilon + 53}{\varepsilon^2 + 115\varepsilon + 3233} \end{pmatrix}.$$

Далі обчислимо матрицю

$$A^*(AA^* + \varepsilon I_n)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2(\varepsilon + 61)}{\varepsilon^2 + 115\varepsilon + 3233} & \frac{7(\varepsilon + 61)}{\varepsilon^2 + 115\varepsilon + 3233} & \frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + 115\varepsilon + 3233} \\ -\frac{10}{\varepsilon^2 + 115\varepsilon + 3233} & -\frac{35}{\varepsilon^2 + 115\varepsilon + 3233} & -\frac{5(\varepsilon + 53)}{\varepsilon^2 + 115\varepsilon + 3233} \\ -\frac{12}{\varepsilon^2 + 115\varepsilon + 3233} & -\frac{42}{\varepsilon^2 + 115\varepsilon + 3233} & -\frac{6(\varepsilon + 53)}{\varepsilon^2 + 115\varepsilon + 3233} \end{pmatrix}$$

і перейдемо до границі:

$$\begin{aligned} A^+ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} A^*(AA^* + \varepsilon I_n)^{-1} = \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \begin{pmatrix} \frac{2(\varepsilon + 61)}{\varepsilon^2 + 115\varepsilon + 3233} & \frac{7(\varepsilon + 61)}{\varepsilon^2 + 115\varepsilon + 3233} & \frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + 115\varepsilon + 3233} \\ -\frac{10}{\varepsilon^2 + 115\varepsilon + 3233} & -\frac{35}{\varepsilon^2 + 115\varepsilon + 3233} & -\frac{5(\varepsilon + 53)}{\varepsilon^2 + 115\varepsilon + 3233} \\ -\frac{12}{\varepsilon^2 + 115\varepsilon + 3233} & -\frac{42}{\varepsilon^2 + 115\varepsilon + 3233} & -\frac{6(\varepsilon + 53)}{\varepsilon^2 + 115\varepsilon + 3233} \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} \frac{2}{53} & \frac{7}{53} & 0 \\ -\frac{10}{3233} & -\frac{35}{3233} & \frac{5}{61} \\ -\frac{12}{3233} & -\frac{42}{3233} & \frac{6}{61} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Тоді псевдорозв'язок задачі має вигляд:

$$x^+ = \begin{pmatrix} \frac{2}{53} & \frac{7}{53} & 0 \\ -\frac{10}{3233} & -\frac{35}{3233} & \frac{5}{61} \\ -\frac{12}{3233} & -\frac{42}{3233} & \frac{6}{61} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{18}{53} \\ \frac{440}{3233} \\ \frac{528}{3233} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,3396226415 \\ 0,1360965048 \\ 0,1633158058 \end{pmatrix}.$$

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

А

Альтернатива Фредгольма, 15

І

Інтегральне рівняння, 10

Інтегральне рівняння Фредгольма
другого роду, 10
першого роду, 10

К

Квазімонотонний, 30
стабілізатор, 30
функціонал, 30

Квазірозв'язки

матричного рівняння, 20
некоректних задач для
інтегрального рівняння
Фредгольма першого роду, 22

Квазірозв'язок рівняння, 19

Коректно поставлена задача (за
Адамаром), 6

Коректно сформульована задача в
метриці, 40

М

Матричне рівняння, 10

Метод квазірозв'язків, 19

Метод регуляризації

А.М. Тихонова, 24
для матричного рівняння, 24
для операторного рівняння, 27

Метод розв'язків на компактах, 16

Метод Тихонова, 29

Мінімум нев'язки, 12

Н

Некоректні екстремальні задачі, 35

Некоректно поставлені задачі, 6

Нормальний розв'язок, 13

Нуль-простір, 15

О

Операторні рівняння, 9
другого роду, 10
першого роду, 10

Ортопроектор, 14

П

Параметр регуляризації, 25

Погано обумовлені СЛАР, 7

Похибка, 24

Приклади некоректних задач, 7

Проекція елемента, 20

Псевдообернена матриця, 13

Псевдорозв'язок, 13

матричного рівняння, 13

СЛАУ, 13

Р

Регуляризована система, 25

Регуляризоване сімейство
наближених розв'язків, 24

Регуляризуючий алгоритм, 24

С

Системи рівнянь (СЛАР), 12

Скелетний розклад матриці, 13

Стійка на просторах задача, 6

Т

Теорема Кронекера-Капеллі, 15

ДОДАТОК А. ВІДОМОСТІ З ФУНКЦІОНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

ОСНОВНІ МЕТРИЧНІ ПРОСТОРИ

Простір	Елементи простору	Метрика
X_d	Простір з дискретною метрикою – довільна множина X з метрикою $d(x, y)$.	Для $x, y \in X$ $d(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1, & x \neq y. \end{cases}$
s	Простір всіх числових послідовностей $x = \{x_k\}_{k=1}^{\infty}$, $x_k \in R$ (або $x_k \in C$).	Для $x = \{x_k\}_{k=1}^{\infty}$, $y = \{y_k\}_{k=1}^{\infty} \in s$ $\rho(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{ x_k - y_k }{1 + x_k - y_k }$
B_0	Простір числових послідовностей $x = \{x_k\}_{k=1}^{\infty}$, $x_k \in N$.	Для $x = \{x_k\}_{k=1}^{\infty}$, $y = \{y_k\}_{k=1}^{\infty} \in B_0$ $\rho(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y, \\ \frac{1}{k}, & x \neq y. \end{cases}$ де k – номер першої координати, для якої $x_k \neq y_k$.
N	Простір натуральних чисел	Для $x, y \in N$ $\rho(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1 + \frac{1}{x + y}, & x \neq y. \end{cases}$

ОСНОВНІ НОРМОВАНІ ПРОСТОРИ

Простір	Елементи простору	Метрика
$R^n(C^n)$	n -вимірний простір векторів $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $x_i \in R$ (або $x_i \in C$), $i = 1, 2, \dots, n$	$\ x\ = \left(\sum_{i=1}^n x_i ^2 \right)^{\frac{1}{2}}$
l_p	Простір послідовностей $x = \{x_k\}_{k=1}^{\infty}$, таких що $\sum_{k=1}^n x_k ^p < \infty$, де $1 \leq p < \infty$.	$\ x\ = \left(\sum_{k=1}^{\infty} x_k ^p \right)^{\frac{1}{p}}$
$l_{\infty}(M)$	Простір обмежених послідовностей $x = \{x_i\}_{i=1}^{\infty}$, таких що $\sup_i x_i < \infty$.	$\ x\ = \sup_i x_i $
c	Простір збіжних послідовностей $x = \{x_i\}_{i=1}^{\infty}$.	$\ x\ = \sup_i x_i $
c_0	Простір послідовностей $x = \{x_i\}_{i=1}^{\infty}$, збіжних до нуля, тобто $\lim_{n \rightarrow \infty} x_i = 0$.	$\ x\ = \max_i x_i $
c^n	Простір векторів $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $x_i \in R$ (або $x_i \in C$), $i = 1, 2, \dots, n$.	$\ x\ = \max_i x_i $
$C[a; b]$	Простір неперервних на відрізку $[a; b]$ функцій $x = x(t)$.	$\ x\ = \max_{t \in [a; b]} x(t) $
$C_p[a; b]$	Простір неперервних на відрізку $[a; b]$ функцій $x = x(t)$ з нормою $\ \cdot\ _p$, де $1 \leq p < \infty$	$\ x\ = \left(\int_a^b x(t) ^p dt \right)^{\frac{1}{p}}$
$C^n[a; b]$	Простір n раз неперервно диференційовних на відрізку $[a; b]$ функцій $x = x(t)$.	$\ x\ = \sum_{k=0}^n \max_{t \in [a; b]} x^{(k)}(t) $
$L_p[a; b]$	Простір класів еквівалентних функцій $x = x(t)$, сумовних за Лебегом з степенем p на відрізку $[a; b]$, де $1 \leq p < \infty$, тобто таких що $\int_a^b x(t) ^p dt < \infty$.	$\ x\ = \left(\int_a^b x(t) ^p dt \right)^{\frac{1}{p}}$

Навчальне видання
(українською мовою)

Гребенюк Сергій Миколайович
Панасенко Євген Валерійович
Тітова Ольга Олександрівна

МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ НЕКОРЕКТНИХ ЗАДАЧ

Навчальний посібник
для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
і освітнього рівня «магістр»
спеціальності «Математика»

Рецензент *М.І. Клименко*
Відповідальний за випуск *С.М. Гребенюк*
Коректор *Є.В. Панасенко*