

КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН



ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII						
1	1	H ¹ ВОДОРОД 1,01						(H)	He ² ГЕЛИЙ 4,00	атомный номер обозначение элемента 12,01 6 C УГЛЕРОД относительная атомная масса					
2	2	Li ³ ЛИТИЙ 6,94	Be ⁴ БЕРИЛЛИЙ 9,01	B ⁵ БОР 10,81	C ⁶ УГЛЕРОД 12,01	N ⁷ АЗОТ 14,01	O ⁸ КИСЛОРОД 16,00	F ⁹ ФТОР 19,00	Ne ¹⁰ НЕОН 20,18						
3	3	Na ¹¹ НАТРИЙ 22,99	Mg ¹² МАГНИЙ 24,31	Al ¹³ АЛЮМИНИЙ 26,98	Si ¹⁴ КРЕМНИЙ 28,09	P ¹⁵ ФОСФОР 30,97	S ¹⁶ СЕРА 32,06	Cl ¹⁷ ХЛОР 35,45	Ar ¹⁸ АРГОН 39,95						
4	4	K ¹⁹ КАЛИЙ 39,10	Ca ²⁰ КАЛЬЦИЙ 40,08	Sc ²¹ СКАНДИЙ 44,96	Ti ²² ТИТАН 47,90	V ²³ ВАНАДИЙ 50,94	Cr ²⁴ ХРОМ 52,00	Mn ²⁵ МАРГАНЕЦ 54,94	Fe ²⁶ ЖЕЛЕЗО 55,85						
	5	Cu ²⁹ МЕДЬ 63,55	Zn ³⁰ ЦИНК 65,38	Ga ³¹ ГАЛЛИЙ 69,72	Ge ³² ГЕРМАНИЙ 72,59	As ³³ МЫШЬЯК 74,92	Se ³⁴ СЕЛЕН 78,96	Br ³⁵ БРОМ 79,90	Kr ³⁶ КРИПТОН 83,80	Co ²⁷ КОБАЛЬТ 58,93	Ni ²⁸ НИКЕЛЬ 58,70				
5	6	Rb ³⁷ РУБИДИЙ 85,47	Sr ³⁸ СТРОНЦИЙ 87,62	Y ³⁹ ИТРИЙ 88,91	Zr ⁴⁰ ЦИРКОНИЙ 91,22	Nb ⁴¹ НИОБИЙ 92,91	Mo ⁴² МОЛИБДЕН 95,94	Tc ⁴³ ТЕХНЕЦИЙ 98,91	Ru ⁴⁴ РУТЕНИЙ 101,07	Rh ⁴⁵ РОДИЙ 102,91	Pd ⁴⁶ ПАЛЛАДИЙ 106,42				
	7	Ag ⁴⁷ СЕРЕБРО 107,87	Gd ⁴⁸ КАДМИЙ 112,41	In ⁴⁹ ИНДИЙ 114,82	Sn ⁵⁰ ОЛОВО 118,69	Sb ⁵¹ СУРЬМА 121,75	Te ⁵² ТЕЛЛУР 127,60	I ⁵³ ИОД 126,90	Xe ⁵⁴ КСЕНОН 131,30						
6	8	Cs ⁵⁵ ЦЕЗИЙ 132,91	Ba ⁵⁶ БАРИЙ 137,33	La ⁵⁷ ЛАНТАН 138,91	Hf ⁷² ГАФИЙ 178,49	Ta ⁷³ ТАНТАЛ 180,95	W ⁷⁴ ВОЛЬФРАМ 183,85	Re ⁷⁵ РЕНИЙ 186,21	Os ⁷⁶ ОСМИЙ 190,20	Ir ⁷⁷ ИРИДИЙ 192,22	Pt ⁷⁸ ПЛАТИНА 195,09				
	9	Au ⁷⁹ ЗОЛОТО 196,97	Hg ⁸⁰ РУТУТЬ 200,59	Tl ⁸¹ ТАЛЛИЙ 204,37	Pb ⁸² СВИНЕЦ 207,20	Bi ⁸³ ВИСМУТ 208,98	Po ⁸⁴ ПОЛОНИЙ [209]	At ⁸⁵ АСТАТ [210]	Rn ⁸⁶ РАДОН [222]						
7	10	Fr ⁸⁷ ФРАНЦИЙ [223]	Ra ⁸⁸ РАДИЙ 226,03	Ac ⁸⁹ АКТИНИЙ [227]	Ku ¹⁰⁴ КУРЧАТОВИЙ [261]	Ns ¹⁰⁵ НИЛЬСБОРИЙ [261]	106 [263]	107 [262]	108 [265]						
* ЛАНТАНОИДЫ															
	58	Ce ⁵⁸ ЦЕРИЙ 140,12	Pr ⁵⁹ ПРАЗЕОДИМ 140,91	Nd ⁶⁰ НЕОДИМ 144,24	Pm ⁶¹ ПРОМЕТИЙ [145]	Sm ⁶² САМАРИЙ 150,40	Eu ⁶³ ЕВРОПИЙ 151,96	Gd ⁶⁴ ГАДОЛИНИЙ 157,25	Tb ⁶⁵ ТЕРБИЙ 158,93	Dy ⁶⁶ ДИСПРОЗИЙ 162,50	Ho ⁶⁷ ГОЛЬМИЙ 164,93	Er ⁶⁸ ЭРБИЙ 167,26	Tm ⁶⁹ ТУЛИЙ 168,93	Yb ⁷⁰ ИТТЕРБИЙ 173,04	Lu ⁷¹ ЛЮТЕЦИЙ 174,97
** АКТИНОИДЫ															
	90	Th ⁹⁰ ТОРИЙ 232,04	Pa ⁹¹ ПРОТАКТИНИЙ 231,04	U ⁹² УРАН 238,03	Np ⁹³ НЕПУНИЙ 237,05	Pu ⁹⁴ ПЛУТОНИЙ [244]	Am ⁹⁵ АМЕРИЦИЙ [243]	Cm ⁹⁶ КЮРИЙ [247]	Bk ⁹⁷ БЕРКЛИЙ [247]	Cf ⁹⁸ КАЛИФОРНИЙ [251]	Es ⁹⁹ ЭЙНШТЕЙНИЙ [254]	Fm ¹⁰⁰ ФЕРМИЙ [257]	Md ¹⁰¹ МЕНДЕЛЕВИЙ [258]	(No) ¹⁰² НОБЕЛИЙ [255]	(Lr) ¹⁰³ ЛОУРЕНСИЙ [256]

КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

Под редакцией
А. А. Равделя и А. М. Пономаревой

Издание девятое

Согласовано с Государственной службой стандартных справочных данных

Библиотека Московской
государственной академии
тонкой химической техно-
логии им. М.В.Ломоносова

Санкт-Петербург
Специальная Литература

1999

Составители:

Н. М. Барон, А. М. Пономарева, А. А. Равдель, З. Н. Тимофеева

Рецензент

кандидат химических наук В. А. Рабинович

Краткий справочник физико-химических величин. Издание девятое/Под ред. А. А. Равделя и А. М. Пономаревой.—СПб.: Специальная Литература, 1998.—232 с.: ил.

ISBN 5-86457-116-4

Приведены таблицы важнейших физико-химических величин, используемых при изучении физической химии, в лабораторной практике и при различных физико-химических расчетах. В настоящем издании материал пересмотрен по современным литературным источникам и значительно обновлен и дополнен.

Предназначен для научных и инженерно-технических работников, а также для студентов вузов и техникумов, аспирантов и преподавателей.

УДК 030 50 53

Содержание

Предисловие	8
-------------	---

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Единицы измерения физических величин	9
2. Основные физические постоянные	10
3. Атомная единица массы и переход от массы к энергии	11
4. Соотношения между единицами измерения и значения часто встречающихся величин	11
5. Способы выражения концентраций и соотношения между ними	11

СВОЙСТВА РАСТВОРИТЕЛЕЙ И РАСТВОРОВ

6. Свойства органических растворителей	12
7. Показатели преломления жидкостей при 20 °С	14
8. Показатели преломления водных растворов при 20 °С	15
9. Плотность воды в интервале —10÷100 °С	15
10. Плотность жидкостей в интервале 0—60 °С	16
11. Плотность растворов солей в воде	18
12. Плотность растворов неорганических кислот и оснований в воде при 20 °С	19
13. Плотность растворов органических соединений в воде при 20 °С	19
14. Поверхностное натяжение жидкостей в интервале 0—60 °С	20
15. Дипольные моменты функциональных групп молекул	22
16. Дипольные моменты молекул газообразных веществ	24
17. Дипольные моменты молекул жидких веществ	24
18. Относительная диэлектрическая проницаемость систем вода—органическое вещество	24

ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ

19. Растворимость газов в воде	25
20. Парциальные давления компонентов растворов	26
21. Давление насыщенного пара воды, льда и переохлажденной воды при различной температуре	28
22. Давление насыщенного пара ртути в интервале —40÷358 °С	29
23. Давление насыщенного пара металлов в интервале 400—2000 К	29
24. Температура возгонки или кипения некоторых веществ при давлении ниже атмосферного или равно ему	30
25. Температура возгонки или кипения некоторых веществ при давлении выше атмосферного	36
26. Температура диссоциации твердых веществ при различном давлении	36
27. Давление пара над кристаллогидратами при различной температуре	37
28. Равновесия фаз в одно-, двух- и трехкомпонентных системах	38
29. Коэффициенты распределения некоторых веществ между жидкими фазами	44

ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ И РАСТВОРЕНИЯ. ТЕПЛОЕМКОСТЬ

30. Теплота сгорания некоторых веществ в стандартных условиях	45
31. Интегральная теплота растворения солей в воде при 25 °С	46
32. Интегральная теплота растворения кислот и оснований в воде при 25 °С	48
33. Интегральная теплота растворения солей, образующих кристаллогидраты, при 25 °С	48
34. Интегральная теплота растворения солей в ацетоне, этиленгликоле, этаноле и метаноле	49

35. Интегральная теплота растворения иодида натрия в водно-диоксидных растворах при 25 °С	50
36. Теплота смешения жидкостей при 25 °С	51
37. Энтальпия сольватации галогенидов щелочных металлов в различных растворителях при 25 °С	53
38. Удельная теплоемкость водных растворов	53
39. Истинные атомные и молекулярные изобарные теплоемкости в интервале 10—298 К	54
40. Средняя теплоемкость простых веществ и соединений	56

ХИМИЧЕСКИЕ РАВНОВЕСИЯ

41. Термодинамические константы равновесия важнейших газовых реакций в зависимости от температуры	63
42. Критические параметры простых веществ и соединений	66
43. Коэффициенты активности реальных газов	69
44. Термодинамические свойства простых веществ, соединений и ионов в водных растворах и в жидком аммиаке	72
45. Величина M_n для вычисления стандартного изменения энергии Гиббса по методу Темкина и Шварцмана	92
46. Термодинамические функции линейного гармонического осциллятора (по Эйнштейну)	93
47. Характеристическая температура кристаллических веществ	95
48. Термодинамические колебательные функции кристаллических веществ (по Дебаю)	96
49. Логарифмы констант равновесия реакций образования некоторых веществ	98
50. Приведенная энергия Гиббса, приращение энтальпии и стандартная теплота образования (при $T = 0$ К) некоторых веществ в состоянии идеального газа	102
51. Эмпирические данные и зависимости для вычисления термодинамических величин	108

ЯВЛЕНИЯ ПЕРЕНОСА

52. Вязкость газов при 25 °С и атмосферном давлении	111
53. Вязкость воды в интервале 5—100 °С	111
54. Вязкость жидкостей в интервале 0—60 °С	112
55. Вязкость водных растворов в зависимости от концентрации	114
56. Вязкость водных растворов электролитов	115
57. Коэффициенты диффузии газов в воздухе при нормальном атмосферном давлении	117
58. Коэффициенты самодиффузии неэлектролитов в жидкостях при нормальном атмосферном давлении	117
59. Коэффициенты диффузии электролитов в водных растворах в зависимости от температуры и состава	117
60. Коэффициенты диффузии в твердых телах	119
61. Удельная электрическая проводимость предельно чистой воды, перегнанной в вакууме	119
62. Удельная электрическая проводимость растворов KCl в интервале 0—30 °С	119
63. Молярная электрическая проводимость разбавленных водных растворов электролитов при 25 °С	120
64. Числа переноса катионов в водных растворах электролитов при 25 °С	122
65. Предельная молярная электрическая проводимость ионов в воде в интервале 0—100 °С	123
66. Электрическая проводимость растворов слабых кислот и оснований при 25 °С	125

РАВНОВЕСИЯ В РАСТВОРАХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ

67. Ионное произведение воды в интервале 0—100 °С	126
68. Значения функции кислотности при 25 °С	126
69. Константы кислотности в воде при 18 °С	127
70. pH стандартных растворов	128
71. Осмотические коэффициенты электролитов в водных растворах при 25 °С	129
72. Средние ионные коэффициенты активности сильных электролитов в водных растворах при 25 °С	130
73. Средние ионные коэффициенты активности электролитов в водных растворах в интервале 0—60 °С	133
74. Соотношения между концентрацией, активностью и средним ионным коэффициентом активности электролитов разного типа	135
75. Константы диссоциации слабых кислот и оснований в водных растворах при 25 °С	136
76. Характеристики кислотно-основных индикаторов	138
77. Константы нестойкости комплексных соединений	139
78. Произведение растворимости при 25 °С	142

ТЕРМОДИНАМИКА И КИНЕТИКА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

79. Стандартные электродные потенциалы в водных растворах при 25 °С	143
80. Потенциалы металлов в жидком аммиаке	147
81. Температурные коэффициенты электродвижущей силы	147
82. Диффузионные потенциалы в водных растворах при 25 °С	148
83. Влияние поверхностно-активного вещества на межфазный скачок потенциала	149
84. Значения множителя $2,303 RT/F$ в интервале 0—100 °С	149
85. Работа выхода электронов	149
86. Потенциалы нулевого заряда	150
87. Токи обмена	151
88. Перенапряжение при выделении водорода	153
89. Свойства гидратированного электрона	155

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И КВАНТОВО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕЩЕСТВА

90. Паракоры атомов и связей (по Квейлу)	155
91. Атомные рефракции (по Эйзенлору)	156
92. Поляризуемость молекул	156
93. Парциальные молярные рефракции водных растворов солей	157
94. Ионные рефракции	157
95. Дипольный момент молекул, диэлектрическая проницаемость и поляризация жидкостей	158
96. Удельное вращение оптически активных веществ	159
97. Энергия (потенциал) ионизации и сродство атомов к электрону. Электроотрицательность атомов по Полингу	161
98. Энергия (потенциал) ионизации и сродство к электрону молекул и радикалов	162
99. Нормированные волновые функции водородоподобных атомов	163
100. Квантовые числа и термы атомов	163
101. Термы двухатомных молекул	165
102. Молекулярные диаграммы по Хьюкелю (ЛКАО—МОХ)	167
103. Симметрия молекул	169
104. Гибридизация и симметрия молекул	173

МОЛЕКУЛЯРНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ

105. Чисто вращательные спектры	174
106. Колебательно-вращательные спектры молекул	175
107. Константы двухатомных молекул	177

108. Главные моменты инерции молекул	179
109. Активность колебаний в инфракрасных спектрах и спектрах комбинационного рассеяния	180
110. Строение и константы многоатомных молекул газообразных веществ	182
111. Силовые постоянные связей в двухатомных и многоатомных молекулах	187
112. Характеристические частоты поглощения групп атомов в молекулах	188
113. Длина межатомных связей в молекулах	191
114. Углы между связями в молекулах	192
115. Степень ионности связи в комплексных ионах и в двухатомных молекулах	192

МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА АТОМОВ И МОЛЕКУЛ

116. Магнитные моменты молекул и ионов	193
117. Диамагнитная восприимчивость атомов и связей (по Паскалю)	194
118. Химические сдвиги протонов относительно тетраметилсилана	195

КРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕЩЕСТВА

119. Симметрия кристаллов и кристаллические решетки	196
120. Параметры кубической решетки	198
121. Корреляция между координационным числом и отношением ионных радиусов	199
122. Постоянные кристаллических решеток	199
123. Радиусы атомов и ионов в кристаллах	200
124. Вандерваальсовы радиусы атомов	201
125. Радиусы ионов в бесконечно разбавленных растворах (по Робинсону и Стоксу)	201
126. «Термохимические» радиусы ионов	201
127. Значения постоянной Маделунга	201
128. Энергия кристаллических решеток	202

КИНЕТИКА ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

129. Кинетические диаметры атомов и молекул	203
130. Общая систематизация гомогенных реакций	203
131. Кинетические параметры гомогенных реакций	204
132. Применимость уравнения Аррениуса к гомогенным реакциям между газами	208
133. Отношения параметров уравнения Аррениуса при реакциях Меншуткина в бензоле и различных растворителях	209
134. Константы скорости реакций Меншуткина в растворах галогенпроизводных бензола	209
135. Корреляционные соотношения в ряду ароматических соединений	211
136. Константы скорости инверсии сахарозы в 0,05 М серной кислоте в зависимости от состава раствора и температуры	212
137. Константы скорости щелочного омыления сложных эфиров	212
138. Константы скорости реакций нуклеофильного замещения	212
139. Константы скорости быстрых реакций между молекулами или между ионами	213
140. Константы скорости реакций в газовой и в жидкой фазах	213
141. Константы скорости продолжения и обрыва цепей в реакциях полимеризации при 25 °С	214
142. Константы скорости реакций мономеров с ингибиторами полимеризации	214
143. Колебательное возбуждение в реакциях обмена	215
144. Критическая фотохимическая энергия разложения молекул	215
145. Квантовый выход фотохимических реакций	216
146. Среднее время жизни электроновозбужденных атомов	217
147. Энтальпия образования радикалов	217

148. Энергия активации реакций разложения в отсутствие или в присутствии катализатора	217
149. Энергия активации каталитических реакций	218
150. Энергия разрыва связей (энергия диссоциации) в молекулах и радикалах газообразных веществ при 298 К в основном состоянии	218

АДСОРБЦИЯ И ГЕТЕРОГЕННЫЙ КАТАЛИЗ

151. Адсорбция криптона на древесном угле при 193,5 К	219
152. Теплота адсорбции газов при низких давлениях	219
153. Скорость адсорбции водорода пленками железа	219
154. Отравление катализатора и структура адсорбирующихся веществ	220
Литература	221
Указатель	227

Предисловие

За восемь лет, прошедших со времени предыдущего издания «Краткого справочника физико-химических величин», многие из приводившихся ранее величин были пересмотрены и уточнены, изменилась также теоретическая и практическая значимость некоторых разделов физической химии. Это потребовало от авторов при подготовке нового издания существенно переработать справочник как в отношении его содержания, так и с точки зрения уровня достоверности представленных в нем сведений.

Авторы стремились дать в справочнике, хотя и в сжатой форме, но систематический и по возможности широкий набор современных физико-химических характеристик. В настоящее издание введено много новых таблиц и расширен ряд разделов (свойства растворителей и растворов, явления переноса — вязкость и диффузия в газах и растворах, сведения по симметрии молекул и кристаллов, магнитные свойства атомов и молекул, молекулярные диаграммы, молекулярные спектры, кинетика реакций в растворах, адсорбция, катализ и ингибирование и т. п.).

Существенно пересмотрен раздел химической термодинамики: приведена функция ΔG_f° , $_{298}$ (что отвечает пожеланиям многих читателей), проверены или вновь составлены уравнения $C_p = f(T)$, рассчитаны значения логарифмов констант образования веществ в достаточно широком интервале температур, приведены и другие данные для вычисления констант химических равновесий различными способами, причем достигнуто согласование рассчитываемых величин.

Таблицы сгруппированы по разделам, что облегчит пользование справочником. Численным данным в необходимых случаях предпосланы краткие теоретические введения.

Все величины приведены в единицах СИ или дольных и кратных единицах. В отдельных случаях параллельно с единицами СИ сохранены и общепотребительные внесистемные. Численные значения, как правило, округлены с сохранением необходимой для практических расчетов точности. Недостаточно надежные и оценочные величины заключены в скобки.

Для краткости вместо температуры 298,15 К (и аналогичных) указывается целое число 298 К (и т. п.).

Номенклатура соединений приведена в основном в соответствии с указаниями ИЮПАК. В большинстве таблиц неорганические вещества расположены по алфавиту формул, органические — в порядке возрастания числа атомов углерода, водорода, галогенов, кислорода, азота. В некоторых, преимущественно небольших, таблицах принято логическое расположение — по типам реакций, по порядку в Периодической системе.

В конце справочника приведена литература — как использованная для его составления, так и полезная в качестве краткой библиографии по соответствующему разделу.

Приведенные в справочнике данные в соответствии с ГОСТ 8.310—78 относятся к категории информационных.

Авторы благодарят всех, приславших критические замечания к седьмому изданию, а также участников обсуждения (Киев, май 1981 г.) проекта восьмого издания на научно-методическом совете МВ и ССО СССР по химии (сектор физической химии). Особую признательность авторы выражают редактору издательства С. Л. Томарченко за незаменимую помощь в подготовке к печати последних пяти изданий справочника и исключительно внимательному рецензенту доценту В. А. Рабиновичу за ряд полезных предложений.

Все замечания по новому изданию будут приняты также с благодарностью.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Единицы измерения физических величин

Международная система единиц (СИ) предусматривает использование следующих основных единиц:

Длина — метр	Термодинамическая температура — кельвин
Масса — килограмм	Сила света — кандела
Время — секунда	Количество вещества — моль
Сила электрического тока — ампер	

Обозначения единиц измерения

Название	Обозначение		Название	Обозначение	
	русское	международное		русское	международное
Ампер	А	A	Миллиметр	мм	mm
Ангстрем	Å	Å	ртутного столба	рт. ст.	Hg
Атмосфера	атм	atm	Минута	мин	min
Бар	бар	bar	Моль	моль	mol
Ватт	Вт	W	Ньютои	Н	N
Вольт	В	V	Ом	Ом	Ω
Гаусс	Гс	Gs	Паскаль	Па	Pa
Герц	Гц	Hz	Пуаз	П	P
Грамм	г	g	Сантиметр	см	cm
Дебай	Д	D	Секунда	с	s
Джоуль	Дж	J	Сименс	См	S
Дина	дн	dyn	Тесла	Т	T
Калория	кал	cal	Торр (мм рт. ст.)	тор	torr
Кельвин	К	K	Фарада	Ф	F
Килограмм	кг	kg	Час	ч	h
Кулон	Кл	C	Электронвольт	эВ	eV
Литр	л	l	Эрг	эрг	erg
Метр	м	m			
Микрон	мк	μ			

Десятичные приставки к названиям единиц

Приставка	Обозначение		Множитель	Приставка	Обозначение		Множитель
	русское	международное			русское	международное	
Тера	Т	T	10^{12}	санти	с	c	10^{-2}
Гига	Г	G	10^9	милли	м	m	10^{-3}
Мега	М	M	10^6	микро	мк	μ	10^{-6}
кило	к	k	10^3	нано	н	n	10^{-9}
гекто	г	h	10^2	пико	п	p	10^{-12}
дека	да	da	10	фемто	ф	f	10^{-15}
деци	д	d	10^{-1}	атто	а	a	10^{-18}

2. Основные физические постоянные

Постоянная	Обозначение	Значение	Погрешность последних знаков	Единицы измерения	
				СИ	СГС
Скорость света в вакууме Диэлектрическая проницаемость вакуума (электрическая постоянная) Магнитная проницаемость вакуума (магнитная постоянная) Элементарный заряд	c	2,99792458	1	$\times 10^8$ м/с	$\times 10^{10}$ см/с
	ϵ_0	8,85418782	7	10^{-12} Ф/м	$\epsilon = 1$
	μ_0	1,2566	1	10^{-7} Гс/м	$\mu = 1$
	e	1,6021892	46	10^{-19} Кл	10^{-20} см ^{1/2} ·г ^{1/2} /с **
	m_e	4,80298	20	—	10^{-30} (см ^{3/2} ·г ^{1/2})/с **
	m_p	9,109534	47	10^{-31} кг	10^{-28} г
	m_n	1,6726485	86	10^{-27} кг	10^{-24} г
	F	1,6749543	86	10^{-27} кг	10^{-24} г
	k	9,648456	27	10^4 Кл/моль	10^3 см ^{1/2} ·г ^{1/2} /с **
	h	1,380662	44	10^{-23} Дж/К	10^{-16} эрг/К
Постоянная Фарадея Больцмана Планка Ридберга газовая Радиус Бора (первый) Магнетон Бора Ядерный магнетон Магнитный момент электрона » » протона Число Авогадро	R	6,626176	36	10^{-34} Дж·с	10^{-27} эрг·с
	k	1,054589	36	10^{-34} Дж·с	10^{-27} эрг·с
	h	1,097373177	83	10^7 м ⁻¹	10^5 см ⁻¹
	R_∞	8,31441	26	Дж/(К·моль)	10^7 эрг/(град·моль)
	a_0	5,2917706	44	10^{-11} м	10^{-9} см
	μ_B	9,274078	36	10^{-24} Дж/Т	10^{-21} эрг/Гс
	μ_N	5,050824	20	10^{-27} Дж/Т	10^{-24} эрг/Гс
	μ_e	9,284832	36	10^{-24} Дж/Т	10^{-21} эрг/Гс
	μ_p	1,410617	55	10^{-26} Дж/Т	10^{-23} эрг/Гс
	N_A	6,022045	31	10^{-3} моль ⁻¹	10^{23} моль ⁻¹

* В единицах СГСМ.
** В единицах СГСЭ.
** 1 моль однозарядных частиц.

3. Атомная единица массы и переход от массы к энергии

Атомная масса изотопа ^{12}C равна 12 (точно).
Атомная единица массы (а. е. м.) равна $1/12$ атомной массы ^{12}C , т. е.
 $1,66057 \cdot 10^{-27}$ кг.
Коэффициенты перехода от массы к энергии:
1 а. е. м. соответствует $1,49244 \cdot 10^{-10}$ Дж (=931,502 МэВ)
1 кг соответствует $8,98755 \cdot 10^{16}$ Дж (=5,60954 · 10²⁹ МэВ)

4. Соотношения между единицами измерения и значения часто встречающихся величин

1 эрг = 10^{-7} Дж
1 термхим. кал (кал_{тх}) = 4,18400 Дж
1 мм рт. ст. = 133,3 Па
1 атм = $1,01325 \cdot 10^5$ Па (Н/м²)
1 Д = $3,33564 \cdot 10^{-30}$ Кл·м
1 м⁻¹ соответствует 0,11972 кДж/моль
1 эВ соответствует 96,485 кДж/моль
Газовая постоянная $R = 8,31441$ Дж/(К·моль) = 1,98717 кал/(К·моль) =
= $8,2057 \cdot 10^{-2}$ л·атм/(К·моль)
 $2,303R = 19,148$ Дж/(К·моль)
 $hc/k = 1,43878 \cdot 10^{-2}$ м·К
 $k/h = 2,083 \cdot 10^{10}$ с⁻¹·К⁻¹ (на 1 молекулу)
 $\lg(k/h) = 10,3187$
 $ek/h = 5,662 \cdot 10^{10}$ с⁻¹·К⁻¹ (на 1 молекулу)
 $\lg(ek/h) = 10,753$

Величина	T, К			
	273	298	323	373
RT, Дж/моль	2269,7	2477,6	2685,4	3101,1
(kT/h) · 10 ⁻¹² , с ⁻¹	5,687	6,207	6,728	7,770
lg(kT/h)	12,755	12,793	12,828	12,887
(ekT/h) · 10 ⁻¹³ , с ⁻¹	1,546	1,687	1,829	2,112
lg(ekT/h)	13,189	13,227	13,262	13,325

5. Способы выражения концентраций и соотношения между ними

Молярность (с) — число молей растворенного вещества в 1 л раствора.
Моляльность (m) — число молей растворенного вещества на 1000 г растворителя.
Молярная доля (X) — число молей растворенного вещества в 1 моле раствора.
Массовое содержание (p) — число граммов растворенного вещества в 100 г раствора.

$$c = \frac{1000\rho m}{1000 + mM}; \quad c = \frac{p/M}{100} \cdot 1000\rho = \frac{10\rho p}{M}$$

$$m = \frac{1000c}{1000\rho - cM}; \quad m = \frac{1000p}{M(100 - p)}$$

$$X = \frac{p}{p + (100 - p) \frac{M}{M_0}}; \quad X = \frac{mM_0}{mM_0 + 1000}$$

где M_0 и M — молярная масса растворителя и растворенного вещества; ρ — плотность раствора, г/см³.

6. Свойства органи

Температуры плавления и кипения даны при нормальном атмосферном давлении. Раств. п. — не растворяются, т. р. — трудно растворяются (менее 10—15 г в 100 г воды), л. р. — казатель преломления n_D^{20} (для D-линии натрия $\lambda = 589$ нм) приведен при 20 °С. Относительная динамическая вязкость η приведена в Па·с при 20 °С или t , °С. Удельная ражено в Н/м при 20 °С или t , °С. Донорное число $DN_{SbCl_5} = -\Delta H_D \cdot SbCl_5$, где D — сведения о растворителях содержатся также в табл. 7, 10, 14, 54.

Растворитель	Мол. масса	$t_{плавл.}$, °С	$t_{кип.}$, °С	Растворимость в воде	ρ^{20} , г/см ³
Бензонитрил C_7H_5N	103,13	—13	190,7	н. р.	1,0051
Гексаметилфосфортриамид $C_6H_{18}ON_3P$	179,20	—	66	н. р.	1,02
Диметилацетамид C_4H_9ON	87,12	—20,0	165,0	∞	0,9366 (25°)
Диметилловый эфир этиленгликоля (целлозольв, глим) $C_4H_{10}O_2$	90,12	—58	83	∞	0,863
Диметилсульфоксид C_2H_6OS	78,13	18,4	189 (разл.)	∞	1,1014 (25°)
Диметилформамид C_3H_7ON	73,09	—61,0	153,0	∞	0,9445 (25°)
1,3-Диоксан $C_4H_8O_2$	88,10	—42	107	∞	1,034
1,1-Дихлорэтан $C_2H_4Cl_2$	98,97	—96,98	57,28	н. р.	1,1757
1,2-Дихлорэтан $C_2H_4Cl_2$	98,97	—35,87	83,47	н. р.	1,257
Монометилловый эфир диэтиленгликоля $C_6H_{12}O_3$	120,15	—	193	∞	1,027
Пропиленкарбонат $C_4H_6O_3$	102,09	—70	240	т. р.	1,204
Пропионатрил C_3H_5N	55,08	—91,9	97,4	т. р.	0,782
Тетрагидрофуран C_4H_8O	72,10	—65	65,7	∞	0,8892
Тетраметилсульфон (сульфолан) $C_4H_8O_2S$	120,16	28,9	283	л. р.	1,262 (30°)
Трибутилфосфат $C_{12}H_{27}O_4P$	266,33	—80	289	т. р.	0,9727 (25°)
Фуран C_4H_4O	68,07	—85,65	32	н. р.	0,9366
Этилсидизмин $C_2H_5N_2$	60,10	8,5	116,5	∞	0,8977

ческих растворителей

творимость при комнатной температуре: ∞ — вещества смешиваются во всех отношениях, легко растворяются (более 25 г в 100 г воды). Плотность ρ дана в г/см³ при 20 °С или t , °С. Поляная диэлектрическая проницаемость ϵ дана при t , °С. Дипольный момент μ выражен в Кл·м. Поляная электрическая проводимость κ указана в См/м при t , °С. Поверхностное натяжение σ в Н/м, являющийся донором электронов и образующий с $SbCl_5$ комплекс состава 1:1.

n_D^{20}	ϵ	$\mu \cdot 10^{30}$, Кл·м	$\eta^{20} \cdot 10^3$, Па·с	κ , См/м	$\sigma^{20} \cdot 10^3$, Н/м	DN_{SbCl_5}
1,5289	25,2 (25°)	13,14	1,24 (25°)	$5 \cdot 10^{-6}$ (20°)	39,05	11,9
1,4579	30,0 (20°)	5,54	3,5	—	—	38,8
1,4384	38,9 (20°)	12,64	0,919 (25°)	—	—	27,8
1,3796	—	—	1,1	—	—	—
1,4770	45,0 (25°)	13,21	2,473	—	42,98 (25°)	29,8
1,4303	36,7 (25°)	12,74	0,796 (25°)	—	—	26,6
1,4165	—	7,10	—	—	—	—
1,4164	10,5 (25°)	6,87	0,505 (25°)	$< 1,7 \cdot 10^{-6}$ (25°)	24,19 (25°)	—
1,4448	10,4 (25°)	5,84	0,80	—	32,23	0
1,4264	—	—	—	—	—	—
1,4189	65,1 (25°)	16,6	2,53	—	—	15,1
1,3655	27,0 (20°)	11,34	0,454 (15°)	—	—	16,1
1,4050	7,6 (25°)	5,44	—	—	—	20,0
—	44 (30°)	15,7	9,87 (30°)	—	—	14,8
1,4220	6,8 (25°)	—	3,89	—	27,2 (25°)	23,7
1,4214	2,95 (20°)	2,20	—	—	—	—
1,4568	14,2 (20°)	6,64	1,54 (25°)	—	—	—

Спектральная линия D натрия $\lambda = 589 \text{ nm}$; $\frac{dn}{dt}$ — температурный коэффициент показателя преломления, справедливый в интервале $20 \pm 10^\circ \text{C}$.

Вещество	$^{20}n_D$	$-\frac{dn_D}{dt} \cdot 10^4$	Вещество	$^{20}n_D$	$-\frac{dn_D}{dt} \cdot 10^4$
Алиловый спирт C_3H_7O	1,4125 *	4,1	Нитрометан CH_3O_2N	1,3819	4,2
Анилин C_6H_5N	1,5861	5,2	Октан C_8H_{18}	1,3977 *	4,8
Ацетон C_3H_6O	1,3591	4,9	Пентан C_5H_{12}	1,3577 *	5,78
Ацетонитрил C_3H_3N	1,3442	4,6	Пиридин C_5H_5N	1,5095	5,5
Алегофенон C_6H_5O	1,5340	4,6	1-Пропанол C_3H_7O	1,3854	3,8
Бензиловый спирт C_7H_9O	1,5405	4,0	2-Пропанол C_3H_7O	1,3776	3,9
Бензол C_6H_6	1,5011	6,35	Пропионовая кислота $C_3H_7O_2$	1,3869 *	3,8
Бромбензол C_6H_5Br	1,5601	4,9	Сероуглерод CS_2	1,6277	7,8
1-Бутанол $C_4H_{10}O$	1,3993	3,9	Тетрахлорметан CCl_4	1,4603	5,5
2-Бутанол $C_4H_{10}O$	1,3958	3,9	Тиофен C_4H_4S	1,5289	6,33
Вода H_2O	1,3330	0,8	Толуол C_7H_8	1,4969	5,67
Гексан C_6H_{14}	1,3751	5,4	Трихлорметан (хлороформ)	1,4456	5,9
Гептан C_7H_{16}	1,3876	5,06	Уксусная кислота $C_2H_4O_2$	1,3718	3,9
Глицерин $C_3H_8O_3$	1,4744	2,2	Уксусный альдегид C_2H_4O	1,3311 *	5,6
1,4-Диоксан $C_8H_{16}O_2$	1,4224	4,3	Уксусный ангидрид $C_4H_6O_3$	1,3902 *	4,0
Диэтиловый эфир $C_4H_{10}O$	1,3526	5,6	Фенилгидразин $C_6H_8N_2$	1,6105	2,4
м-Ксиол C_8H_{10}	1,4972	5,24	Фенилэтилен (стирол) C_8H_8	1,5468	—
о-Ксиол C_8H_{10}	1,5054	5,13	Фенол C_6H_6O	1,54	—
n-Ксиол C_8H_{10}	1,4958	5,28	Формамид CH_3ON	(45 °C)	—
Метанол CH_4O	1,3288	3,9	Фтортрихлорметан (фреон-11)	1,4472	—
Метилацетат $C_3H_6O_2$	1,3593	—	$CFCl_3$	1,5246	—
Метилформат $C_2H_4O_2$	1,3420	4,3	Хлорбензол C_6H_5Cl	(18 °C)	5,4
Муравьиная кислота CH_2O_2	1,3714	3,8	Циклогексан C_6H_{12}	1,5248	5,44
Нитробензол $C_6H_5O_2N$	1,5524	4,6	Этиленгликоль $C_2H_6O_2$	1,4263 *	2,6
			Этанол C_2H_6O	1,3611	4,0
			Этилацетат $C_4H_8O_2$	1,3726	4,9
			Этилформиат $C_3H_6O_2$	1,3603 *	4,4

* Липня Д гелія.

8. Показатели преломления водных растворов при 20 °C

Растворенное вещество	n_D^{20} при массовом содержании растворенного вещества, %									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Метанол CH_4O	1,3353	1,3381	1,3404	1,3419	1,3424	1,3417	1,3401	1,3374	1,3335	1,3286
Этанол $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$	1,3396	1,3470	1,3535	1,3580	1,3612	1,3633	1,3646	1,3649	1,3642	1,3613
1-Пропанол $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$	1,3422	1,3515	1,3579	1,3639	1,3691	1,3740	1,3780	1,3814	1,4842	1,3854
2-Пропанол $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$	1,3421	1,3512	1,3588	1,3640	1,3684	1,3719	1,3746	1,3766	1,3777	1,3773
Этиленгликоль $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}_2$	1,3424	1,3524	1,3625	1,3728	1,3831	1,3934	1,4034	1,4132	1,4226	1,4318
Глицерин $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$	1,3448	1,3575	1,3707	1,3841	1,3981	1,4130	1,4279	1,4429	1,4584	1,4744
Ацетон $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$	1,3403	1,3477	1,3537	1,3584	1,3624	1,3644	1,3654	1,3648	1,3625	1,3591
Уксусная кислота $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$	1,3402	1,3473	1,3540	1,3599	1,3655	1,3702	1,3740	1,3769	1,3772	1,3717
Сахароза $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$	1,3478	1,3638	1,3811	1,4016	1,4200	1,4418	1,4651	1,490	—	—

9. Плотность воды в интервале $-10 \div 100^\circ \text{C}$

$t, ^\circ\text{C}$	$\rho \cdot 10^{-3}, \text{кг/м}^3$	$t, ^\circ\text{C}$	$\rho \cdot 10^{-3}, \text{кг/м}^3$	$t, ^\circ\text{C}$	$\rho \cdot 10^{-3}, \text{кг/м}^3$	$t, ^\circ\text{C}$	$\rho \cdot 10^{-3}, \text{кг/м}^3$	$t, ^\circ\text{C}$	$\rho \cdot 10^{-3}, \text{кг/м}^3$
-10	0,99815	17	0,99880	24	0,99732	35	0,99406	70	0,97781
-5	0,99930	18	0,99862	25	0,99707	40	0,99224	75	0,97489
0	0,99987	19	0,99843	26	0,99681	45	0,99025	80	0,97183
4	0,00000	20	0,99823	27	0,99654	50	0,98807	85	0,96865
5	0,99999	21	0,99802	28	0,99626	55	0,98573	90	0,96534
10	0,99973	22	0,99780	29	0,99597	60	0,98324	95	0,96192
15	0,99913	23	0,99756	30	0,99567	65	0,98059	100	0,95838
16	0,99897								

10. Плотность жидкостей в интервале 0—60 °С

Вещество	$\rho \cdot 10^{-3}$, кг/м ³ , при температуре, °C						
	0	10	20	30	40	50	60
Аллиловый спирт C ₃ H ₇ O	0,8681	—	0,8508	0,8421	—	—	—
Анилин C ₆ H ₇ N	1,0390	1,0303	1,0218	1,0131	1,0045	0,9958	0,9872
Ацетон C ₃ H ₆ O	0,8125	0,8014	0,7905	0,7793	0,7682	0,7560	0,7496
Ацетонитрил C ₂ H ₃ N	0,8035	0,7926	0,7822	0,7713	—	—	—
Ацетофенон C ₈ H ₈ O	—	1,0364	1,0278	1,0194	1,0106	1,0021	0,9757
Бензиловый спирт C ₁₁ H ₁₄ O	1,0608	1,0532	1,0454	1,0376	1,0297	1,0219	—
Бензол C ₆ H ₆	0,9001	0,8895	0,8790	0,8685	0,8576	0,8466	0,8357
Бромбензол C ₆ H ₅ Br	1,5218	1,5083	1,4948	1,4815	1,4682	1,4546	1,4411
1-Бутанол C ₄ H ₁₀ O	0,8246	0,8171	0,8086	0,8020	—	—	—
2-Бутанол C ₄ H ₁₀ O	—	—	0,8027	—	—	—	—
Вода H ₂ O	0,9999	0,9997	0,9982	0,9956	0,9922	0,9880	0,9832
Гексан C ₆ H ₁₄	0,6769	0,6684	0,6595	0,6505	0,6412	0,6318	0,6221
Гептан C ₇ H ₁₆	0,7005	0,6920	0,6836	0,6751	0,6665	0,6579	0,6491
Глицерин C ₃ H ₈ O ₃	1,2674	1,2642	1,2594	1,2547	1,2500	1,2438	1,2376
1,4-Диоксан C ₄ H ₈ O ₂	—	—	1,0338	—	—	—	—
Диэтиловый эфир C ₄ H ₁₀ O	0,7362	0,7248	0,7135	0,7019	0,6894	0,6764	0,6658
o-Ксилол C ₈ H ₁₀	0,8969	0,8886	0,8802	0,8719	0,8634	0,8549	0,8464
m-Ксилол C ₈ H ₁₀	0,8811	0,8726	0,8642	0,8556	0,8470	0,8384	0,8297
p-Ксилол C ₈ H ₁₀	—	—	0,8610	0,8525	0,8437	0,8350	0,8262
Метанол CH ₃ O	0,8100	0,8008	0,7915	0,7825	0,7740	0,7650	0,7555
Метилацетат C ₃ H ₆ O ₂	0,9593	(0,946)	0,9338	(0,920)	0,9075	0,8939	0,8800
Метилформиат C ₂ H ₄ O ₂	1,0032	0,9886	0,9742	0,9598	(0,945)	0,9294	(0,913)
Мурьяная кислота CH ₂ O ₂	—	—	1,2196	—	—	—	—
Нитробензол C ₆ H ₅ O ₂ N	1,2231	1,2131	1,2033	1,1936	1,1837	1,1740	1,1638
Нитрометан CH ₃ O ₂ N	—	—	1,1382	—	—	—	—
Октан C ₈ H ₁₈	0,7185	0,7102	0,7022	0,6942	0,6860	0,6778	0,6694

Пентан C_5H_{12}	0,6455	0,6360	0,6262	0,6163	0,6062	0,5957	0,5850
Пиридин C_5H_5N	1,0030	0,9935	0,9820	0,9729	0,9629	0,9526	0,9424
1-Пропанол C_3H_8O	0,8193	(0,811)	0,8040	(0,797)	0,7875	(0,780)	0,7700
2-Пропанол C_3H_8O	—	—	0,7851	—	—	—	—
Пропионовая кислота $C_3H_6O_2$	—	—	0,992	—	—	—	—
Сероуглерод CS_2	1,2927	1,2778	1,2632	1,2482	—	—	—
Тетрахлорметан CCl_4	1,6326	1,6135	1,5940	1,5748	1,5557	1,5361	1,5165
Тиофен C_4H_4S	—	—	1,0647	1,0524	—	—	—
Толуол C_7H_8	0,8855	0,8782	0,8670	0,8580	0,8483	0,8388	0,8293
Трихлорметан (хлороформ) $CHCl_3$	1,5264	1,5077	1,4890	1,4706	1,4509	1,4334	1,4114
Уксусная кислота $C_2H_4O_2$	1,0697	1,0593	1,0491	1,0390	1,0282	1,0175	1,0060
Уксусный альдегид C_2H_4O	—	—	0,783	—	—	—	—
Уксусный ангидрид $C_4H_6O_3$	1,1053	1,0930	1,0810	1,0690	1,0567	1,0443	—
Фенилгидразин $C_6H_8N_2$	—	—	1,0981	1,0899	1,0817	1,0737	1,0653
Фенилэтилен (стирол, C_8H_8)	—	—	0,9060	—	—	—	—
Фенол C_6H_6O	—	—	—	—	1,0570 *	—	—
Формамид CH_3ON	—	—	1,1334	—	—	—	—
Фтортрихлорметан (фреон-11) $CFCl_3$	1,5342	—	1,4870	1,462	—	—	—
Хлорбензол C_6H_5Cl	1,1279	1,1171	1,1062	1,0954	1,084	1,0742	1,0636
Циклогексан C_6H_{12}	—	0,7879	0,7786	0,7691	0,7596	0,7499	0,7401
Этиленгликоль $C_2H_6O_2$	—	—	1,1130	—	—	—	—
Этанол C_2H_6O	0,8062	0,7979	0,7893	0,7810	0,7722	0,7632	0,7541
Этилацетат $C_4H_8O_2$	0,9244	(0,912)	0,9005	(0,891)	0,8762	(0,867)	0,8508
Этилформиат $C_3H_6O_2$	—	—	0,9168	—	—	—	—

* При 41 °С.

11. Плотность растворов солей в воде

Массовое содержание, %	$\rho \cdot 10^{-3}$, кг/м ³								
	AgNO ₃ (20 °C)	AlCl ₃ (18 °C)	BaCl ₂ (20 °C)	CaCl ₂ (20 °C)	CdSO ₄ (18 °C)	CuSO ₄ (20 °C)	FeSO ₄ (18 °C)	KCl (20 °C)	KNO ₃ (20 °C)
1	1,0070	1,0075	—	1,0070	—	1,009	1,0085	1,0045	1,0046
2	1,0154	1,0164	1,0159	1,0148	1,0182	1,019	1,0092	1,0108	1,0108
4	1,0327	1,0344	1,0341	1,0316	1,0383	1,040	1,0375	1,0239	1,0234
6	1,0506	1,0526	1,0528	1,0486	1,0590	1,062	1,0575	1,0369	1,0363
8	1,0690	1,0711	1,0721	1,0659	1,0803	1,084	1,0785	1,0500	1,0494
10	1,0882	1,0900	1,0921	1,0835	1,1023	1,107	1,1000	1,0633	1,0627
12	1,1080	1,1093	1,1128	1,1015	1,1250	1,131	1,1220	1,0768	1,0762
14	1,1284	1,1290	1,1342	1,1198	1,1485	1,155	1,1445	1,0905	1,0899
16	1,1495	1,1491	1,1564	1,1384	1,1729	1,180	1,1675	1,1043	1,1030
18	1,1715	—	1,1793	1,1578	1,1982	1,206	1,1905	1,1185	1,1181
20	1,1942	—	1,2031	1,1775	1,2242	—	1,2135	1,1323	1,1326
22	—	—	1,2277	—	—	—	—	1,1474	1,1473
24	—	—	1,2531	—	—	—	—	1,1623	1,1623
26	—	—	1,2793	—	—	—	—	—	—
28	—	—	—	1,2603	—	—	—	—	—
30	1,3205	—	—	1,2816	1,3714	—	—	—	—
35	1,3931	—	—	1,3373	1,4551	—	—	—	—
40	1,4743	—	—	1,3957	1,5470	—	—	—	—

Массовое содержание, %	$\rho \cdot 10^{-3}$, кг/м ³								
	K ₂ CO ₃ (20 °C)	LiCl (20 °C)	NH ₄ Cl (20 °C)	NH ₄ NO ₃ (20 °C)	NaCl (20 °C)	NaCH ₃ COO (18 °C)	NaNO ₃ (20 °C)	NiSO ₄ (18 °C)	UO ₂ (NO ₃) ₂ (25 °C)
1	1,0072	1,0041	1,0013	1,0023	1,0053	1,0033	1,0049	1,009	1,003
2	1,0163	1,0099	1,0045	1,0064	1,0125	1,0084	1,0117	1,020	1,010
4	1,0345	1,0215	1,0107	1,0147	1,0268	1,0186	1,0254	1,042	1,024
6	1,0529	1,0330	1,0168	1,0230	1,0413	1,0289	1,0392	1,063	1,039
8	1,0715	1,0444	1,0227	1,0313	1,0559	1,0392	1,0532	1,085	1,055
10	1,0904	1,0559	1,0286	1,0397	1,0707	1,0495	1,0674	1,109	1,072
12	1,1096	1,0675	1,0344	1,0482	1,0857	1,0598	1,0819	1,133	1,091
14	1,1291	1,0792	1,0401	1,0567	1,1009	1,0702	1,0967	1,158	1,111
16	1,1490	1,0910	1,0457	1,0653	1,1162	1,0807	1,1118	1,183	1,132
18	1,1692	1,1029	1,0512	1,0740	1,1319	1,0913	1,1272	1,209	1,154
20	1,1898	1,1150	1,0567	1,0828	1,1478	1,1021	1,1426	—	1,177
22	—	—	1,0621	—	1,1640	1,1130	—	—	1,201
24	1,2320	1,1399	—	1,1005	1,1804	1,1240	1,1752	—	1,226
26	—	—	1,0726	—	1,1972	1,1351	—	—	1,251
28	1,2756	1,1658	—	1,1186	—	1,1462	1,2085	—	1,277
30	—	—	—	—	—	—	1,2256	—	1,304
35	1,3548	—	—	1,1512	—	—	1,2701	—	(1,370)
40	1,4141	1,254	—	1,1754	—	—	1,3175	—	(1,450)

12. Плотность растворов неорганических кислот и оснований в воде при 20 °C

Массовое содержание, %	$\rho \cdot 10^{-3}$, кг/м ³						
	HCl	HNO ₃	H ₂ SO ₄	H ₃ PO ₄	KOH	NH ₄ OH	NaOH
1	1,003	1,004	1,005	1,0038	1,007	0,994	1,009
2	1,008	1,009	1,012	1,0092	1,016	0,989	1,020
4	1,018	1,010	1,025	1,0200	1,034	0,981	1,043
6	1,028	1,031	1,038	1,0309	1,053	0,973	1,065
8	1,038	1,043	1,052	1,0420	1,072	0,965	1,087
10	1,048	1,054	1,066	1,0532	1,090	0,957	1,109
12	1,057	1,066	1,080	1,0647	1,109	0,950	1,131
14	1,067	1,078	1,094	1,0764	1,128	0,943	1,153
16	1,078	1,090	1,109	1,0884	1,147	0,936	1,175
18	1,088	1,102	1,124	1,1008	1,166	0,929	1,197
20	1,098	1,115	1,139	1,1134	1,186	0,923	1,219
22	1,108	1,128	1,155	—	1,206	0,916	1,241
24	1,118	1,140	1,170	1,1395	1,226	0,910	1,263
26	1,129	1,154	1,186	—	1,246	0,904	1,285
28	1,139	1,167	1,202	1,1665	1,267	0,898	1,307
30	1,149	1,180	1,218	1,1805	1,288	0,892	1,328
35	1,174	1,214	1,260	1,2160	1,341	0,879	1,320
40	1,198	1,247	1,303	1,2540	1,396	—	1,430

13. Плотность растворов органических соединений в воде при 20 °C

Массовое содержание, %	$\rho \cdot 10^{-3}$, кг/м ³					
	CH ₂ O ₂ (муравьиная кислота)	CH ₃ O (метанол)	C ₂ H ₃ O ₂ (уксусная кислота)	C ₂ H ₅ O (этанол)	C ₃ H ₅ O ₂ (глицерин)	C ₆ H ₁₂ O ₆ (глюкоза)
1	1,0020	0,9965	0,9997	0,99636	1,0006	—
2	1,0045	0,9948	1,0012	0,99453	1,0030	1,0058
4	1,0094	0,9914	1,0041	0,99103	1,0077	1,0138
6	1,0142	0,9880	1,0069	0,98780	1,0125	1,0216
8	1,0197	0,9847	1,0098	0,98478	1,0173	1,0296
10	1,0247	0,9815	1,0126	0,98187	1,0221	1,0377
12	1,0297	0,9784	1,0154	0,97910	1,0271	1,0460
14	1,0346	0,9754	1,0181	0,97643	1,0320	1,0542
16	1,0394	0,9725	1,0208	0,97387	1,0370	1,0626
18	1,0442	0,9696	1,0235	0,97129	1,0420	1,0712
20	—	0,9666	1,0261	0,96864	1,0470	1,0798
22	1,0538	0,9636	1,0287	0,96592	1,0520	1,0886
24	—	0,9607	1,0312	0,96312	1,0571	1,0974
26	1,0634	0,9576	1,0336	0,96020	1,0622	1,1064
28	—	0,9546	1,0360	0,95710	1,0674	1,1153
30	1,0730	0,9515	1,0383	0,95382	1,0727	1,1247
35	—	0,9433	1,0436	0,94494	1,0860	—
40	—	0,9345	1,0488	0,93518	1,0995	—

14. Поверхностное натяжение жидкостей в интервале 0—60 °С

Вещество	$\sigma \cdot 10^3$, Н/м, при температуре, °С							
	0	10	20	25	30	40	50	60
Аллиловый спирт C_3H_7O	—	—	25,68	—	24,92	—	—	—
Анилин C_6H_5N	45,42	44,38	43,30	—	42,24	41,26	40,10	39,40
Ацетон C_3H_6O	26,21	25,00	23,70	—	22,01	21,16	19,90	18,61
Ацетонитрил C_3H_3N	—	—	29,10	—	27,80	—	—	—
Ацетофенон C_6H_5O	—	39,50	38,21	—	—	—	—	—
Бензиловый спирт C_7H_9O	—	—	42,76	—	38,94	—	—	—
Бензол C_6H_6	—	30,24	28,88	28,18	27,49	26,14	24,88	23,66
Бромбензол C_6H_5Br	—	36,34	35,09	—	—	—	—	—
1-Бутанол $C_4H_{10}O$	26,2	25,4	24,6	—	23,8	23,0	22,1	21,4
2-Бутанол $C_4H_{10}O$	—	—	22,7	—	—	—	—	—
Вода H_2O	75,62	74,22	72,75	71,96	71,15	69,55	67,91	66,17
Гексан C_6H_{14}	20,56	19,51	18,42	—	17,40	16,31	15,26	14,23
Гептан C_7H_{16}	—	—	20,86	—	19,54	18,47	17,42	16,39
Глицерин $C_3H_8O_3$	—	—	59,4	—	59,0	58,5	58,0	57,4
1,4-Диоксан $C_4H_8O_2$	—	—	—	—	—	—	—	—
Диэтиловый эфир $C_4H_{10}O$	19,4	18,2	17,0	—	15,8	14,6	13,5	12,4
o-Ксилол C_8H_{10}	32,28	31,16	30,03	29,48	28,93	27,84	26,76	25,70
m-Ксилол C_8H_{10}	30,92	29,78	28,63	28,08	27,54	26,44	25,36	24,26
p-Ксилол C_8H_{10}	—	—	28,31	27,76	27,22	26,13	25,06	24,02
Метанол CH_4O	24,5	23,5	22,61	—	21,8	20,9	20,1	19,3
Метилацетат $C_3H_6O_2$	—	—	23,84	—	22,38	—	—	—
Метилформиат $C_2H_4O_2$	—	—	24,64	—	23,09	—	20,05	—
Муравьиная кислота CH_2O_2	—	38,13	37,58	—	36,48	—	—	—
Нитробензол $C_6H_5O_2N$	46,4	45,2	43,9	—	42,7	41,5	40,2	39,0
Нитрометан CH_3O_2N	38,1	37,74	36,98	—	36,51	—	—	—
Октан C_8H_{18}	23,70	22,73	21,76	—	20,79	19,78	18,79	17,82
Пентан C_5H_{12}	18,2	17,1	16,00	15,48	14,95	13,8	—	—
Пиридин C_5H_5N	—	—	38,0	—	—	35,0	—	—
1-Пропанол C_3H_8O	—	—	—	22,9	—	—	—	—
2-Пропанол C_3H_8O	—	—	—	—	—	—	—	—
Пропионовая кислота $C_3H_6O_2$	—	27,21	26,70	—	25,71	—	—	—
Сероуглерод CS_2	35,45	33,90	32,25	—	30,75	—	27,8	—
Тетраэторметан CCl_4	29,38	28,05	25,68	—	24,2	24,41	23,22	22,38
Тиофен C_4H_4S	—	—	33,1	—	31,7	30,1	—	—
Толуол C_7H_8	30,92	29,70	28,53	27,92	27,2	26,15	25,04	23,94
Трихлорметан (хлороформ) $CHCl_3$	—	28,50	27,14	—	25,7	—	—	—
Уксусная кислота $C_2H_4O_2$	—	28,8	27,8	—	26,8	25,8	24,8	23,8
Уксусный альдегид C_2H_4O	—	—	21,2	—	—	—	—	—
Уксусный ангидрид $C_4H_6O_3$	—	33,37	32,65	—	31,22	30,05	29,00	—
Фенилгидразин $C_6H_8N_2$	—	—	45,55	—	44,1	—	—	40,40
Фенилэтилен (стирол) C_8H_8	—	—	32,0	—	—	—	—	—
Фенол C_6H_6O	—	—	40,9*	—	—	—	—	—
Хлорбензол C_6H_5Cl	36,0	34,8	33,5	—	32,3	31,1	30,6	36,57
Циклогексан C_6H_{12}	—	26,15	24,95	24,35	23,75	22,45	21,35	28,7
Этиленгликоль $C_2H_6O_2$	—	—	46,1	—	—	—	—	—
Этанол C_2H_6O	24,05	23,14	22,03	—	21,48	20,20	19,80	18,43
Этилацетат $C_4H_8O_2$	26,5	24,36	23,75	—	22,25	—	20,2	—
Этилформиат $C_3H_6O_2$	—	—	23,84	—	22,38	—	—	—

* Переохлажденная жидкость.

15. Дипольные моменты функциональных групп молекул

Дипольным моментом обладают молекулы, принадлежащие к группам симметрии C_n , C_{nv} , C_{nh} , C_{∞} . В случае принадлежности молекул к группам C_n и C_{nv} дипольный момент направлен вдоль оси вращения.

Единица измерения дипольного момента 1 Кл·м = $3 \cdot 10^{18}$ Д.

Дипольные моменты молекул можно рассматривать как векторную сумму индивидуальных дипольных моментов их связей и функциональных групп. При наличии у молекулы только двух моментов связей (групп) $\mu = (\mu_1^2 + \mu_2^2 + 2\mu_1\mu_2 \cos \theta)^{1/2}$. В тех случаях, когда два заместителя лежат в плоскости бензольного кольца, дипольные моменты орто-, мета- и пара-соединений (μ_o , μ_m и μ_p) можно приблизительно определить из моментов групп (μ_1 и μ_2) с помощью выражений:

$$\mu_o = \mu_1^2 + \mu_2^2 + \mu_1\mu_2 + \mu_2^2; \mu_m = \mu_1^2 - \mu_1\mu_2 + \mu_2^2; \mu_p = \mu_1 - \mu_2 \text{ и } \mu_o = \sqrt{3}\mu_m$$

В таблице даны значения μ (в Кл·м) функциональных групп. Здесь θ — угол между направлением результирующего момента группы и направлением связи этой группы с атомом углерода; Γ — газ, p — раствор в бензоле.



Группа X	$C_n H_n - X$			$CH_3 - X$			$C_2 H_5 - X$		
	Γ	p	θ°	Γ	p	θ°	Γ	p	θ°
CH_3	1,234	1,234	0	0	0	—	0	0	—
CF_3	9,541	8,473	180	7,840	7,740	180	—	—	—
CCl_3	—	6,805	180	5,905	5,238	180	—	—	—
CN	14,645	13,511	180	—	11,342	—	13,344	11,910	180
CNS	—	11,976	127	—	—	—	—	—	—
CHO	—	9,875	146	9,074	8,307	125	9,107	8,340	—
COOH	—	5,471	106	5,771	5,438	106	5,771	5,604	106
$COCH_3$	10,003	9,875	132	9,674	9,174	120	9,274	—	—
$COOCH_3$	—	6,105	110	5,571	5,838	130	5,871	6,338	130
$COOC_2H_5$	—	6,338	118	—	6,005	89	—	—	—
OH	4,670	5,338	90	5,671	5,671	118	5,638	5,671	118
OCH_3	4,504	4,270	72	4,337	4,270	124	—	—	—
$OCOCH_3$	—	5,638	66	—	—	—	—	—	—
OCF_3	—	7,873	160	—	—	—	—	—	—
NH_3	4,937	5,104	48,5	4,270	4,870	91	4,003	4,604	100
$NHCH_3$	—	5,705	40	—	—	—	—	—	—
$N(CH_3)_2$	5,371	5,271	30	2,035	2,869	109	—	—	—
$NHCOCH_3$	—	12,310	100	—	—	—	—	—	—
NO	—	10,308	149	—	—	—	—	—	—
NO_2	13,978	13,377	180	11,675	10,342	180	12,276	11,009	180
F	5,371	4,904	180	6,172	5,971	180	6,405	—	180
Cl	5,871	5,304	180	6,205	6,238	180	6,839	6,005	180
Br	5,471	5,238	180	6,072	6,072	180	6,705	6,338	180
I	5,705	4,670	180	5,671	5,504	180	6,005	6,005	180
SH	—	4,070	135	4,203	5,171	—	—	—	—
SCH_3	—	4,470	77,5	5,004	4,670	57	—	—	—
SCF_3	—	8,340	156	—	—	—	—	—	—
SO_2CH_3	—	15,779	117	—	—	—	—	—	—
SO_2CF_3	—	14,412	167	—	—	—	—	—	—
$SOCF_3$	—	12,944	143	—	—	—	—	—	—
SeH	—	3,60	169	—	—	—	—	—	—
$SeCH_3$	—	4,370	110	—	4,404	—	—	—	—
$Si(CH_3)_3$	—	1,468	0	—	0	0	—	—	—

16. Дипольные моменты молекул газообразных веществ

Вещество	$\mu \cdot 10^{30}$, Кл·м	Вещество	$\mu \cdot 10^{30}$, Кл·м	Вещество	$\mu \cdot 10^{30}$, Кл·м
CO	0,33	H ₂ O	6,10	CH ₃ Cl	6,57
HBr	2,67	H ₂ S	3,40	CH ₂ Cl ₂	5,30
HCl	3,47	NO ₂	0,97	CHCl ₃	3,17
HF	6,40	SO ₂	5,34	C ₂ H ₅ OH	5,67
HI	1,27	NH ₃	4,94	(C ₂ H ₅) ₂ O	3,30
NO	0,23	PH ₃	1,83	C ₆ H ₅ CH ₃	1,33

17. Дипольные моменты молекул жидких веществ

Вещество	$\mu \cdot 10^{30}$, Кл·м	Вещество	$\mu \cdot 10^{30}$, Кл·м
Аллиловый спирт C ₃ H ₇ O	5,34	Метилформат C ₂ H ₄ O ₂	6,00
Анилин C ₆ H ₅ N	5,00	Пиридин C ₅ H ₅ N	7,34
Ацетальдегид C ₂ H ₄ O	8,97	2-Пропанол C ₃ H ₈ O	5,54
Ацетон C ₃ H ₆ O	9,1—9,7	Пропионовая кислота C ₃ H ₆ O ₂	5,84
Ацетофенон C ₈ H ₈ O	10,07	Тиофен C ₄ H ₄ S	1,83
Бензиловый спирт C ₇ H ₈ O	5,70	Уксусный ангидрид C ₄ H ₆ O ₃	9,41
Бензойная кислота C ₇ H ₆ O ₂	5,8	Фенилгидразин C ₆ H ₈ N ₂	5,50
Бромбензол C ₆ H ₅ Br	5,67	Фенилэтилен (стирол) C ₈ H ₈	1,87
Бутанол C ₄ H ₁₀ O	5,54	Фенол C ₆ H ₆ O	4,84
Глицерин C ₃ H ₈ O ₃	0,93	Фтортрихлорметан (фреон-11) CFCF ₃	1,70
м-Дихлорбензол C ₆ H ₄ Cl ₂	4,94	Хлорбензол C ₆ H ₅ Cl	5,64
о-Дихлорбензол C ₆ H ₄ Cl ₂	7,51	Этиламин C ₂ H ₇ N	4,34
м-Ксилол C ₈ H ₁₀	1,20	Этилацетат C ₄ H ₈ O ₂	5,94
о-Ксилол C ₈ H ₁₀	1,73	Этилформиат C ₃ H ₆ O ₂	6,44
п-Ксилол C ₈ H ₁₀	0,20		
Метилацетат C ₃ H ₆ O ₂	5,74		

18. Относительная диэлектрическая проницаемость систем вода — органическое вещество

ϵ_{∞} — предельная низкочастотная диэлектрическая проницаемость; X_2 — молярная доля; ϕ_2 — объемная доля органического компонента; c_2 — молярность, моль/л раствора.

Вода—1,4-диоксан (25 °С)			Вода—метанол (20 °С)			Вода—этилендиамин (25 °С)		Вода—анилин (25 °С)	
X_2	ϵ	ϵ_{∞}	ϕ_2	ϵ	ϵ_{∞}	c_2	ϵ	c_2	ϵ
0,415	13,37	4,66	0,1	80,8	5,8	0,525	75,5	0,5	73,0
0,504	9,75	4,25	0,3	72,9	8,9	1,05	73,0	1,0	67,0
0,612	6,80	3,63	0,5	62,8	8,0	1,57	71,0	1,5	61,1
0,717	4,90	3,21	0,7	53,7	7,0	—	—	—	—
0,702	3,81	2,94	0,9	42,2	6,7	—	—	—	—
0,801	2,80	—	1,0	35,7	5,9	—	—	—	—

ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ

19. Растворимость газов в воде

Растворимость выражена в виде коэффициента абсорбции α , равного приведенному к нормальным условиям (0°С и 101,325 кПа) объему газа (м³), поглощенному 1 м³ воды при парциальном давлении газа 101,325 кПа, или λ , имеющего то же значение, но при общем (не парциальном) давлении 101,325 кПа.

Газ	Способ выражения растворимости	Температура, °C							
		0	10	20	30	40	50	60	
CH ₄	α	0,0556	0,0418	0,0331	0,0276	0,0237	0,0213	0,0195	
C ₂ H ₂	α	1,73	1,31	1,03	0,84	—	—	—	
C ₂ H ₄	α	0,226	0,162	0,122	0,098	—	—	—	
C ₂ H ₆	α	0,0987	0,0656	0,0472	0,0362	0,0291	0,0246	0,0218	
CO	α	0,0354	0,0282	0,0232	0,0200	0,0177	0,0161	0,0149	
CO ₂	α	1,713	1,194	0,878	0,665	0,530	0,436	0,359	
Cl ₂	λ	4,610	3,148	2,299	1,799	1,438	1,225	1,023	
H ₂	α	0,0215	0,0195	0,0182	0,0170	0,0164	0,0161	0,0160	
HCl	λ	507	474	442	412	386	362	339	
H ₂ S	α	4,670	3,399	2,582	2,037	1,660	1,392	1,190	
N ₂	α	0,0236	0,0190	0,0160	0,0140	0,0125	0,0113	0,0102	
NH ₃	λ	1300	910	710	595	—	—	—	
NO	α	0,0738	0,0571	0,0471	0,0400	0,0351	0,0315	0,0295	
O ₂	α	0,0489	0,0380	0,0310	0,0261	0,0231	0,0209	0,0195	
SO	λ	79,79	56,65	39,37	27,16	18,77	—	—	

20. Парциальные давления компонентов растворов

X_2 — мольная доля в жидкой фазе компонента, указанного вторым; p_1 и p_2 выражены в мм рт. ст.

$X_2 \cdot 10^2$	Вода—метанол; 25 °C		Вода—ацетон; 25 °C		Вода—1,4-диоксан; 25 °C		Тетрахлорметан— трихлорметан; 25 °C		Этанол—бензол; 20 °C		Ацетон—диэтило- вый эфир; 30 °C	
	p_1	p_2	p_1	p_2	p_1	p_2	p_1	p_2	p_1	p_2	p_1	p_2
0	23,7	0	23,7	0	23,7	0	114,0	0	44,7	0	282,8	0
5	23,0	9,0	22,3	67	23,0	8,5	—	—	43,0	15,0	—	—
10	22,0	18,0	21,3	110	22,5	14,3	102,5	22,0	41,0	27,5	257	112
15	21,5	26,0	20,5	129	22,0	18,5	—	—	39,5	37,5	—	—
20	20,5	34,0	20,0	141	21,5	21,5	91,5	43,5	37,5	45,0	235	200
25	19,5	42,5	20,0	150	21,0	23,7	—	—	36,2	50,0	—	—
30	18,5	48,0	19,7	157	20,5	25,3	81,5	63,5	35,0	54,0	212	270
35	17,5	55,0	19,4	164	20,0	26,7	—	—	34,0	57,5	—	—
40	15,5	61,0	19,0	169	19,5	27,7	71,0	83,0	33,0	60,5	190	330
45	14,5	66,5	18,5	174	19,0	28,5	—	—	32,8	63,0	—	—
50	13,5	73,5	18,0	178	18,5	29,2	60,0	102,5	32,0	64,5	167	387
55	12,5	76,5	17,5	182	18,0	29,7	—	—	31,5	66,0	—	—
60	11,0	81,0	16,5	186	17,3	30,5	49,5	121,0	30,5	67,3	145	438
65	10,0	85,5	15,5	189	16,7	31,0	—	—	29,5	68,5	—	—
70	9,0	91,5	14,5	194	16,0	31,7	37,5	139,5	28,5	69,5	120	487
75	8,0	96,5	13,0	198	15,2	32,4	—	—	27,0	70,5	—	—
80	6,5	102,5	11,2	203	14,2	33,1	25,5	158,0	25,7	71,2	90	535
85	4,5	108,0	9,0	207	12,5	33,8	—	—	24,0	72,0	—	—
90	4,0	114,0	6,5	213	10,4	34,7	13,5	177,5	21,7	72,5	52	585
95	3,0	120,0	3,5	221	7,0	35,7	—	—	17,5	73,2	—	—
100	0	126,6	0	229,3	0	36,9	0	196,8	0	74,3	0	646

21. Давление насыщенного пара воды, льда и переохлажденной воды при различной температуре

$t, ^\circ\text{C}$	$P, \text{Па}$	$P, \text{мм рт. ст.}$	$t, ^\circ\text{C}$	$P, \text{кПа}$	$P, \text{атм}$
Вода					
0,0	610,8	4,581	100	101,32	1,00
5,0	871,8	6,539	110	143,26	1,41
10,0	1 227,1	9,204	120	198,54	1,96
15,0	1 704,1	12,782	130	270,12	2,67
20,0	2 336,8	17,527	140	361,36	3,57
25,0	3 166,3	23,75	150	475,97	4,70
30,0	4 241,7	31,82	160	618,04	6,10
35,0	5 621,7	42,17	170	792,02	7,82
40,0	7 374,9	55,32	180	1002,7	9,90
50,0	12 335	92,52	190	1 255,2	12,39
55,0	15 740	118,06	200	1 555,1	15,35
60,0	19 919	149,40	220	2 320,1	22,90
65,0	25 008	187,58	240	3 348,0	33,04
70,0	31 161	233,73	260	4 694,0	46,33
75,0	38 548	289,13	280	6 419,1	63,35
80,0	47 359	355,22	300	8 591,7	84,79
85,0	57 803	433,56	320	11 290	111,4
90,0	70 108	525,85	340	14 608	144,2
95,0	84 525	633,99	360	18 674	184,3
100,0	101 325	760,0	370	21 053	207,8
			374,12	22 115	218,3

$t, ^\circ\text{C}$	P			
	Па	мм рт. ст.	Па	мм рт. ст.
Лед				
0	610	4,579	610	4,579
-1	562	4,216	568	4,256
-2	517	3,879	527	3,952
-3	475	3,566	489	3,669
-4	436	3,276	454	3,404
-5	401	3,008	421	3,158
-10	259	1,946	286	2,143
-20	103	0,772	—	—
-30	37,3	0,280	—	—
-40	12,3	0,093	—	—
-50	3,9	0,029	—	—
-60	0,93	0,007	—	—
Переохлажденная вода				

22. Давление насыщенного пара ртути в интервале $-40 \div 358 ^\circ\text{C}$

$t, ^\circ\text{C}$	$P \cdot 10^3, \text{Па}$	$P \cdot 10^3, \text{мм рт. ст.}$	$t, ^\circ\text{C}$	$P, \text{кПа}$	$P, \text{мм рт. ст.}$
-40	0,239	0,179	80	0,0119	0,0887
-30	0,893	0,670	90	0,0231	0,158
-20	2,933	2,200	100	0,0383	0,271
-10	8,976	6,734	120	0,1005	0,738
0	25,31	18,98	140	0,2449	1,821
10	66,28	49,71	160	0,5522	4,126
20	162,66	122,0	180	1,159	8,678
30	373,46	280,1	200	2,283	17,12
40	815,71	611,8	250	9,882	74,12
50	1696,0	1272	300	32,87	246,55
60	3367,9	2526	350	89,64	672,3
70	6430,5	4823	358	103,60	777,0

23. Давление насыщенного пара металлов в интервале $400-2000 \text{ K}$

Металл	Давление, Па, при температуре, K					
	400	500	600	800	1000	1200
Li	—	$7,85 \cdot 10^{-7}$	$4,19 \cdot 10^{-4}$	0,9856	95,59	1 955
Na	$1,69 \cdot 10^{-4}$	$8,74 \cdot 10^{-2}$	4,524	880,7	17 730	—
K	$1,56 \cdot 10^{-3}$	2,74	82,5	5465	64 900	—
Mg	—	$4,23 \cdot 10^{-5}$	$1,48 \cdot 10^{-2}$	21,06	1 427	19 730
Ca	—	$3,04 \cdot 10^{-6}$	$3,32 \cdot 10^{-5}$	0,185	18,4	771,9
Zn	$1,46 \cdot 10^{-6}$	$3,48 \cdot 10^{-3}$	0,623	320	11 410	—
Cd	$2,48 \cdot 10^{-4}$	0,2013	16,53	2933	62 130	—
Ag	800	1000	1200	1500	1800	2000
	$1,31 \cdot 10^{-7}$	$7,48 \cdot 10^{-7}$	0,164	34,5	1140	6506
	—	$5,63 \cdot 10^{-8}$	$1,15 \cdot 10^{-4}$	0,227	27,73	249,3
	—	$2,72 \cdot 10^{-8}$	$5,61 \cdot 10^{-5}$	$6,17 \cdot 10^{-2}$	6,39	63,2
	—	$6,67 \cdot 10^{-6}$	$2,60 \cdot 10^{-3}$	0,952	48,66	345,3
	$5,43 \cdot 10^{-3}$	1,48	59,6	2347	26 130	86 390
	$4,79 \cdot 10^{-1}$	$2,04 \cdot 10^{-3}$	0,481	100,7	2 453	11 810
	—	—	$1,48 \cdot 10^{-5}$	$3,61 \cdot 10^{-2}$	6,13	70,4
	—	$1,25 \cdot 10^{-8}$	$1,01 \cdot 10^{-3}$	7,43	585,3	4 520
	—	—	—	—	—	—

24. Температура возгонки или кипения некоторых веществ

Вещество	Температура, °С. при				
	0,133 (1)	0,667 (5)	1,333 (10)	2,666 (20)	5,333 (40)
Неорганические					
AlCl ₃	100,0 (кр.)	116,4 (кр.)	123,8 (кр.)	131,8 (кр.)	139,9 (кр.)
AsCl ₃	-11,4	11,4	23,5	36,0	50,0
BCl ₃	-91,5	-75,2	-66,9	-57,9	-47,8
BeB ₂ H ₈	1,0 (кр.)	19,8 (кр.)	28,1 (кр.)	36,8 (кр.)	46,2 (кр.)
BeCl ₂	291 (кр.)	328 (кр.)	346 (кр.)	365 (кр.)	384 (кр.)
Br ₂	-48,7 (кр.)	-32,8 (кр.)	-25,0 (кр.)	-16,8 (кр.)	-8,0 (кр.)
Cl ₂	-118,0 (кр.)	-106,7 (кр.)	-101,6 (кр.)	-93,3	-84,5
HgCl ₂	136,2 (кр.)	166,0 (кр.)	180,2 (кр.)	195,8 (кр.)	212,5 (кр.)
HNO ₃	-	-	-5,4	-	-
H ₂ O	-17,3 (кр.)	+1,2	11,3	22,2	34,1
H ₂ O ₂	15,3	38,8	50,4	63,3	77,0
H ₂ SO ₄	145,8	178,0	194,2	211,5	229,7
I ₂	38,7 (кр.)	62,2 (кр.)	73,2 (кр.)	84,7 (кр.)	97,5 (кр.)
NH ₂ OH	-	39,0 (кр.)	47,2 (кр.)	55,8	64,6
NH ₃	-109,1 (кр.)	-97,5 (кр.)	-91,9 (кр.)	-85,8 (кр.)	-79,2 (кр.)
N ₂ H ₄	-	-	18,9	30,3	43,2
Na	439	511	549	589	633
P	76,6	111,2	128	146,2	166,7
PCl ₃	-51,6	-31,5	-21,3	-10,2	+2,3
PCl ₅	55,5 (кр.)	74,0 (кр.)	83,2 (кр.)	92,5 (кр.)	102,5 (кр.)
SO ₂	-95,5 (кр.)	-83,0 (кр.)	-76,8 (кр.)	-69,7	-60,5
SO ₂ Cl ₂	-	-35,1	-24,8	-13,4	-1,0
SO ₃ -γ	-15,3 (кр.)	-2,0 (кр.)	+4,3 (кр.)	11,1 (кр.)	17,9 (кр.)
SiCl ₄	-63,4	-44,1	-34,4	-24,0	-12,1
TiCl ₄	-13,9	+9,4	21,3	34,2	48,4

при давлении ниже атмосферного или равном ему

давления, кПа (мм рт. ст.)					T _{плавл.} °C	Вещество
7,999 (60)	13,33 (100)	26,66 (200)	53,33 (400)	101,32 (760)		
соединения						
145,4 (кр.)	152,0 (кр.)	161,8 (кр.)	171,6 (кр.)	180,2 (кр.)	192,4	AlCl ₃
58,7	70,9	89,2	109,7	130,4	-18	AsCl ₃
-41,2	-32,4	-18,9	-3,6	+12,7	-107	BCl ₃
51,7 (кр.)	58,6 (кр.)	69,0 (кр.)	79,7 (кр.)	90 (кр.)	123	BeB ₂ H ₈
395 (кр.)	411	435	461	487	405	BeCl ₂
-0,6	+9,3	24,3	41,0	58,2	-7,3	Br ₂
-79,0	-71,7	-60,2	-47,3	-33,8	-100,7	Cl ₂
222,2 (кр.)	237,0 (кр.)	256,5 (кр.)	275,5 (кр.)	304,0	277,0	HgCl ₂
—	34,2	—	—	83,8	-41,7	HNO ₃
41,6	51,6	66,5	83,0	100,0	0,0	H ₂ O
85,8	97,9	116,5	137,4 (разл.)	158,0 (разл.)	-0,9	H ₂ O ₂
241,5	257,0	279,8	305,0	330,0	10,5	H ₂ SO ₄
105,4 (кр.)	116,5	137,3	159,8	183,0	112,9	I ₂
70,0	77,5	87,9	99,2	110,0	34,0	NH ₂ OH
-74,3	-68,4	-57,0	-45,4	-33,6	-77,7	NH ₃
51,5	61,8	77,8	95,5	113,6	0,7	N ₂ H ₄
662	701	758	823	892	97,5	Na
179,8	197,3	222,7	251,0	280,0	44,1	P
10,2	21,0	37,6	56,9	74,2	-111,8	PCl ₃
108,3 (кр.)	117,0 (кр.)	131,3 (кр.)	147,2 (кр.)	162,0 (кр.)	167,0	PCl ₅
-54,6	-46,9	-35,4	-23,0	-10,0	-73,2	SO ₂
+7,2	17,8	33,7	51,3	69,2	-54,1	SO ₂ Cl ₂
21,4 (кр.)	28,0 (кр.)	35,8 (кр.)	44,0 (кр.)	51,6 (кр.)	62,1	SO ₃ -γ
-4,8	+5,4	21,0	38,4	56,8	-68,8	SiCl ₄
58,0	71,0	90,5	112,7	136,0	-30	TiCl ₄

Вещество		Температура, °C. при				
		0,133 (1)	0,667 (5)	1,333 (10)	2,666 (20)	5,333 (40)
Органические						
CCl_2F_2	Дихлордифторметан	-118,5	-104,6	-97,8	-90,1	-81,6
CCl_2O	Фосген	-92,9	-77,0	-69,3	-60,3	-50,3
CCl_3F	Трихлорфторметан	-84,3	-67,6	-59,0	-49,7	-39,0
CCl_4	Тетрахлорметан	-50,0 (кр.)	-30,0 (кр.)	-19,6	-8,2	+4,3
CHClF_2	Хлордифторметан	-122,8	-110,2	-103,7	-96,5	-88,6
CHCl_2F	Дихлорфторметан	-91,3	-75,5	-67,5	-58,6	-48,8
CHCl_3	Трихлорметан (хлоро- форм)	-58,0	-39,1	-29,7	-19,0	-7,1
CHN	Цианистый водород	-70,8 (кр.)	-55,6 (кр.)	-48,2 (кр.)	-40,3 (кр.)	-31,3 (кр.)
CH_2Cl_2	Дихлорметан	-70,0	-52,1	-43,3	-33,4	-22,3
CH_3O_2	Муравьиная кислота	-20,0 (кр.)	-5,0 (кр.)	+2,1 (кр.)	10,3	24,0
CH_4O	Метанол	-44,0	-25,3	-16,2	-6,0	+5,0
CO_2	Диоксид углерода	-134,3 (кр.)	-124,4 (кр.)	-119,5 (кр.)	-114,4 (кр.)	-108,6 (кр.)
CS_2	Сероуглерод	-73,8	-54,3	-44,7	-34,3	-22,5
C_2Cl_4	Тетрахлорэтилен	-20,6 (кр.)	+2,4	13,8	26,3	40,1
$\text{C}_2\text{HCl}_3\text{O}_2$	Трихлоруксусная кис- лота	51,0 (кр.)	76,0	88,2	101,8	116,3
$\text{C}_2\text{H}_2\text{Cl}_2\text{O}_2$	Дихлоруксусная кисло- та	44,0	69,8	82,6	96,3	111,8
$\text{C}_2\text{H}_3\text{ClO}_2$	Хлоруксусная кислота	43,0 (кр.)	68,3	81,0	94,2	109,2
$\text{C}_2\text{H}_3\text{N}$	Ацетонитрил	-47,0 (кр.)	-26,6	-16,3	-5,0	+7,7
$\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$	Уксусная кислота	-17,2 (кр.)	+6,3 (кр.)	17,5	29,9	43,0
$\text{C}_2\text{H}_4\text{Cl}_2$	1,2-Дихлорэтан	-44,5	-24,0	-13,6	-2,4	+10,0
$\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$	Этанол	-31,3	-12,0	-2,3	+8,0	19,0
$\text{C}_2\text{H}_6\text{O}_2$	Этиленгликоль	53,0	79,7	92,1	105,8	120,0
$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$	Ацетон	-59,4	-40,5	-31,1	-20,8	-9,4
$\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_2$	Метилацетат	-57,2	-38,6	-29,3	-19,1	-7,9
$\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_2$	Пропионовая кислота	4,6	28,0	39,7	52,0	65,8
$\text{C}_3\text{H}_7\text{O}$	Пропанол	-15,0	+5,0	14,7	25,3	36,4
$\text{C}_3\text{H}_7\text{O}_2$	Глицерин	125,5	153,8	167,2	182,2	198,0

давления, кПа (мм рт.ст.)					T _{плавл.} °C	Вещество
7,999 (60)	13,33 (100)	26,66 (200)	53,33 (400)	101,32 (760)		
соединения						
-76,1	-68,6	-57,0	-43,9	-29,8	-160	CCl ₂ F ₂
-44,0	-35,6	-22,3	-7,6	+3,3	-104	CCl ₂ O
-32,3	-23,0	-9,1	+6,8	23,7	-111	CCl ₃ F
12,3	23,0	38,3	57,8	76,8	-22,9	CCl ₄
-83,4	-76,4	-65,8	-53,6	-40,8	-160	CHClF ₂
-42,6	-33,9	-20,9	-6,2	+8,9	-135	CHCl ₂ F
+0,5	10,4	25,9	42,7	61,3	-63,5	CHCl ₃
-25,8 (кр.)	-18,8 (кр.)	-5,9	+9,8	25,8	-14	CHN
-15,7	-6,3	+8,0	21,1	40,7	-96,7	CH ₂ Cl ₂
32,4	43,8	61,4	80,3	100,7	8,2	CH ₂ O ₂
12,1	21,2	34,8	49,9	61,5	-97,9	CH ₄ O
-104,8 (кр.)	-100,2 (кр.)	-95,0 (кр.)	-85,7 (кр.)	-73,2 (кр.)	-57,5	CO ₂
-15,3	-5,1	+10,4	28,0	46,2	-111,9	CS ₂
49,2	61,3	79,8	100,0	120,8	-19,0	C ₂ Cl ₄
125,9	137,8	155,4	175,2	195,6	57	C ₂ HCl ₃ O ₂
121,5	134,0	152,3	173,7	194,4	9,7	C ₂ H ₂ Cl ₂ O ₂
118,3	130,7	149,0	169,0	189,5	61,2	C ₂ H ₃ ClO ₂
15,9	27,0	43,7	62,5	81,6	-44,9	C ₂ H ₃ N
51,7	63,0	80,0	99,0	118,1	16,8	C ₂ H ₄ O ₂
18,1	29,4	45,7	64,0	83,5	-35,9	C ₂ H ₄ Cl ₂
26,0	34,9	48,4	63,5	78,4	-114,5	C ₂ H ₆ O
129,5	141,8	158,5	178,5	197,3	-15,6	C ₂ H ₆ O ₂
-2,0	+7,7	22,7	39,5	56,2	-95,4	C ₃ H ₆ O
-0,5	+9,4	24,0	40,0	57,8	-98,7	C ₃ H ₆ O ₂
74,1	85,8	102,5	122,0	141,1	-22	C ₃ H ₆ O ₂
43,5	52,8	66,8	82,0	97,2	-126,2	C ₃ H ₈ O
208,0	220,1	240,0	263,0	290,0	17,9	C ₃ H ₈ O ₃

Вещество		Температура, °С, при				
		0,133 (1)	0,667 (5)	1,333 (10)	2,666 (20)	5,333 (40)
$C_4H_8O_2$	Масляная кислота	25,5	49,8	61,5	74,0	88,0
$C_4H_8O_2$	1,4-Диоксан	-35,8 (кр.)	-12,8 (кр.)	-1,2 (кр.)	+12,0	25,2
$C_4H_8O_2$	Этилацетат	-43,4	-23,5	-13,5	-3,0	+9,1
$C_4H_{10}O$	Диэтиловый эфир	-74,3	-56,9	-48,1	-38,5	-27,7
$C_4H_{10}O$	Бутанол	-1,2	+20,0	30,2	41,5	53,4
$C_4H_{12}Pb$	Тетраметилсвинец	-29,0 (кр.)	-6,8	+4,4	16,6	30,3
C_5H_5N	Пиридин	-18,9	+2,5	13,2	24,8	38,0
$C_5H_{12}O$	Амилловый спирт	13,6	34,7	44,9	55,8	68,0
C_6H_5Br	Бромбензол	2,9	27,8	40,0	53,8	68,6
C_6H_5Cl	Хлорбензол	-13,0	+10,6	22,2	35,3	49,7
C_6H_5I	Иодбензол	24,1	50,6	64,0	78,3	94,4
$C_6H_5NO_2$	Нитробензол	44,4	71,6	84,9	99,3	115,4
C_6H_6	Бензол	-36,7 (кр.)	-19,6 (кр.)	-11,5 (кр.)	-2,6 (кр.)	+7,6
C_6H_6O	Фенол	40,1 (кр.)	62,5	73,8	86,0	100,1
C_6H_7N	Анилин	34,8	57,9	69,4	82,0	96,7
C_6H_{12}	Циклогексан	-45,3 (кр.)	-25,4 (кр.)	-15,9 (кр.)	-5,0 (кр.)	+6,7
C_6H_{14}	Гексан	-53,9	-34,5	-25,0	-14,	-2,3
$C_7H_6O_2$	Бензойная кислота	96,0 (кр.)	119,5 (кр.)	132,1	146,7	162,6
C_7H_8	Толуол	-26,7	-4,4	+6,4	18,4	31,8
C_7H_8O	Бензиловый спирт	58,0	80,8	92,6	105,8	119,8
C_7H_{16}	Гептан	-34,0	-12,7	-2,1	+9,5	22,3
C_8H_8O	Ацетофенон	37,1	64,0	78,0	92,4	109,4
C_8H_{10}	Этилбензол	-9,8	+13,9	25,9	38,6	52,8
C_8H_{18}	Октан	-14,0	+8,3	19,2	31,5	45,1
$C_8H_{20}Pb$	Тетраэтилсвинец	38,4	63,6	74,8	88,0	102,4
$C_{10}H_8$	Нафталин	52,6 (кр.)	74,2 (кр.)	85,8	101,7	119,3
$C_{10}H_{16}O$	<i>α</i> -Камфора	41,5 (кр.)	68,6 (кр.)	82,3 (кр.)	97,5 (кр.)	114,0 (кр.)
$C_{12}H_{10}$	Дифенил	70,6	101,8	117,0	134,2	152,5
$C_{14}H_{10}$	Антрацен	145,0 (кр.)	173,5 (кр.)	187,2 (кр.)	201,9 (кр.)	217,5 (кр.)

давления, кПа (мм рт. ст.)					$T_{\text{плавл.}}^{\circ}\text{C}$	Вещество
7,999 (60)	13,33 (100)	26,66 (200)	53,33 (400)	101,32 (760)		
96,5	108,0	125,5	144,5	163,5	-4,7	$C_4H_8O_2$
33,8	45,1	62,3	81,8	101,3	11,8	$C_4H_8O_2$
16,6	27,0	42,0	59,3	77,2	-83,6	$C_4H_8O_2$
-21,8	-11,5	+2,2	17,9	34,6	-116,3	$C_4H_{10}O$
60,3	70,1	84,3	100,8	117,5	-79,9	$C_4H_{10}O$
39,2	50,8	63,8	89,0	110,0	-27,5	$C_4H_{12}Pb$
46,8	57,8	75,0	95,6	115,3	-41,8	C_5H_5N
75,5	85,8	102,0	119,8	137,8	-78,8	$C_5H_{12}O$
78,1	90,8	110,1	132,3	156,2	-30,7	C_6H_5Br
58,3	70,7	89,4	110,0	132,2	-45,2	C_6H_5Cl
105,0	118,3	139,8	163,9	188,6	-28,5	C_6H_5I
125,8	139,9	161,2	185,8	210,9	5,8	$C_6H_5NO_2$
15,4	26,1	42,2	60,6	80,1	5,5	C_6H_6
108,4	121,4	139,0	160,0	181,9	40,6	C_6H_6O
106,0	119,9	140,1	161,9	184,4	-6,2	C_6H_7N
14,7	25,5	42,0	60,8	80,7	6,6	C_6H_{12}
+5,4	15,8	31,6	49,6	68,7	-95,3	C_6H_{14}
172,8	186,2	205,8	227,0	249,2	121,7	$C_7H_6O_2$
40,3	51,9	69,5	89,5	110,6	-95,0	C_7H_8
129,3	141,7	160,0	183,0	204,7	-15,3	C_7H_8O
30,6	41,8	58,7	78,0	98,4	-90,6	C_7H_{16}
119,8	133,6	154,2	178,0	202,4	20,5	C_8H_8O
61,8	74,1	92,7	113,8	136,2	-94,9	C_8H_{10}
53,8	65,7	83,6	104,0	125,6	-56,8	C_8H_{18}
111,7	123,8	142,0	161,8	183,0	-136,0	$C_8H_{20}Pb$
130,2	145,5	167,7	193,2	217,9	80,2	$C_{10}H_8$
124,0 (кр.)	138,0 (кр.)	157,9 (кр.)	182,0	209,2	178,5	$C_{10}H_{16}O$
165,2	180,7	204,2	229,4	254,9	69,5	$C_{12}H_{10}$
231,8	250,0	279,0	310,2	342,0	217,5	$C_{14}H_{10}$

25. Температура возгонки или кипения некоторых веществ при давлении выше атмосферного

Вещество	Температура, °С, при давлении, кПа (атм)					
	101,32 (1)	202,65 (2)	506,6 (5)	1013,2 (10)	2026,5 (20)	3039,8 (30)
Br ₂	58,2	78,8	110,3	139,8	174,0	197,0
CO ₂	-78,2 (кр.)	-69,1 (кр.)	-56,7	-39,5	-18,9	-5,3
COCl ₂	8,3	27,3	57,2	85,0	119,0	141,8
Cl ₂	-33,8	-16,9	+10,3	35,6	65,0	84,8
H ₂	-252,5	-250,2	-246,0	-241,8	-135,0	-153,8
HCN	25,9	45,8	75,8	102,7	135,0	153,8
N ₂	-195,8	-189,2	-179,1	-169,8	-157,6	-148,3
NH ₃	-33,6	-18,7	+4,7	25,7	50,1	66,1
O ₂	-183,1	-176,0	-164,5	-153,2	-140,0	-130,7
SO ₂	-10,0	+6,3	32,1	55,5	83,8	102,6
	44,8	60,0	82,5	104,0	138,0	157,8

26. Температура диссоциации твердых веществ при различном давлении

Под температурой диссоциации понимают температуру, при которой давление газов при равновесии равно внешнему давлению.

Реакция	Температура, °С, при давлении, кПа (мм рт. ст.)					
	13,33 (100)	26,66 (200)	40,0 (300)	53,33 (400)	66,7 (500)	80,0 (600)
NH ₄ Cl $\rightleftharpoons$ NH ₃ + HCl	260	292	306	317	324	332
CaCO ₃ $\rightleftharpoons$ CaO + CO ₂	762	808	837	853	870	884
Ca(OH) ₂ $\rightleftharpoons$ CaO + H ₂ O	450	479	499	513	524	534
Mg(OH) ₂ $\rightleftharpoons$ MgO + H ₂ O	76	95	111	127	140	153
2BaO ₂ $\rightleftharpoons$ 2BaO + O ₂	680	717	743	760	773	783
Fe ₂ (SO ₄) ₃ $\rightleftharpoons$ Fe ₂ O ₃ + 3SO ₃	628	366	681	690	697	702

27. Давление пара над кристаллогидратами при различной температуре

t, °С	P, кПа	P, мм рт. ст.	t, °С	P, кПа	P, мм рт. ст.
BaCl ₂ ·2H ₂ O $\rightleftharpoons$ BaCl ₂ ·H ₂ O + H ₂ O (г.)			CuSO ₄ ·H ₂ O $\rightleftharpoons$ CuSO ₄ + H ₂ O (г.)		
20	0,447	3,35	100	0,827	6,2
25	0,680	5,10	110	1,507	11,3
30	1,007	7,55	120	2,906	21,8
35	1,487	11,15	130	4,986	37,4
BaCl ₂ ·H ₂ O $\rightleftharpoons$ BaCl ₂ + H ₂ O (г.)			140	8,079	60,6
65	0,613	4,6	MgSO ₄ ·7H ₂ O $\rightleftharpoons$ MgSO ₄ ·6H ₂ O + H ₂ O (г.)		
70	0,987	7,4	15	0,653	4,90
75	1,373	10,3	20	1,003	7,52
CuSO ₄ ·5H ₂ O $\rightleftharpoons$ CuSO ₄ ·3H ₂ O + 2H ₂ O (г.)			25	1,533	11,50
15	0,425	3,19	30	2,256	16,92
20	0,647	4,85	Na ₂ SO ₃ ·7H ₂ O $\rightleftharpoons$ Na ₂ SO ₃ + 7H ₂ O (г.)		
25	0,980	7,35	15	1,168	8,76
30	1,437	10,78	20	1,732	12,99
35	2,077	15,58	25	2,478	18,59
CuSO ₄ ·3H ₂ O $\rightleftharpoons$ CuSO ₄ ·H ₂ O + 2H ₂ O (г.)			30	3,577	26,83
25	0,747	5,6	Na ₂ HPO ₄ ·12H ₂ O $\rightleftharpoons$ Na ₂ HPO ₄ ·7H ₂ O + 5H ₂ O (г.)		
30	1,093	8,2	15	1,200	9,00
35	1,560	11,7	20	1,724	12,93
40	2,120	15,9	25	2,560	19,20
50	4,053	30,4	30	3,606	27,05
60	7,666	57,5	ZnSO ₄ ·7H ₂ O $\rightleftharpoons$ ZnSO ₄ ·6H ₂ O + H ₂ O (г.)		
70	14,00	105	20	1,296	9,72
80	24,40	183	25	1,936	14,52
			30	2,860	21,45

28. Равновесия фаз в одно-, двух- и трехкомпонентных системах

На рис. 28.1—28.31 приведены диаграммы гетерогенных систем: твердое—твердое, твердое—жидкость, жидкость—жидкость, твердое—газ, жидкость—газ, газ—газ.




Рис. 28.1. Вода (схема).




Рис. 28.3. Сера (схема).




Рис. 28.5. SiO_2 (схема).




Рис. 28.2. Вода.




Рис. 28.4. Углерод (схема).




Рис. 28.6. $\text{NaCl}-\text{AgCl}$.




Рис. 28.7. $\text{H}_2\text{O}-\text{CH}_3\text{COOH}$.




Рис. 28.9. $\text{H}_2\text{O}-\text{HNO}_3$.




Рис. 28.8. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}-\text{CCl}_4$.




Рис. 28.10. $\text{LiCl}-\text{NaCl}$.




Рис. 28.11. $\text{Na}_2\text{SO}_4-\text{Ag}_2\text{SO}_4$.




Рис. 28.12. $\text{NaAlSiO}_4-\text{KAlSiO}_4$.




Рис. 28.13. Hg—Cd.




Рис. 28.14. Al—Si.




Рис. 28.15. Co—Vi.




Рис. 28.16. H₂O—C₆H₅NH₂.




Рис. 28.17. H₂O—C₈H₁₁N (вода—2,3,4-три-метилпиридин).




Рис. 28.18. H₂O—C₇H₉N (вода—2,6-диметилпиридин).




Рис. 28.19. H₂O—C₅H₄O₂ (вода — фурфурол).




Рис. 28.20. N₂—NH₃.




Рис. 28.21. H₂O—HNO₃.




Рис. 28.22. Na—K.





Рис. 28.23. CuBr—CuBr₂.

Рис. 28.24. Bi—Pb. →






Рис. 28.25. Ag—Sb.




Рис. 28.26. H₂O—NaOH—N₂H₄.




Рис. 28.27. H₂O—LiCl—KCl.




Рис. 28.28 и 28.29. H₂O—NH₄NCS—Ba(NCS)₂.




Рис. 28.30. CaF₂—Na₃AlF₆—Al₂O₃.




Рис. 28.31. C₆H₅COOH—C₆H₄(OH)COOH—*m*-C₆H₄(NH₂)₂.

29. Коэффициенты распределения некоторых веществ между жидкими фазами

c_1 — равновесная молярная концентрация растворенного вещества в воде, моль/л; c_2 — то же во второй фазе.

c_1	c_2	c_1/c_2	c_1	c_2	c_1/c_2
Вода — бензол			Вода — диэтиловый эфир		
Ацетон (25 °C)			Бензойная кислота (10 °C)		
0,01583	0,01437	1,102	0,00090	0,0639	0,0141
0,2200	0,2065	1,065	0,00249	0,226	0,0110
2,2167	2,3947	0,926	Вода — сероуглерод		
Муравьиная кислота (25 °C)			Иод (25 °C)		
2,5739	0,00568	453	$5,18 \cdot 10^{-5}$	0,03036	0,0017
9,0466	0,0378	240	$25,71 \cdot 10^{-5}$	0,1676	0,0015
Уксусная кислота (25 °C)			Вода — хлороформ		
0,7760	0,0199	39,0	Иод (25 °C)		
7,7407	0,8233	9,4	0,00025	0,0338	0,0074
12,2073	4,8640	2,51	0,00120	0,1546	0,0078
Фенол (25 °C)			0,00184	0,2318	0,0079
0,00202	0,00466	0,433	0,00242	0,3207	0,0075
0,1013	0,279	0,36	Уксусная кислота (25 °C)		
0,5299	6,487	0,08	0,405	0,0231	17,5
Соляная кислота (20 °C)			1,188	0,1351	8,8
0,946	$4,94 \cdot 10^{-5}$	20 000	2,056	0,3493	5,9
2,599	$76,8 \cdot 10^{-5}$	3 400	Фенол (25 °C)		
8,555	0,025	342	0,0737	0,254	0,290
19,709	0,507	38,9	0,163	0,761	0,214
			0,247	1,85	0,177
			0,436	5,43	0,080

ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ И РАСТВОРЕНИЯ. ТЕПЛОЕМКОСТЬ

30. Теплота сгорания некоторых веществ в стандартных условиях

Конечные продукты сгорания: CO_2 (г.), H_2O (ж.), SO_2 (г.), N_2 (г.). В соединениях, содержащих галогены, конечные продукты указаны в скобках.

Вещество	$-\Delta H_{298}^\circ$, кДж/моль	Вещество	$-\Delta H_{298}^\circ$, кДж/моль
Углеводороды			
CH_4 (г.) метан	890,31	C_6H_{12} (г.) циклогексан	3953,00
C_2H_2 (г.) ацетилен	1299,63	C_6H_{14} (ж.) гексан	4163,05
C_2H_4 (г.) этилен	1410,97	C_6H_{14} (ж.) гексан	4194,75
C_3H_8 (г.) пропан	1559,88	C_7H_8 (ж.) толуол	3910,28
C_4H_{10} (г.) бутан	2877,13	C_7H_{10} (г.) толуол	3947,94
C_4H_{10} (г.) изобутан	2868,76	C_8H_{10} (ж.) α -ксилол	4551,81
C_5H_{12} (ж.) циклопентан	3290,73	C_8H_{10} (ж.) α -ксилол	4552,80
C_5H_{12} (г.) циклопентан	3319,54	C_8H_{10} (ж.) α -ксилол	4552,80
C_5H_{12} (ж.) пентан	3509,20	C_8H_{12} (ж.) октан	5470,58
C_5H_{12} (г.) пентан	3536,15	C_{10}H_8 (кр.) нафталин	5156,78
C_6H_6 (ж.) бензол	3267,58	$\text{C}_{10}\text{H}_{10}$ (кр.) дифенил	6249,22
C_6H_6 (г.) бензол	3301,51	$\text{C}_{14}\text{H}_{10}$ (кр.) антрацен	7667,45
C_6H_{12} (ж.) циклогексан	3919,91	$\text{C}_{14}\text{H}_{10}$ (кр.) фенантрен	7049,87
Кислородсодержащие соединения			
CO (г.) оксид углерода	282,92	$\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$ (ж.) 1,4-диоксан	2316,56
CH_3O (г.) формальдегид	561,07	$\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$ (ж.) этилацетат	2246,39
CH_3O_2 (ж.) муравьиная кислота	254,58	$\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$ (ж.) бутанол	2671,90
CH_3O (ж.) метанол	726,60	$\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$ (ж.) диэтиловый эфир	2726,71
$\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ (кр.) щавелевая кислота	251,88	$\text{C}_5\text{H}_{12}\text{O}$ (ж.) аминловый спирт	3320,84
$\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$ (г.) ацетальдегид	1193,07	$\text{C}_6\text{H}_6\text{O}$ (кр.) фенол	3063,52
$\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$ (г.) этиленоксид	1306,05	$\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_2$ (кр.) гидрохинон	2860,60
$\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ (ж.) уксусная кислота	874,58	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ (кр.) α -глюкоза	2802,04
$\text{C}_2\text{H}_5\text{O}$ (ж.) этанол	1370,68	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ (кр.) β -глюкоза	2808,04
$\text{C}_2\text{H}_5\text{O}$ (ж.) диметилкетон (ацетон)	1785,73	$\text{C}_7\text{H}_{12}\text{O}_2$ (кр.) бензойная кислота	3226,70
$\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$ (ж.) 1-пропанол	2010,41	$\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}$ (кр.) камфора	5924,84
$\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$ (ж.) 2-пропанол	1986,56	$\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ (кр.) сахараза	5646,73
$\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_2$ (ж.) глицерин	1661,05	$\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{O}_2$ (кр.) стеариновая кислота	11274,6

Галогенсодержащие соединения

CCl_4 (ж.) тетрахлорметан	260,65 *	CH_3Cl (ж.) хлорметан	759,94 **
CHCl_3 (ж.) трихлорметан (хлороформ)	428,06 **	$\text{C}_6\text{H}_5\text{Cl}$ (ж.) хлорбензол	3110,30 **

Серусодержащие соединения

COS (г.) сероокись углерода	553,12	H_2S (г.) сероводород	578,98
CS_2 (ж.) сероуглерод	1075,29		

Азотсодержащие соединения

$\text{CH}_3\text{O}_2\text{N}$ (ж.) нитрометан	708,77	$\text{C}_3\text{H}_7\text{N}$ (г.) триметиламин	2442,92
CH_3ON_2 (кр.) карбамид (мочевина)	632,20	$\text{C}_4\text{H}_7\text{N}$ (ж.) пиридин	2755,16
CH_3N (г.) метиламин	1085,08	$\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_2\text{N}$ (кр.) пикриновая кислота	2560,2
$\text{C}_2\text{H}_5\text{N}$ (г.) диметиламин	1768,59	$\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_2\text{N}$ (ж.) нитробензол	3091,2
$\text{C}_2\text{H}_5\text{N}_2$ (г.) дициан	1087,8	$\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_2\text{N}$ (ж.) α -нитрофенол	2884,0
$\text{C}_3\text{H}_5\text{O}_2\text{N}$ (ж.) нитроглицерин	1541,4	$\text{C}_6\text{H}_7\text{N}$ (ж.) анилин	3396,2

* Продукты сгорания: CO_2 и Cl_2 (г.).

** Продукты сгорания: CO_2 , Cl_2 (г.), HCl (раствор.).

*** Продукты сгорания: CO_2 , H_2O (ж.), HCl (раствор.).

31. Интегральная теплота растворения солей в воде при 25 °C
 При $m = 0,00$ даны значения ΔH_m° экстраполированные к бесконечному разбавлению.

m , моли соли на 1 кг H_2O	ΔH_m° , кДж/моль										
	LiCl	LiBr	NaCl	NaBr	NaI	KCl	KBr	KI	KClO ₃		
0,00	-37,13	-49,02	3,89	-0,63	-7,57	17,23	20,04	20,50	50,84		
0,01	-36,97	-48,91	4,06	-0,50	-7,41	17,39	20,17	20,67	50,89		
0,02	-36,86	-48,87	4,10	-0,42	-7,36	17,44	20,25	20,71	50,84		
0,05	-36,71	-48,74	4,18	-0,31	-7,24	17,51	20,29	20,73	50,66		
0,1	-36,48	-48,62	4,25	-0,29	-7,20	17,55	20,33	20,71	50,37		
0,2	-36,34	-48,39	4,27	-0,27	-7,15	17,57	20,29	20,67	—		
0,3	-36,19	-48,28	4,25	-0,29	-7,24	17,55	20,25	20,59	—		
0,4	-36,07	-48,20	4,16	-0,40	-7,32	17,50	20,15	20,42	—		
0,5	-35,98	-48,12	4,10	-0,44	-7,41	17,43	20,04	20,29	—		
1,0	-35,65	-47,74	3,79	-0,86	-7,82	17,28	19,54	19,73	—		
2,0	-35,15	-47,11	3,18	-1,65	-8,62	16,72	18,68	18,62	—		
3,0	-34,52	-46,53	2,66	-2,28	-9,37	16,17	17,99	17,66	—		
4,0	-33,89	-46,02	2,26	-2,78	-10,04	15,75	17,36	16,82	—		
5,0	-33,18	-45,50	1,99	-3,20	-10,54	—	16,82	16,09	—		
6,0	-32,43	-44,85	1,88	-3,47	-10,92	—	—	15,47	—		
7,0	-31,63	-44,2	—	-3,66	-11,13	—	—	14,92	—		
8,0	-30,79	-43,51	—	-3,70	-11,25	—	—	14,46	—		
9,0	-29,92	-42,80	—	-3,62	-11,25	—	—	—	—		
10,0	-29,00	-41,97	—	—	-11,17	—	—	—	—		
Насыщ. раствор $m_{\text{насыщ}}$	-19,35	-31,88	1,95	-3,61	-10,59	15,45	16,49	14,07	—		
	19,9	18,6	6,15	9,15	12,33	4,82	5,73	8,98	—		

Продолжение

m, моли соли на 1 кг H ₂ O	ΔH_m , кДж/моль									
	KNO ₃	NH ₄ Cl	NH ₄ NO ₃	CaCl ₂	K ₂ SO ₄	CuSO ₄	MgSO ₄	MnSO ₄	ZnSO ₄	Al ₂ (SO ₄) ₃
0,00	34,93	14,73	25,77	-82,93	23,71	-73,14	-91,63	-64,39	-83,26	-350,5
0,01	35,03	14,85	25,77	-82,68	24,48	-69,87	-89,37	-60,71	-80,67	—
0,02	35,02	14,94	25,79	-82,38	24,58	-69,33	-89,04	-60,12	-80,29	—
0,05	34,94	15,02	25,82	-81,25	24,75	-68,70	-88,45	-59,29	-79,70	—
0,1	34,77	15,10	25,75	-80,88	24,78	-68,07	-87,91	-58,70	-79,16	-344,3
0,2	—	15,19	25,56	-80,50	24,58	-67,57	-87,26	-57,95	-78,78	-343,3
0,3	—	15,23	25,38	-80,25	24,27	-67,32	-86,92	-57,53	-78,58	-342,1
0,4	—	15,27	25,21	-80,02	23,95	-67,15	-86,67	-57,24	-78,41	-340,8
0,5	—	15,27	25,06	-79,83	23,58	-67,03	-86,48	-57,07	-78,28	-339,3
1,0	—	15,31	24,31	-79,04	—	-66,65	-85,77	-56,65	-77,91	-330,5
2,0	—	15,27	23,05	-77,74	—	—	-84,87	-55,56	-77,03	—
3,0	—	15,23	21,97	—	—	—	—	—	-75,44	—
4,0	—	15,19	21,17	—	—	—	—	—	—	—
5,0	—	15,15	20,46	—	—	—	—	—	—	—
6,0	—	15,10	19,92	—	—	—	—	—	—	—
7,0	—	15,02	19,41	—	—	—	—	—	—	—
8,0	—	—	18,95	—	—	—	—	—	—	—
9,0	—	—	18,54	—	—	—	—	—	—	—
10,0	—	—	18,16	—	—	—	—	—	—	—
Насыщ. раствор	—	15,02	—	—	22,78	—	—	—	—	—
m _{насыщ}	—	7,35	—	—	0,69	—	—	—	—	—

32. Интегральная теплота растворения кислот и оснований в воде при 25 °C

Число молей H ₂ O на 1 моль кислоты или щелочи	m, моли кислоты или щелочи на 1 кг H ₂ O	-ΔH _m , кДж/моль							
		HCOOH	HCl	HNO ₃	H ₂ SO ₄	H ₃ PO ₄	NH ₃	NaOH	KOH
1	55,51	0,83	26,23	13,11	28,07	-4,52	29,54	-	-
2	27,75	0,87	48,82	20,08	41,92	-0,50	32,05	-	-
3	18,50	0,79	56,85	24,30	48,99	1,88	32,76	28,89	41,80
4	13,88	0,71	61,20	26,98	54,06	3,47	33,26	34,43	45,77
5	11,10	0,67	64,05	28,73	58,03	4,52	33,60	37,76	48,24
6	9,25	0,62	65,89	29,84	60,75	5,36	-	39,87	49,87
8	6,94	0,58	68,23	31,12	64,60	6,40	-	41,92	51,76
10	5,55	0,56	69,49	31,84	67,03	7,11	34,27	42,51	52,66
15	3,70	0,55	70,99	32,46	70,17	8,08	-	42,84	53,62
20	2,78	0,55	71,78	32,67	71,50	8,58	34,43	42,87	53,95
30	1,85	0,56	72,59	32,76	72,68	9,12	34,48	-	-
40	1,39	0,57	73,02	32,75	73,09	-	34,48	-	-
50	1,11	0,60	73,28	32,74	73,35	9,58	34,52	42,53	54,33
75	0,740	0,65	73,65	32,74	73,68	9,87	-	-	-
100	0,555	0,66	73,85	32,75	73,97	10,04	34,56	42,34	54,45
200	0,278	-	74,20	32,80	74,94	10,42	34,64	42,30	54,56
500	0,111	-	74,52	32,90	76,73	10,71	-	42,36	54,75
700	0,0793	-	74,61	32,94	77,57	10,79	-	-	-
1 000	0,0555	-	74,68	32,98	78,58	10,84	-	42,47	54,87
2 000	0,0278	-	74,82	33,05	80,88	10,96	-	42,55	55,00
5 000	0,0111	-	74,93	33,13	84,43	11,05	-	42,66	55,10
10 000	0,0056	-	74,99	33,19	87,07	11,09	-	42,72	55,17
20 000	0,0028	-	75,04	-	89,62	11,13	-	-	-
50 000	0,0011	-	75,08	33,27	92,34	11,17	-	42,80	55,25
∞	0,0060	0,71	75,14	33,34	96,19	(13,4)	34,64	42,87	55,31

33. Интегральная теплота растворения солей, образующих кристаллогидраты, при 25 °C

Вещество	Число молей H ₂ O на 1 моль соли	-ΔH _m , кДж/моль	Вещество	Число молей H ₂ O на 1 моль соли	-ΔH _m , кДж/моль
BaCl ₂	400	11,18	MgSO ₄ ·6H ₂ O	400	1,00
BaCl ₂ ·H ₂ O	400	-7,74	MgSO ₄ ·7H ₂ O	400	-15,86
BaCl ₂ ·2H ₂ O	400	-18,74	Na ₂ CO ₃	400	23,43
CuSO ₄	500	68,37	Na ₂ CO ₃ ·7H ₂ O	400	-45,86
CuSO ₄ ·H ₂ O	500	40,42	Na ₂ CO ₃ ·10H ₂ O	400	-69,04
CuSO ₄ ·3H ₂ O	500	12,68	Na ₂ HPO ₄	500	25,94
CuSO ₄ ·5H ₂ O	500	-10,50	Na ₂ HPO ₄ ·2H ₂ O	500	0,17
LiCl	800	36,53	Na ₂ HPO ₄ ·7H ₂ O	500	-47,95
LiCl·H ₂ O	800	18,58	Na ₂ HPO ₄ ·12H ₂ O	500	-96,06
LiCl·2H ₂ O	800	4,06	ZnSO ₄	500	77,28
LiCl·3H ₂ O	800	-8,83	ZnSO ₄ ·H ₂ O	500	42,13
MgSO ₄	400	87,61	ZnSO ₄ ·6H ₂ O	500	-4,31
MgSO ₄ ·2H ₂ O	400	46,36	ZnSO ₄ ·7H ₂ O	500	-18,87
MgSO ₄ ·4H ₂ O	400	17,66			

34. Интегральная теплота растворения солей в ацетоне, этиленгликоле, этаноле и метаноле

При m = 0,00 даны значения -ΔH_m, экстраполированные к бесконечному разбавлению.

m, моли соли на 1 кг растворителя	-ΔH _m , кДж/моль											
	NaI в ацетоне		NaI в этилен- гликоле		NaI в этаноле		NaI в метаноле		KI в метаноле		KI в этилен- гликоле	
	25 °C		25 °C		25 °C		25 °C		25 °C			
	40 °C	2,5 °C	25 °C	25 °C	45 °C	25 °C	50 °C	25 °C	50 °C	50 °C		
0,00	44,10	42,93	33,80	31,80	24,52	23,79	32,05	29,08	—	—	4,35	
0,01	42,55	41,46	30,42	—	23,64	22,43	31,71	—	—	—	4,18	
0,05	39,37	37,28	30,04	29,08	21,09	20,29	29,87	—	—	—	3,49	
0,1	36,82	32,97	29,66	28,37	19,75	18,41	27,99	28,66	-0,63	-0,00	3,14	
0,2	34,39	31,46	29,08	27,61	18,00	16,57	26,48	27,20	-2,64	-2,01	2,64	
0,3	33,39	30,54	28,70	27,24	16,86	15,31	25,98	26,36	-3,97	-3,56	2,28	
0,4	32,55	29,79	28,45	27,03	16,02	14,39	25,61	25,94	-4,06	-3,97	2,01	
0,5	31,88	29,20	28,20	26,78	15,48	13,60	25,23	25,52	-4,14	-4,39	1,78	
1,0	28,95	26,11	27,28	25,86	14,31	11,17	23,85	22,59	-4,52	-6,07	0,95	
2,0	23,93	21,00	25,52	24,02	11,92	8,49	21,55	17,99	—	—	-0,35	
Насыщ. раствор	21,92	20,59	—	—	10,21	6,02	14,23	10,04	-4,69	-6,40	—	
m _{насыщ}	2,68	≈2,20	—	—	2,84	2,89	5,34	5,34	1,01	1,08	—	

35. Интегральная теплота растворения нодида натрия в водно-диоксидных растворах при 25 °С

При $m = 0,000$ даны значения $-\Delta H_m$, экстраполированные к бесконечному разбавлению.

m , моли NaI на 1 кг растворителя	$-\Delta H_m$ (кДж/моль) при массовом содержании диоксида в растворителе, %			
	30	40	52	68
0,000	15,06	20,88	22,76	27,74
0,025	14,27	19,92	22,26	27,15
0,050	13,81	19,25	21,80	26,57
0,100	13,60	18,83	20,96	25,77
0,150	13,47	18,58	20,63	25,40
0,200	13,37	18,45	20,46	25,19
0,300	13,22	18,24	20,29	24,94
0,400	13,12	18,07	20,17	24,81
0,500	13,05	17,99	20,08	24,73
0,600	13,03	17,95	20,00	24,69
0,700	13,01	17,91	19,96	24,64
0,800	12,99	17,89	19,92	24,64
0,900	12,99	17,87	19,87	24,64
1,000	13,01	17,84	19,85	24,64
1,100	13,01	17,82	19,85	24,64
1,200	13,03	17,82	19,85	24,64
1,570	13,12	17,82	19,85	24,64
2,653	13,33	17,82	19,85	—
2,995	13,43	17,82	—	—
$m_{\text{насыщ}}$	4,953	2,995	2,653	1,570

36. Теплота смешения жидкостей при 25 °С

Приведена теплота смешения жидкостей ΔH_m (в Дж/моль) — изменение энтальпии системы при смешении n_1 молей первого компонента и n_2 молей второго компонента. Из сопоставления уравнений

$$\Delta H_m = \frac{H(1+2) - n_1 H_1 - n_2 H_2}{n_1 + n_2} \quad \text{и} \quad \Delta H_m = \frac{H(1+2) - n_1 H_1 - n_2 H_2}{n_2}$$

получают:

$$\Delta H_m = \frac{n_2}{n_1 + n_2} \Delta H_m = X_2 \Delta H_m$$

Здесь ΔH_m — интегральная теплота растворения; X_2 — мольная доля второго компонента.

$X_2 \cdot 10^2$	$\text{H}_2\text{O}-\text{CH}_3\text{NO}$ (формамид)	$\text{H}_2\text{O}-\text{C}_2\text{H}_5\text{N}$ (пиридин)	$\text{H}_2\text{O}-\text{CH}_3\text{OH}$ (метанол)	$\text{H}_2\text{O}-\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ (этанол)	$\text{H}_2\text{O}-\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$ (пропанол)	$\text{H}_2\text{O}-\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$ (диоксан)	$\text{CH}_3\text{OH}-\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ (метанол-этанол)
5	—	—	—334,7	—460,2	—	—326,4	—1,80
10	138,1	—606,7	—581,6	—682,0	—439,3	—477,0	—3,26
15	—	—	—728,0	—774,0	—	—510,4	—
20	217,6	—1046,0	—815,9	—774,0	—506,3	—477,0	—4,27
25	—	—	—857,7	—715,5	—	—397,5	—
30	251,0	—1359,8	—870,3	—644,3	—447,7	—301,2	—4,64
35	—	—	—1108,8	—573,2	—	—205,0	—
40	267,8	—1581,6	—849,4	—514,6	—280,3	—101,6	—4,35
45	—	—	—824,2	—460,2	—	0	—
50	272,0	—1552,3	—790,8	—414,2	—100,4	100,4	—3,81
55	—	—	—753,1	—368,2	—	200,8	—
60	242,7	—1280,3	—711,3	—330,5	79,5	301,2	—3,14
65	—	—	—661,1	—292,9	—	393,3	—
70	200,8	—937,2	—598,3	—259,4	225,9	468,6	—2,22
75	—	—	—531,4	—230,1	—	506,3	—
80	159,0	—581,6	—447,7	—209,2	305,4	506,3	—1,13
85	—	—	—351,5	—184,1	—	489,5	—
90	92,0	—359,8	—251,0	—138,1	276,1	426,8	—
95	—	—	—150,6	—83,7	196,6	267,8	—

$X_2 \cdot 10^2$	CH_3OH — (метанол) — C_6H_6 (бензол)	$CHCl_3$ — (хлороформ) — C_6H_5OH (этанол)	CH_3COOH — (уксусная кислота) — C_6H_5N (пиридин)	C_2H_5OH — (этанол) — $C_6H_5O_2$ (диоксан)	C_6H_5O — (ацетон) — $(C_6H_5)_2O$ (диэтиловый эфир)	C_4H_9O — (этилалкоголь) — $(C_6H_5)_2O$ (диэтиловый эфир)	$(C_6H_5)_2O$ — (диэтиловый эфир) — C_6H_6 (бензол)	C_6H_5N — (пиридин) — C_6H_6 (циклогексан)
5	—	305,4	—125,5	326,4	92,0	54,4	—10,46	251,0
10	149,4	431,0	—238,5	535,6	167,4	96,2	—17,57	510,4
15	—	451,3	—330,4	711,3	240,6	133,9	—21,76	711,3
20	292,9	431,0	—389,1	857,7	309,6	163,2	—23,85	891,2
25	—	372,4	—435,1	991,6	355,6	188,3	—24,27	1046,0
30	422,6	288,7	—472,8	1108,8	403,8	209,2	—23,85	1171,5
35	—	188,3	—502,1	1213,4	439,3	225,9	—22,38	1271,9
40	531,4	75,3	—514,6	1318,0	472,8	238,5	—19,66	1351,4
45	—	—54,4	—518,8	1414,2	491,6	248,9	—15,06	1401,6
50	619,2	—184,1	—510,4	1477,0	500,0	255,2	—9,41	1430,9
55	—	—318,0	—485,3	1477,0	502,1	255,2	—3,14	1435,1
60	682,0	—443,5	—451,9	1439,3	497,9	251,0	3,77	1422,6
65	—	—556,5	—410,0	1376,5	489,5	242,7	10,88	1376,5
70	715,5	—631,8	—359,8	1284,5	464,4	225,9	16,32	1271,9
75	—	—652,7	—309,6	1159,0	422,6	207,1	19,66	1138,0
80	694,5	—644,3	—251,0	1016,7	372,4	179,9	20,08	991,6
85	—	—585,8	—188,3	836,8	305,4	146,4	19,46	811,7
90	581,6	—410,0	—129,7	602,5	230,1	100,4	16,32	644,3
95	426,8	—209,2	—62,8	292,9	138,1	54,4	10,46	401,7

37. Энтальпия сольватации галогенидов щелочных металлов в различных растворителях при 25 °C

Энтальпия сольватации электролита $\Delta H_{\text{сольв}}$, кДж/моль, равна разности между первой теплотой растворения $\Delta H_{\text{м=0}} \equiv \Delta H_0$ и энергией кристаллической решетки (см. табл. 128).
 ϵ — относительная диэлектрическая проницаемость растворителя.

Электролит МХ		Метанол ($\epsilon = 32,6$)	Вода ($\epsilon = 78,5$)	Формамид ($\epsilon = 110$)	Метилформамид ($\epsilon = 182$)
катион М	анион Х				
Li ⁺	F ⁻	—	1039,7	—	—
	Cl ⁻	914,2	899,3	901,7	917,1
	Br ⁻	769,8	808,4	875,6	—
Na ⁺	I ⁻	—	827,9	841,0	853,0
	F ⁻	—	925,0	—	—
	Cl ⁻	796,8	781,6	797,3	793,5
K ⁺	Br ⁻	769,8	753,7	771,5	771,4
	I ⁻	739,7	713,3	736,8	740,4
	F ⁻	—	810,8	836,3	834,0
Rb ⁺	Cl ⁻	713,0	710,4	714,1	716,3
	Br ⁻	685,6	669,5	688,4	692,8
	I ⁻	648,5	629,0	653,6	662,8
Cs ⁺	F ⁻	—	816,2	812,2	—
	Cl ⁻	687,1	675,8	689,6	—
	Br ⁻	—	644,9	663,6	—
	I ⁻	—	604,4	628,6	636,4
	F ⁻	—	791,9	786,9	—
	Cl ⁻	658,9	651,5	664,9	665,2
	Br ⁻	—	620,6	639,2	—
	I ⁻	596,2	580,1	604,0	610,4

38. Удельная теплоемкость водных растворов

Вещество	Температура, °C	c_p , Дж/(г·K), при концентрации m , моль/кг H ₂ O			
		2,92	1,11	0,555	0,278
CdSO ₄	12	2,91	3,40	3,74	—
CuSO ₄	18—23	—	3,52	3,80	3,98
HCl	18	3,68	3,90	4,04	4,10
HNO ₃	18	3,62	3,89	4,03	—
H ₂ SO ₄	21	3,57	3,83	4,00	4,09
KCl	18	3,46	3,78	3,97	4,06
KNO ₃	18—23	3,48	3,77	3,95	4,04
KOH	18	3,00	3,83	3,99	4,08
MgSO ₄	18	3,24	3,59	3,84	3,99
NH ₄ CH ₃ COO	17,5	3,81	3,98	4,08	—
NH ₄ Cl	18	3,67	3,92	4,04	4,11
NH ₄ NO ₃	18	3,68	3,89	4,03	—
NaCH ₃ COO	18	—	3,93	4,04	—
NaCl	18	3,68	3,90	4,03	4,09
NaNO ₃	18	3,61	3,83	3,98	4,08
NaOH	18	3,80	3,94	4,05	—

39. Истинные атомные и молекулярные изобарные

Теплоемкости приведены в Дж/(моль·К), теплота фазовых превращений — в кДж/моль.

T, К	Ag	C (графит)	Cu	H ₂ O	NH ₃	O ₂	C ₂ H ₆ этан
10	0,21	—	—	0,27	—	—	—
15	0,63	0,04	0,17	1,00	0,96	7,11	2,76
20	1,72	0,08	0,50	2,00	1,97	15,06 $\Delta H_{20,6}^{\text{пер I}} = 0,09$	6,65
25	2,93	0,13	1,05	3,10	3,35	22,18	10,54
30	4,81	0,21	1,67	4,10	4,60	27,61	15,02
40	8,16	0,38	3,35	6,13	7,95	41,00 $\Delta H_{43,8}^{\text{пер II}} = 0,74$	24,85
50	11,25	0,59	5,86	7,90	11,30	46,02 $\Delta H_{54,1}^{\text{плавл}} = 0,44$	32,68
60	13,81	0,75	8,16	9,60	14,31	55,28	39,54
80	17,49	1,17	12,55	12,82	20,29	56,07 $\Delta H_{96,1}^{\text{исп}} = 6,81$	53,22 $\Delta H_{90}^{\text{плавл}} = 2,87$
100	20,00	1,67	16,32	15,82	25,94	29,12	68,53
120	21,63	2,26	18,83	18,50	31,13	29,13	69,24
140	22,80	2,93	20,33	20,82	36,19	29,14	69,83
160	23,64	3,60	21,34	23,15	41,21	29,15	70,84
180	24,35	4,31	22,09	25,60	45,81 $\Delta H_{195,4}^{\text{плавл}} = 5,66$	29,16	72,22 $\Delta H_{181,1}^{\text{исп}} = 14,70$
200	24,89	5,02	22,59	28,12	52,30 $\Delta H_{239,7}^{\text{исп}} = 23,35$	29,17	44,14
235	—	—	—	—	54,81	—	—
250	25,31	6,86	23,85	34,70	34,52	29,29	48,00
280	—	—	—	—	—	—	—
298	25,31	8,62	24,69	37,78 (273,16K)	35,73	29,37	52,72

теплоемкости в интервале 10—298 К

C ₆ H ₆ бензол	C ₆ H ₁₂ метил-циклопентан	C ₇ H ₈ толуол	C ₈ H ₁₀ метилциклооктан	C ₈ H ₁₈ 2,2,4-три-метилпентан
—	—	—	—	—
3,89	5,23	—	7,28	8,37
7,70	10,38	13,18	13,72	16,74
12,97	16,32	19,66	21,76	25,10
17,99	22,18	25,52	29,29	32,22
27,07	32,59	34,89	41,25	43,51
33,68	40,92	43,10	49,37	52,72
39,00	47,78	48,79	55,44	61,50
45,40	58,74	56,69	65,02	79,50
51,04	68,20	61,88	72,84	97,07
55,56	77,15 $\Delta H_{130,7}^{\text{плавл}} = 6,93$	68,45	80,12	115,06
61,30	125,06	74,22	87,99	132,21
68,20	126,11	79,87 $\Delta H_{178,2}^{\text{плавл}} = 6,53$	96,06	149,79 $\Delta H_{165,8}^{\text{плавл}} = 9,21$
75,73	128,07	132,84	104,85	189,12
84,35	131,00	136,06	113,60 $\Delta H_{225,3}^{\text{плавл}} = 11,57$	195,81
—	—	—	—	—
109,62 $\Delta H_{278,6}^{\text{плавл}} = 9,83$	142,80	142,67	168,41	216,52
129,79	—	—	—	—
135,14	158,16	156,06	183,26	239,53

40. Средняя теплоемкость простых веществ и соединений

Средние изобарные теплоемкости $\bar{C}_p$, 298—7 (в Дж/(моль·К)) приведены для температурного интервала от 298 К до указанной в таблице температуры. Для некоторых веществ $\bar{C}_p$, 298—7 приведены с учетом превращения α -модификации в β - и γ - или плавления вещества.

Вещество	Температура, К					
	500	600	700	800	900	1000
Простые вещества						
Alg (кр.)	25,90	26,20	26,48	26,76	27,03	27,31
As (кр.)	25,61	26,23	26,85	27,47	28,09	—
Au (кр.)	25,57	25,86	26,14	26,43	—	—
A (кр.)	25,75	26,01	26,27	26,53	26,79	27,05
B (кр.)	15,36	16,65	17,70	18,60	19,40	20,14
Ba (α , β)	27,77	28,46	30,52	30,90	31,64	—
Be (кр.)	19,50	20,47	21,30	22,03	22,69	23,32
Br (г.)	20,75	20,78	20,82	20,87	20,91	20,97
Br ₂ (г.)	36,67	36,84	36,97	37,06	37,15	37,22
C (алмаз)	10,24	11,60	12,75	13,78	14,73	15,62
C (графит)	13,03	14,22	15,15	15,90	16,54	17,09
C ₂ (г.)	39,09	38,15	37,54	37,12	36,85	36,67
Ca- α	27,78	28,47	29,17	—	—	—
Cd- α	27,13	27,74	—	—	—	—
Cl (г.)	22,23	22,30	22,35	22,37	22,38	22,39
Cl ₂ (г.)	35,39	35,74	35,99	36,20	36,37	36,50
Co- α	26,51	27,35	28,19	—	—	—
Cr (кр.)	25,90	26,80	27,60	28,31	28,97	29,60
Cu (кр.)	25,15	25,46	25,77	26,09	26,40	26,72
D ₂ (г.)	29,25	29,39	29,53	29,69	29,87	30,06
F (г.)	22,42	22,25	22,10	21,98	21,88	21,79
F ₂ (г.)	33,20	33,73	34,13	34,47	34,75	35,01
Fe- α	27,12	28,36	29,60	30,74	32,31	34,70
Ge (кр.)	24,82	25,25	25,61	25,92	26,20	26,46
H ₂ (г.)	28,92	29,02	29,15	29,28	29,42	29,57
Hg (ж.)	27,47	27,38	—	—	—	—
I (г.)	20,65	20,64	20,63	20,63	20,65	20,66
I ₂ (г.)	37,16	37,26	37,35	37,42	37,49	37,54
Mg (кр.)	26,26	26,84	27,40	27,96	28,51	—
Mn- α	28,42	29,31	30,15	30,94	31,73	32,50
Mo (кр.)	24,44	24,79	25,14	25,49	25,83	26,18
N ₂ (г.)	29,58	29,80	30,01	30,22	30,44	30,65
Ni (α , β)	28,74	30,21	31,55	31,39	31,41	31,56
O (г.)	21,46	21,35	21,27	21,22	21,18	21,14
O ₂ (г.)	30,28	30,87	31,34	31,74	32,09	32,39
O ₃ (г.)	44,16	45,57	46,70	47,64	48,47	49,21
P (красн.)	22,89	23,64	24,38	25,12	—	—
P ₂ (г.)	33,61	34,13	34,51	34,82	35,06	35,26
Pb (кр., ж.)	27,71	28,14	40,59	38,51	37,08	36,00
Pt (кр.)	26,26	26,54	26,82	27,10	27,38	27,66
S ₂ (г.)	34,18	34,64	34,97	35,24	35,42	35,64
Sb (кр.)	26,00	26,37	26,73	27,10	27,46	—
Si (кр.)	21,98	22,57	23,05	23,45	23,81	24,14

Продолжение

Вещество	Температура, К					
	500	600	700	800	900	1000
Sn (кр., ж.)	28,81 (кр.)	52,24 (ж.)	46,36	42,79	40,41	38,71
Sr (кр.)	27,76	28,46	29,15	29,35	—	—
Te (кр.)	27,93	29,04	30,14	—	—	—
Th- α	28,64	29,27	29,91	30,54	31,18	31,82
Ti- α	25,31	25,83	26,36	26,89	27,41	27,94
U- α	29,79	31,09	32,45	33,87	35,30	—
W (кр.)	24,78	25,02	25,25	25,48	25,72	25,95
Zn (кр.)	26,38	26,89	27,39	—	—	—
Zr- α	26,61	27,19	28,94	28,35	28,94	29,52
Неорганические соединения						
AgBr (кр.)	58,89	62,11	—	—	—	—
AgCl (кр.)	56,35	57,82	58,93	—	—	—
AlF ₃ α	84,10	87,47	90,54	—	—	—
Al ₂ O ₃ (корунд)	96,67	101,16	104,55	107,25	109,47	111,42
Al ₂ (SO ₄) ₃ (кр.)	315,82	331,54	343,67	353,55	361,85	369,25
AsCl ₃ (г.)	78,50	79,22	79,74	80,15	80,47	80,75
BCl ₃ (г.)	68,47	70,21	71,62	72,83	73,90	74,89
BF ₃ (г.)	57,28	59,68	61,80	63,72	65,53	67,27
B ₂ O ₃ (кр.)	75,27	81,20	86,95	—	—	—
BaCO ₃ (кр.)	98,40	102,19	105,68	108,76	111,76	114,66
BaCl ₂ (кр.)	76,70	77,40	78,10	78,80	79,50	80,20
Ba(NO ₃) ₂ (кр.)	174,07	183,42	192,23	200,70	—	—
BaO (кр.)	49,48	50,62	51,50	52,22	52,82	53,35
Ba(OH) ₂ (кр.)	107,27	111,85	—	—	—	—
BaSO ₄ (кр.)	117,75	121,70	124,53	126,64	128,26	129,60
BeO (кр.)	33,13	35,45	37,35	38,98	40,43	41,77
BeSO ₄ (кр.)	102,31	108,84	114,92	120,74	—	—
Bi ₂ O ₃ (кр.)	116,86	118,54	120,21	121,89	—	—
CO (г.)	29,74	29,99	30,24	30,47	30,69	30,92
CO ₂ (г.)	42,02	43,43	44,56	45,52	46,37	47,15
COCl ₂ (г.)	65,88	67,50	68,82	69,97	70,98	71,93
COS (г.)	45,99	47,33	48,41	49,32	50,12	50,86
CS ₂ (г.)	49,71	50,88	51,82	52,61	53,29	53,91
CaC ₂ - α	67,55	69,12	70,40	—	—	—
CaCO ₃ (кальцит)	95,86	99,86	103,03	105,69	107,97	110,06
CaCl ₂ (кр.)	75,27	76,19	77,02	77,81	78,58	79,29
CaF ₂ (кр.)	73,30	74,61	75,97	77,38	78,81	80,26
CaHPO ₄ (кр.)	133,30	140,58	146,56	151,74	156,35	160,64
Ca(NO ₃) ₂ (кр.)	172,72	182,35	191,43	200,17	—	—
CaO (кр.)	46,76	47,76	48,55	49,19	49,74	50,23
Ca(OH) ₂ (кр.)	97,23	99,39	—	—	—	—
CaS (кр.)	49,02	49,82	50,61	51,41	52,20	53,00
CaSO ₄ (ангидрит)	109,61	114,54	119,48	124,42	129,36	134,29
Ca ₃ (PO ₄) ₂ - α	254,04	264,69	274,66	284,22	293,48	302,58
CdCl ₂ (кр.)	77,28	79,29	81,29	83,30	—	—
CdO (кр.)	47,50	48,37	49,08	49,69	50,23	50,74
CdS (кр.)	55,47	55,66	55,85	56,04	56,23	56,4
CdSO ₄ (кр.)	108,20	112,07	115,94	119,81	123,68	127,55
ClO ₂ (г.)	46,09	47,33	48,33	49,17	49,90	50,57
Cl ₂ O (г.)	49,30	50,34	51,13	51,76	52,28	52,73

Вещество	Температура, К					
	500	600	700	800	900	1000
CoCl ₂ (кр.)	84,66	87,72	90,77	93,83	96,88	99,94
CrCl ₃ (кр.)	95,94	98,00	100,06	102,12	104,18	106,25
Cr ₂ O ₃ (кр.)	112,54	114,75	116,46	117,86	119,04	120,10
CsCl (кр.)	53,60	54,07	54,55	55,03	55,50	—
CsI (кр.)	53,00	53,56	54,18	54,68	—	—
CuCl (кр.)	52,23	53,98	55,72	—	—	—
CuCl ₂ (кр.)	74,45	75,32	76,20	—	—	—
CuO (кр.)	46,63	48,07	49,38	50,57	51,68	52,74
CuS (кр.)	48,76	49,31	49,86	50,42	50,97	51,52
CuSO ₄ (кр.)	107,24	110,84	114,44	118,04	121,63	—
Cu ₂ O (кр.)	68,26	69,72	71,19	72,65	74,11	75,58
FeCO ₃ (кр.)	93,40	99,01	104,61	110,22	—	—
FeO (кр.)	52,01	52,82	53,51	54,14	54,72	55,28
FeS ₂ (кр.)	68,45	70,16	71,45	72,49	73,36	74,12
Fe ₂ O ₃ (кр.)	117,87	122,92	127,55	131,94	136,14	140,23
Fe ₃ O ₄ (кр.)	169,63	180,08	190,52	200,97	—	—
Ga ₂ O ₃ (кр.)	104,95	108,07	110,53	112,56	114,30	115,87
GeO ₂ (гексаг.)	60,96	63,43	65,34	66,89	68,20	69,36
GeO ₂ (тетраг.)	59,33	61,90	63,90	65,54	66,94	68,19
HBr (г.)	29,22	29,39	29,60	29,82	30,07	30,32
HCN (г.)	39,84	41,08	42,12	43,05	43,89	44,68
HCl (г.)	29,10	29,20	29,35	29,51	29,69	29,88
HD (г.)	29,20	29,25	29,34	29,43	29,53	29,66
HF (г.)	29,00	29,05	29,13	29,24	29,36	29,49
HI (г.)	29,31	29,50	29,72	29,97	30,22	30,48
HNCS (г.)	51,65	53,90	55,93	57,74	59,31	60,66
H ₂ O (г.)	34,49	34,99	35,50	36,02	36,54	37,06
H ₂ O ₂ (г.)	49,07	50,99	52,53	53,84	54,39	56,02
H ₂ S (г.)	35,51	36,28	37,05	37,82	38,59	39,36
HgO (кр.)	47,86	49,35	50,83	52,31	—	—
HgS (красн.)	49,93	50,70	51,46	52,23	—	—
Hg ₂ Cl ₂ (кр.)	104,82	106,37	107,92	109,47	—	—
In ₂ (SO ₄) ₃ (кр.)	300,52	313,10	325,67	338,24	350,81	—
KAl(SO ₄) ₂ (кр.)	227,75	238,40	247,19	254,80	261,64	267,94
KCl (кр.)	52,22	52,95	53,78	54,67	55,61	56,58
KI (кр.)	53,69	54,56	55,63	56,78	58,00	—
K ₂ CrO ₄ (кр.)	153,60	157,35	161,10	164,84	168,58	—
K ₂ Cr ₂ O ₇ (кр.)	244,87	256,34	—	—	—	—
K ₂ SO ₄ (кр.)	148,14	155,11	161,52	167,56	—	—
LaCl ₃ (кр.)	105,75	106,82	107,90	108,97	110,04	111,12
LiCl (кр.)	50,76	51,93	53,10	54,27	—	—
LiOH (кр.)	57,55	60,34	62,82	—	—	—
Li ₂ SO ₄ (кр.)	133,00	139,76	146,51	153,27	—	—
MgCO ₃ (кр.)	89,26	94,10	98,38	—	—	—
MgCl ₂ (кр.)	75,66	76,93	77,91	78,72	79,42	—
MgO (кр.)	42,56	43,99	45,06	45,90	46,59	47,18
MgSO ₄ (кр.)	110,21	114,97	119,04	122,66	126,00	129,13
MnCO ₃ (кр.)	94,37	98,51	102,02	—	—	—
MnCl ₂ (кр.)	76,91	78,21	79,32	80,33	81,26	—
MnO (кр.)	47,25	48,06	48,77	49,39	49,97	50,51
MnO ₂ (кр.)	62,62	64,95	66,76	—	—	—
MnS (кр.)	50,70	51,08	51,46	51,83	52,21	52,59
Mn ₂ O ₃ (кр.)	108,39	111,66	114,49	117,05	119,43	121,69

Вещество	Температура, К					
	500	600	700	800	900	1000
Mn ₂ O ₄ (кр.)	156,82	160,12	163,11	165,93	168,62	171,23
NH ₃ (г.)	38,84	40,31	41,71	43,09	44,44	45,78
(NH ₄) ₂ SO ₄ (кр.)	215,59	229,63	—	—	—	—
NO (г.)	30,72	30,98	31,22	31,45	31,67	31,88
NOCl (г.)	43,29	44,46	45,40	46,20	46,91	47,56
NO ₂ (г.)	40,96	42,32	43,45	44,44	45,33	46,16
N ₂ O (г.)	43,40	44,79	45,90	46,84	47,67	48,42
N ₂ O ₄ (г.)	89,75	93,40	96,58	99,46	102,14	104,69
N ₂ O ₅ (г.)	112,00	116,50	119,96	122,75	125,11	127,16
NaAlO ₂ (кр.)	83,11	85,98	88,28	90,23	91,94	93,48
NaBr (кр.)	53,23	53,90	54,56	55,23	55,89	56,56
NaCl (кр.)	52,45	53,27	54,08	54,90	55,71	56,53
NaF (кр.)	49,06	50,02	50,95	51,84	52,72	53,58
NaI (кр.)	53,68	54,29	54,89	55,49	56,09	—
Na ₂ B ₄ O ₇ (кр.)	211,70	219,75	226,60	232,70	238,30	243,55
Na ₂ CO ₃ α	124,73	131,51	138,29	—	—	—
Na ₂ O (кр.)	76,37	78,75	80,72	82,44	84,00	85,43
Na ₂ O ₂ α	96,61	99,44	102,27	—	—	—
Na ₂ S (кр.)	85,63	85,97	86,31	86,66	87,00	87,34
Na ₂ SO ₃ (кр.)	124,47	126,65	128,82	131,00	133,17	135,35
Na ₂ SO ₄ (-α, -β, -γ)	143,91	189,17	187,02	186,82	187,59	189,63
(α)	(β)	(β)	(β)	(β)	(γ)	(γ)
Na ₂ SiO ₃ (кр.)	128,15	133,19	137,35	140,98	144,26	147,28
Na ₂ Si ₂ O ₆ (-α, -β)	183,88	192,39	199,49	205,69	211,30	220,10
(α)	(α)	(α)	(α)	(α)	(β)	(β)
Na ₃ AlF ₆ (-α, -β)	235,49	243,41	251,34	259,26	278,99	280,35
(α)	(α)	(α)	(α)	(β)	(β)	(β)
Na ₃ PO ₄ (кр.)	162,83	166,18	169,53	172,88	176,23	179,58
Na ₄ SiO ₄ (кр.)	192,20	195,91	199,63	203,34	207,05	210,76
NiCl ₂ (кр.)	75,21	76,42	77,48	78,44	79,33	80,19
NiS (кр.)	49,39	50,72	—	—	—	—
(597 K)	(597 K)	(597 K)	(597 K)	(597 K)	(597 K)	(597 K)
NiSO ₄ (кр.)	142,50	144,58	146,65	148,73	150,80	152,88
OH (г.)	29,89	29,89	29,89	29,89	29,94	30,04
PCl ₃ (г.)	76,00	77,04	77,84	78,47	79,00	79,45
PCl ₅ (г.)	119,65	121,64	123,09	124,22	125,14	125,83
P ₄ O ₁₀ (кр.)	255,77	276,13	—	—	—	—
PbBr ₂ (кр.)	81,45	81,91	—	—	—	—
PbCO ₃ (кр.)	99,58	105,57	111,55	117,53	—	—
PbCl ₂ (кр., ж.)	80,13	81,81	83,48	133,38	128,53	125,06
(кр.)	(кр.)	(кр.)	(ж.)	(ж.)	(ж.)	(ж.)
PbCl ₂ (г.)	57,00	57,05	57,10	57,15	57,20	57,24
PbI ₂ (кр.)	83,15	84,14	(85,12)	—	—	—
PbO (желт., кр.)	48,56	49,89	51,23	52,57	53,91	55,23
PbO ₂ (кр.)	66,16	67,80	69,43	71,06	72,69	74,32
Pb ₃ O ₄ (кр.)	171,55	176,55	180,61	184,08	187,17	189,98
PbS (кр.)	50,41	50,87	51,33	51,79	52,25	52,71
PbSO ₄ (кр.)	109,40	113,93	119,00	124,44	130,10	135,94
PtCl ₂ (кр.)	78,15	79,45	80,74	82,04	—	—
PtCl ₄ (кр.)	163,96	170,45	—	—	—	—
SO ₂ (г.)	44,16	45,41	46,43	47,28	48,03	48,72
SO ₂ Cl ₂ (г.)	84,80	87,20	89,15	90,81	92,28	93,61

Вещество	Температура, К					
	500	600	700	800	900	1000
SO ₂ (г.)	58,69	61,10	62,99	64,56	65,92	67,12
SbCl ₃ (г.)	79,71	80,26	80,66	80,96	81,19	81,38
Sb ₂ O ₃ (кр.)	118,43	121,73	125,04	128,34	131,65	—
Sb ₂ S ₃ (черн., кр.)	123,33	126,09	128,85	131,61	—	—
SiCl ₄ (г.)	96,48	98,10	99,36	100,40	101,28	102,05
SiF ₄ (г.)	83,56	86,41	88,65	90,49	92,07	93,47
SiH ₄ (г.)	52,36	55,63	58,48	61,08	63,52	65,83
SiO ₂ (кварц-α, -β)	53,10	56,08	58,69	61,09	63,65	64,27
SiO ₂ (тридимит-β)	(α)	(α)	(β)	(α)	(β)	(β)
SiO ₂ (квартц-β)	57,68	59,49	60,68	61,61	62,42	63,15
SiO ₂ (квартц-α, -β)	57,06	61,21	62,35	63,21	63,92	64,55
SnCl ₂ (кр., ж.)	(α)	(β)	(β)	(α)	(β)	(β)
SnCl ₄ (г.)	84,02	135,95	126,07	120,12	116,15	—
SnO (кр.)	102,07	102,99	103,65	104,16	104,56	104,91
SnO (г.)	45,80	46,53	47,27	48,00	48,73	49,46
SnO ₂ (кр.)	33,40	33,87	34,22	34,50	34,72	34,92
SnO ₂ (α, -β)	63,37	66,28	68,51	70,30	71,81	73,12
SnS (α, -β)	50,71	51,85	53,12	54,45	56,58	56,47
SrO (кр.)	(α)	(α)	(α)	(α)	(β)	(β)
SrSO ₄ (кр.)	48,49	49,49	50,27	50,92	51,49	51,99
TeE ₃ (г.)	113,40	116,19	118,97	121,75	124,53	127,32
TeO ₂ (кр.)	132,04	135,73	138,43	140,48	142,12	143,45
ThO ₂ (кр.)	67,63	68,92	70,05	71,07	72,04	72,96
ThS ₂ (кр.)	66,59	67,94	69,07	70,08	71,00	71,84
Th(SO ₄) ₂ (кр.)	75,64	76,12	76,60	77,08	77,56	78,04
TiCl ₄ (г.)	196,75	208,30	219,85	231,40	242,95	—
TiO ₂ (рутил)	100,29	101,49	102,35	103,01	103,53	103,95
TiO ₂ (анатаз)	60,71	62,39	63,76	64,92	65,95	66,89
TiCl ₃ (кр.)	63,21	65,18	66,59	67,64	68,47	69,12
TiCl ₃ (г.)	53,55	53,97	54,39	—	—	—
TiCl ₃ (г.)	36,70	36,81	36,90	36,96	37,01	37,05
Ti ₂ O (кр.)	72,76	74,86	76,95	79,04	—	—
UF ₄ (кр.)	119,05	120,54	122,03	123,51	124,98	126,46
UF ₆ (г.)	139,53	142,08	143,98	145,48	146,70	147,73
UO ₂ (кр.)	71,92	74,10	75,77	77,10	78,21	79,17
UO ₂ F ₂ (кр.)	112,95	115,61	117,63	119,25	120,61	121,78
U ₃ O ₈ (кр.)	263,63	271,07	276,90	281,74	285,92	—
WO ₃ (кр.)	82,36	85,12	87,33	89,19	90,82	92,27
WS ₂ (кр.)	69,05	70,80	72,27	73,57	74,75	75,85
ZnCl ₂ (кр.)	69,85	71,00	—	—	—	—
ZnO (кр.)	(590 K)	46,18	47,16	47,96	48,64	49,24
ZnS (кр.)	48,10	48,91	49,55	50,11	50,60	51,04
ZnSO ₄ (кр.)	106,74	110,55	114,36	118,17	121,97	125,78
ZrCl ₄ (кр.)	124,99	126,64	—	—	—	—

Органические соединения

Углеводороды

CH ₄ (г.) метан	41,16	44,06	46,85	49,52	52,08	54,52
C ₂ H ₂ (г.) ацетилен	48,72	50,83	52,75	54,49	56,06	57,46
C ₂ H ₄ (г.) этилен	53,84	58,17	62,25	66,08	69,66	72,98

Вещество	Температура, К					
	500	600	700	800	900	1000
C ₂ H ₆ (г.) этан	66,21	72,27	77,94	83,24	88,14	92,66
C ₃ H ₄ (г.) пропандиен (аллен)	71,43	76,87	81,85	86,35	90,37	93,93
C ₃ H ₆ (г.) пропен	79,86	87,06	93,94	100,52	106,76	112,69
C ₃ H ₈ (г.) циклопропан	75,14	83,65	91,45	98,55	104,94	110,62
C ₃ H ₈ (г.) пропан	94,39	103,52	112,02	119,90	127,15	133,76
C ₄ H ₆ (г.) 1,2-бутадиен	97,50	105,27	112,48	119,12	125,20	130,72
C ₄ H ₆ (г.) 1,3-бутадиен (дивинил)	98,92	107,38	115,09	122,05	128,27	133,74
C ₄ H ₈ (г.) 1-бутен	111,43	120,58	129,19	137,27	144,80	151,80
C ₄ H ₈ (г.) 2-бутен, <i>цис</i> -	101,72	111,89	121,32	130,00	137,95	145,14
C ₄ H ₈ (г.) 2-бутен, <i>транс</i> -	108,53	117,55	126,04	134,03	141,52	148,50
C ₄ H ₈ (г.) 2-метилпропен	110,54	119,60	128,16	136,22	143,76	150,80
C ₄ H ₈ (г.) циклобутан	98,68	110,42	121,21	131,07	139,99	147,95
C ₄ H ₁₀ (г.) бутан	124,29	135,15	145,39	155,01	164,02	172,41
C ₄ H ₁₀ (г.) 2-метилпропан (изобутан)	126,23	137,47	147,84	157,37	166,03	173,82
C ₅ H ₈ (г.) 2-метил-1,3-бутадиен (изопрен)	129,60	140,43	150,33	159,31	167,37	174,50
C ₅ H ₁₀ (г.) циклопентан	117,90	132,80	146,83	159,67	171,27	181,67
C ₅ H ₁₂ (г.) пентан	151,75	165,84	178,91	190,96	201,97	211,96
C ₅ H ₁₂ (г.) 2-метилбутан (изопентан)	151,24	165,72	179,13	191,48	202,75	212,95
C ₅ H ₁₂ (г.) 2,2-диметилпропан (неопентан)	155,09	169,92	183,55	196,00	207,25	217,29
C ₆ H ₆ (г.) бензол	110,94	123,02	133,98	143,81	152,50	160,06
C ₆ H ₁₂ (г.) циклогексан	149,80	169,02	186,70	202,86	217,48	230,56
C ₆ H ₁₄ (г.) гексан	180,50	197,21	212,67	226,91	239,92	251,70
C ₇ H ₈ (г.) толуол	137,72	152,70	166,40	178,84	190,00	199,90
C ₇ H ₁₆ (г.) гептан	209,28	228,53	246,40	262,84	277,85	291,40
C ₈ H ₆ (г.) этилбензол (фенилацетилен)	146,23	159,77	172,04	183,03	192,74	201,18
C ₈ H ₈ (г.) фенилэтилен (стирол)	156,96	172,22	186,13	198,70	209,90	219,75
C ₈ H ₁₀ (г.) этилбензол	167,54	184,71	200,40	214,64	227,41	238,69
o-C ₈ H ₁₀ (г.) o-ксилол	169,90	186,11	201,02	214,66	227,00	238,04
m-C ₈ H ₁₀ (г.) m-ксилол	165,54	182,32	197,74	211,82	224,51	236,83
p-C ₈ H ₁₀ (г.) p-ксилол	164,59	181,29	196,66	210,69	223,37	234,71
C ₈ H ₁₈ (г.) октан	237,95	259,86	280,14	298,78	315,80	331,17
C ₁₀ H ₈ (г.) нафталин	175,24	193,83	210,71	225,90	239,40	251,18
C ₁₀ H ₈ (г.) азулен	172,29	191,29	208,53	224,02	237,73	249,67
C ₁₂ H ₁₀ (г.) дифенил	215,37	238,38	259,21	277,89	294,38	308,69

Кислородсодержащие соединения

CH ₃ O (г.) формальдегид	39,57	41,77	43,86	45,84	47,72	49,50
CH ₂ O ₂ (г.) муравьиная кислота	56,66	60,12	63,24	66,03	68,49	70,66
CH ₃ O (г.) метанол	52,20	56,03	59,64	63,04	66,22	69,21
C ₂ H ₅ O (г.) ацетальдегид	65,49	70,70	75,53	79,98	84,06	87,81
C ₂ H ₄ O (г.) этиленоксид	62,03	68,17	73,80	78,90	83,50	87,64
C ₂ H ₃ O ₂ (г.) уксусная кислота	80,64	86,91	92,62	97,80	102,43	106,58
C ₂ H ₅ O (г.) этанол	80,57	87,39	93,69	99,48	104,74	109,55
C ₂ H ₅ O (г.) диметиловый эфир	79,99	86,48	92,56	98,24	103,50	108,40
C ₂ H ₅ O ₂ (г.) этиленгликоль	111,56	118,00	123,90	129,25	134,06	138,38

Вещество	Температура, К					
	500	600	700	800	900	1000
C_2H_6O (г.) ацетон	92,64	99,81	106,53	112,81	118,65	124,10
C_3H_8O (г.) 1-пропанол	107,78	117,13	125,78	133,75	141,03	147,69
C_3H_8O (г.) 2-пропанол	110,78	120,55	129,55	137,75	145,14	151,82
$C_4H_{10}O$ (г.) диэтиловый эфир	138,20	149,86	160,67	170,68	179,86	188,31
$C_4H_{10}O$ (г.) бутанол	136,53	148,51	159,57	169,74	179,00	187,49
$C_5H_{12}O$ (г.) амилловый спирт	166,03	181,38	195,46	208,26	219,78	230,17

Галогенсодержащие соединения

CCl_4 (г.) тетрахлорметан	90,00	92,54	94,75	96,63	98,18	99,40
CF_4 (г.) тетрафторметан	71,01	75,04	78,61	81,71	84,34	86,50
$CHCl_3$ (г.) трихлорметан (хлороформ)	74,16	77,38	80,00	82,00	83,41	84,21
CHF_3 (г.) трифторметан	60,15	64,07	67,60	70,73	73,47	75,83
CH_2Cl_2 (г.) дихлорметан	58,96	62,36	65,46	68,25	70,72	72,89
CH_2F_2 (г.) дифторметан	51,07	54,84	58,30	61,45	64,30	66,83
CH_3Br (г.) бромметан	49,76	52,96	55,98	58,81	61,47	63,94
CH_3Cl (г.) хлорметан	47,97	51,28	54,42	57,36	60,11	62,67
CH_3F (г.) фторметан	44,84	48,21	51,38	54,35	57,12	59,71
CH_3I (г.) иодметан	51,39	54,53	57,44	60,14	62,62	64,89
C_2H_5Cl (г.) хлорэтан	76,78	83,03	88,80	94,08	98,87	103,20
C_2H_5F (г.) фторэтан	73,13	79,43	85,27	90,65	95,56	100,00
C_6H_5Cl (г.) хлорбензол	125,10	136,80	147,40	156,80	165,20	172,50
C_6H_5F (г.) фторбензол	122,30	134,40	145,40	155,10	163,80	171,30
$C_6H_5F_3$ (г.) фенилтрифторметан	149,60	164,20	177,50	189,50	200,20	209,60

Азотсодержащие соединения

CH_3N_2 (г.) диазометан	57,76	60,80	63,43	65,79	67,98	70,04
CH_3NO_2 (г.) нитрометан	69,82	75,35	80,44	85,08	89,28	93,04
CH_3N (г.) метиламин	60,93	65,64	70,08	74,25	78,15	81,77
CH_3N_2 (г.) метилгидразин	87,55	93,87	99,82	105,40	110,58	115,40
C_2H_7N (г.) диметиламин	87,02	95,08	102,6	109,5	115,8	121,5
C_3H_7N (г.) акрилонитрил	75,67	80,90	85,71	90,09	94,04	97,57
C_3H_7N (г.) триметиламин	116,6	127,7	137,8	147,1	155,6	163,1
C_5H_5N (г.) пиридин	104,1	115,4	125,7	135,0	143,2	150,4
C_6H_7N (г.) анлилин	139,2	152,5	164,6	175,5	185,1	193,5

Серусодержащие соединения

CH_4S (г.) метантиол	58,58	62,35	65,89	69,19	72,26	75,08
C_2H_4S (г.) тиациклопропан	67,58	73,63	79,15	84,13	88,57	92,48
C_2H_6S (г.) диметилсульфид	87,93	94,23	100,14	105,65	110,76	115,45
C_2H_6S (г.) этантиол	87,48	94,11	100,28	106,00	111,25	116,04
$C_2H_6S_2$ (г.) диметилдисульфид	109,77	116,70	123,18	129,14	134,61	139,59
C_3H_6S (г.) тиациклобутан	90,35	99,65	108,18	115,95	122,94	129,17
C_4H_4S (г.) тиофен	93,42	102,34	110,40	117,63	124,02	129,54
C_4H_8S (г.) тиациклопентан	118,67	130,90	142,07	152,21	161,32	169,38
$C_4H_{10}S$ (г.) диэтилсульфид	144,23	156,52	168,00	178,69	188,58	197,67
$C_4H_{10}S_2$ (г.) диэтилдисульфид	166,16	178,13	189,07	199,02	207,96	215,88
$C_6H_{10}S$ (г.) тиациклогексан	148,50	166,32	182,70	197,64	211,14	223,18
C_6H_6S (г.) бензолтиол (тиофенол)	133,96	146,59	158,05	168,36	177,52	185,50
C_2H_3OS (г.) тиоуксусная кислота	92,39	97,45	102,10	106,35	110,20	113,65

41. Термодинамические константы равновесия важнейших газовых реакций в зависимости от температуры

Константы равновесия выражают в парциальных давлениях K_p в концентрациях K_c в летучесть или фугитивностях K_f в активностях K_a в мольных долях K_X и в числах молей K_n реагентов. Термодинамические константы равновесия K_p и K_f безразмерны. Константа равновесия, записанная по закону действующих масс, — размерная величина; в частности, в этом случае K_p или K_c имеют размерность давления или концентрации в степени Δn (изменение числа молей при реакции). Константа равновесия, по закону действующих масс, численно равна термодинамической константе равновесия, если все парциальные давления или концентрации отнесены к соответствующим стандартным значениям. Зависимость константы равновесия от температуры выражена уравнением (значения коэффициентов a, b, c и e см. в табл. 44);

$$\lg K_a = -\frac{\Delta H_0}{2,303RT} + \frac{\Delta a}{R} \lg T + \frac{\Delta b}{2,303 \cdot 2R} T + \frac{\Delta c}{2,303 \cdot 6R} T^2 + \text{const}$$

Реакция	Выражение константы K_a	Уравнение $\lg K_a = f(T)$
$2H = H_2$	$K_a = \frac{a_{H_2}}{a_H^2}$	$\lg K_a = \frac{22545}{T} - 1,720 \lg T + 0,085 \cdot 10^{-3} T + \frac{0,013 \cdot 10^6}{T^2} - 0,185$
$2Cl = Cl_2$	$K_a = \frac{a_{Cl_2}}{a_{Cl}^2}$	$\lg K_a = \frac{12552}{T} - 1,113 \lg T + 0,052 \cdot 10^{-3} T + \frac{0,024 \cdot 10^6}{T^2} - 2,428$
$2Br (г.) = Br_2 (г.)$	$K_a = \frac{a_{Br_2 (г.)}}{a_{Br (г.)}^2}$	$\lg K_a = \frac{10061}{T} - 0,318 \lg T - 0,057 \cdot 10^{-3} T - \frac{0,052 \cdot 10^6}{T^2} - 4,553$
$2I (г.) = I_2 (г.)$	$K_a = \frac{a_{I_2 (г.)}}{a_{I (г.)}^2}$	$\lg K_a = \frac{7875,2}{T} - 0,330 \lg T - 0,020 \cdot 10^{-3} T - \frac{0,042 \cdot 10^6}{T^2} - 4,346$
$H_2 + Cl_2 = 2HCl$	$K_a = \frac{a_{HCl}^2}{a_{H_2} a_{Cl_2}}$	$\lg K_a = \frac{9400}{T} - 1,353 \lg T + 0,138 \cdot 10^{-3} T + \frac{0,118 \cdot 10^6}{T^2} + 5,035$
$H_2 + Br_2 (г.) = 2HBr$	$K_a = \frac{a_{HBr}^2}{a_{H_2} a_{Br_2 (г.)}}$	$\lg K_a = \frac{5189,9}{T} - 1,479 \lg T + 0,208 \cdot 10^{-3} T + \frac{0,077 \cdot 10^6}{T^2} + 5,375$

Реакция	Выражение константы K_a	Уравнение $\lg K_a = f(T)$
$H_2 + I_2 (r.) = 2HI$	$K_a = \frac{a_{HI}^2}{a_{H_2} a_{I_2} (r.)}$	$\lg K_a = \frac{302,4}{T} - 1,448 \lg T + 0,210 \cdot 10^{-3}T + \frac{0,054 \cdot 10^6}{T^2} + 5,290$
$2Cl_2 + 2H_2O (r.) = 4HCl + O_2$	$K_a = \frac{a_{HCl}^4 a_{O_2}}{a_{Cl_2}^2 a_{H_2O}^2 (r.)}$	$\lg K_a = -\frac{6019,9}{T} + 0,423 \lg T - 0,025 \cdot 10^{-3}T + \frac{0,147 \cdot 10^6}{T^2} + 5,672$
$CO + Cl_2 = COCl_2 (r.)$	$K_a = \frac{a_{COCl_2} (r.)}{a_{CO} a_{Cl_2}}$	$\lg K_a = \frac{5835,1}{T} + 0,206 \lg T + 0,190 \cdot 10^{-3}T - \frac{0,150 \cdot 10^6}{T^2} - 8,032$
$2H_2 + O_2 = 2H_2O (r.)$	$K_a = \frac{a_{H_2O}^2 (r.)}{a_{H_2}^2 a_{O_2}}$	$\lg K_a = \frac{24\,820}{T} - 3,130 \lg T + 0,301 \cdot 10^{-3}T + \frac{0,090 \cdot 10^6}{T^2} + 4,397$
$2CO + O_2 = 2CO_2$	$K_a = \frac{a_{CO_2}^2}{a_{CO}^2 a_{O_2}}$	$\lg K_a = \frac{29\,791}{T} + 0,169 \cdot 10^{-3}T - \frac{0,324 \cdot 10^6}{T^2} - 9,495$
$CO + H_2O (r.) = H_2 + CO_2$	$K_a = \frac{a_{H_2} a_{CO_2}}{a_{CO} a_{H_2O} (r.)}$	$\lg K_a = \frac{2485,5}{T} + 1,563 \lg T - 0,066 \cdot 10^{-3}T - \frac{0,207 \cdot 10^6}{T^2} - 6,946$
$2H_2 + S_2 (r.) = 2H_2S (r.)$	$K_a = \frac{a_{H_2S}^2 (r.)}{a_{H_2}^2 a_{S_2} (r.)}$	$\lg K_a = \frac{8369}{T} - 3,840 \lg T + 0,606 \cdot 10^{-3}T + \frac{0,066 \cdot 10^6}{T^2} + 6,824$
$2SO_2 + O_2 = 2SO_3$	$K_a = \frac{a_{SO_3}^2}{a_{SO_2}^2 a_{O_2}}$	$\lg K_a = \frac{10\,679}{T} + 0,736 \lg T + 0,114 \cdot 10^{-3}T - \frac{0,354 \cdot 10^6}{T^2} - 12,419$
$N_2 + 3H_2 = 2NH_3$	$K_a = \frac{a_{NH_3}^2}{a_{N_2} a_{H_2}^3}$	$\lg K_a = \frac{4189,0}{T} - 6,028 \lg T + 0,964 \cdot 10^{-3}T - \frac{0,126 \cdot 10^6}{T^2} + 6,491$
$2NO + O_2 = 2NO_2$	$K_a = \frac{a_{NO_2}^2}{a_{NO}^2 a_{O_2}}$	$\lg K_a = \frac{6017,2}{T} - 0,998 \lg T + 0,302 \cdot 10^{-3}T - \frac{0,237 \cdot 10^6}{T^2} - 5,175$

$N_2 + O_2 = 2NO$	$K_a = \frac{a_{NO}^2}{a_{N_2} a_{O_2}}$	$\lg K_a = -\frac{9581}{T} - 0,022 \lg T + \frac{0,068 \cdot 10^6}{T^2} + 1,380$
$2NO_2 = N_2O_4$	$K_a = \frac{a_{N_2O_4}}{a_{NO_2}^2}$	$\lg K_a = \frac{3070,2}{T} + 0,189 \lg T + 0,446 \cdot 10^{-3}T - \frac{0,022 \cdot 10^6}{T^2} - 10,019$
$CO + 2H_2 = CH_3OH (r.)$	$K_a = \frac{a_{CH_3OH} (r.)}{a_{CO} a_{H_2}^2}$	$\lg K_a = \frac{3886,0}{T} - 8,142 \lg T + 2,470 \cdot 10^{-3}T - 0,270 \cdot 10^{-6}T^2 - \frac{0,014 \cdot 10^6}{T^2} + 10,826$
$2CO + 2H_2 = CH_3COOH (r.)$	$K_a = \frac{a_{CH_3COOH} (r.)}{a_{CO}^2 a_{H_2}^2}$	$\lg K_a = \frac{10\,050}{T} - 11,614 \lg T + 4,752 \cdot 10^{-3}T - 0,676 \cdot 10^{-6}T^2 - \frac{0,002 \cdot 10^6}{T^2} + 11,600$
$C_2H_4 + H_2O (r.) = C_2H_5OH (r.)$	$K_a = \frac{a_{C_2H_5OH} (r.)}{a_{C_2H_4} a_{H_2O} (r.)}$	$\lg K_a = \frac{2049,3}{T} - 3,648 \lg T + 1,880 \cdot 10^{-3}T - 0,316 \cdot 10^{-6}T^2 - \frac{0,009 \cdot 10^6}{T^2} + 2,940$
$2C_2H_5OH (r.) = C_4H_{10} + 2H_2O (r.) + H_2$ (1, 3 бу таблиц)	$K_a = \frac{a_{C_4H_{10}} a_{H_2O}^2 (r.) a_{H_2}}{a_{C_2H_5OH}^2 (r.)}$	$\lg K_a = -\frac{4141,1}{T} + 8,826 \lg T - 2,912 \cdot 10^{-3}T + 0,319 \cdot 10^{-6}T^2 + \frac{0,030 \cdot 10^6}{T^2} - 11,191$
$2C_2H_6 + 3H_2O (r.) = C_3H_8 + CO_2 + 2H_2$ $= C_3H_8O (r.) + CO_2 + 2H_2$	$K_a = \frac{a_{C_3H_8O} (r.) a_{CO_2} a_{H_2}^2}{a_{C_2H_6}^2 a_{H_2O}^3 (r.)}$	$\lg K_a = \frac{17\,637}{T} - 2,611 \lg T + 1,356 \cdot 10^{-3}T - 0,092 \cdot 10^{-6}T^2 - \frac{0,223 \cdot 10^6}{T^2} - 3,794$

$\pi = \frac{P}{P_{\text{крит}}}$	$\tau = \frac{T}{T_{\text{крит}}}$														
	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	2,0	2,2	2,4	2,7	3,0	3,5
12	—	—	0,474	0,566	0,668	0,760	0,834	0,884	0,928	1,008	1,078	1,126	1,174	1,198	1,226
13	—	—	0,490	0,582	0,686	0,778	0,852	0,906	0,952	1,014	1,106	1,152	1,202	1,222	1,250
14	—	—	0,510	0,598	0,706	0,798	0,874	0,930	0,978	1,066	1,134	1,180	1,228	1,248	1,280
15	—	—	0,532	0,620	0,728	0,826	0,902	0,958	1,006	1,100	1,166	1,214	1,256	1,280	1,310
16	—	—	0,545	0,646	0,758	0,854	0,934	0,996	1,036	1,114	1,198	1,240	1,290	1,310	1,340
17	—	—	0,565	0,672	0,786	0,890	0,970	1,026	1,072	1,172	1,230	1,274	1,322	1,342	1,368
18	—	—	0,578	0,706	0,824	0,930	1,006	1,066	1,110	1,208	1,270	1,310	1,354	1,374	1,402
19	—	—	0,604	0,738	0,860	0,970	1,050	1,106	1,150	1,248	1,308	1,348	1,392	1,414	1,434
20	—	—	0,628	0,768	0,894	1,006	1,088	1,142	1,180	1,288	1,340	1,386	1,432	1,442	1,468
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,328	1,406	1,418	1,472	1,476	1,504
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,366	1,426	1,466	1,514	1,522	1,554

$\pi = \frac{P}{P_{\text{крит}}}$	$\tau = \frac{T}{T_{\text{крит}}}$															
	3,5	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	25	30	35
0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	1,080	1,076	1,071	1,063	1,057	1,056	1,048	1,043	1,038	1,036	1,030	1,028	1,024	1,019	1,015	1,012

10	1,180	1,167	1,152	1,135	1,120	1,117	1,102	1,088	1,072	1,070	1,061	1,052	1,048	1,039	1,031	1,028
15	1,310	1,274	1,244	1,214	1,194	1,181	1,160	1,136	1,110	1,108	1,087	1,080	1,072	1,058	1,045	1,042
20	1,468	1,402	1,346	1,302	1,274	1,248	1,210	1,182	1,152	1,148	1,127	1,110	1,100	1,082	1,060	1,054
25	—	1,540	1,450	1,398	1,356	1,318	1,284	1,234	1,192	1,188	1,158	1,142	1,128	1,106	1,084	1,070
30	—	1,686	1,570	1,502	1,444	1,392	1,352	1,292	1,234	1,228	1,192	1,176	1,156	1,130	1,106	1,086
35	—	1,868	1,708	1,612	1,534	1,470	1,424	1,350	1,284	1,270	1,228	1,208	1,184	1,160	1,126	1,104
40	—	2,028	1,854	1,728	1,630	1,554	1,492	1,410	1,328	1,312	1,266	1,240	1,212	1,178	1,146	1,118
45	—	2,228	2,018	1,850	1,736	1,644	1,570	1,470	1,380	1,354	1,306	1,274	1,242	1,202	1,168	1,134
50	—	2,450	2,190	1,986	1,850	1,744	1,654	1,534	1,432	1,400	1,346	1,308	1,272	1,228	1,188	1,152
55	—	2,694	2,372	2,126	1,968	1,844	1,740	1,598	1,486	1,448	1,388	1,342	1,302	1,252	1,208	1,168
60	—	2,966	2,570	2,274	2,098	1,952	1,828	1,664	1,546	1,500	1,432	1,380	1,334	1,278	1,230	1,182
65	—	—	—	—	—	—	—	—	1,602	1,552	1,476	1,416	1,368	1,306	1,252	1,196
70	—	—	—	—	—	—	—	—	1,662	1,608	1,526	1,454	1,380	1,332	1,272	1,214
75	—	—	—	—	—	—	—	—	1,728	1,668	1,590	1,494	1,438	1,362	1,292	1,238
80	—	—	—	—	—	—	—	—	1,794	1,728	1,622	1,538	1,472	1,390	1,314	1,248
85	—	—	—	—	—	—	—	—	1,862	1,790	1,672	1,582	1,512	1,426	1,338	1,268
90	—	—	—	—	—	—	—	—	1,930	1,862	1,726	1,626	1,548	1,456	1,360	1,288
95	—	—	—	—	—	—	—	—	2,002	1,912	1,774	1,668	1,590	1,490	1,380	1,308
100	—	—	—	—	—	—	—	—	2,070	1,978	1,828	1,712	1,628	1,528	1,402	1,328

44. Термодинамические свойства простых веществ, соединений и ионов в водных растворах и в жидком аммиаке

ΔH_f° , 298 и ΔG_f° , 298 — изменения стандартных энтальпий (теплоты образования) и энергий Гиббса при образовании (индекс f — formation) данного вещества из простых веществ, термодинамически устойчивых при 101,325 кПа (1 атм) и при выбранной температуре 298 К. S_{298}° и C_p° , 298 — стандартные значения энтропии и изобарной теплоемкости вещества при 298 К.

Теплоемкость [в Дж/(моль·К)] при температуре T в указанном в таблице интервале температур выражается уравнениями:

$$C_p^\circ = a + bT + c/T^2 \text{ для } C_p^\circ = a + bT + cT^2$$

Свойства ионов в растворах даны при $\alpha = 1$ по отношению к H^+ , соответствующие характеристики которого приняты равными нулю.

Вещество	ΔH_f° , 298, кДж/моль	S_{298}° , Дж/ моль·К	ΔG_f° , 298, кДж/моль	C_p° , 298, Дж/ моль·К	Коэффициенты уравнения $C_p^\circ = f(T)$			Температурный интервал, К
					a	$b \cdot 10^5$	$c \cdot 10^{-6}$	
Простые вещества								
Ag (кр.)	0	42,55	0	25,44	23,97	5,27	-0,25	273—1234
Al (кр.)	0	28,33	0	24,35	20,67	12,38	—	273—932
As (серый)	0	35,61	0	24,74	23,28	5,74	—	298—800
Au (кр.)	0	47,40	0	25,36	23,68	5,19	—	298—1336
B (кр.)	0	5,86	0	11,09	16,78	9,04	-7,49	298—1700
Ba-α	0	60,67	0	28,28	22,26	13,81	—	298—643
Ba-β	$\Delta H_{613}^{\alpha \rightarrow \beta} = 0,63$	—	—	—	10,46	29,29	—	643—983
Be (кр.)	0	9,54	0	16,44	19,16	8,87	-4,77	298—1556
Bi (кр.)	0	56,90	0	26,02	18,79	22,59	—	298—544,5
Br (г.)	111,88	174,90	82,44	20,79	19,98	1,34	0,36	298—1000
					18,33	3,88	-0,84	1000—2500
							($c \cdot 10^6$)	
Br ⁻ (г.)	-218,87	163,39	-238,67	20,79	20,79	—	—	До 20 000 К
Br ₂ (ж.)	0	152,21	0	75,69	75,69	—	—	298—332
Br ₂ (г.)	30,91	245,37	3,14	36,07	37,32	0,50	-1,26	298—1600
C (алмаз)	1,83	2,37	2,83	6,11	9,12	13,22	-6,19	298—1200
C (графит)	0	5,74	0	8,54	16,86	4,77	-8,54	298—2500
C (г.)	716,67	157,99	671,28	20,84	20,80	—	—	298—1600
C ₂ (г.)	830,86	199,31	774,86	43,21	30,67	3,97	10,19	298—2000
Ca-α	0	41,63	0	26,36	22,22	13,93	—	273—713
Cd-α	0	51,76	0	25,94	22,22	12,30	—	273—594
Cl (г.)	121,34	165,08	105,35	21,84	23,14	-0,67	-0,96	298—2000

Cl ⁻ (г.)	-233,63	153,25	-239,86	20,79	20,79	—	—	До 20 000 К
Cl ₂ (г.)	0	222,98	0	33,93	37,03	0,67	-2,85	298—3000
Co-α	0	30,04	0	24,81	19,83	16,75	—	298—700
Cr (кр.)	0	23,64	0	23,35	24,43	9,87	-3,68	298—2000
Cs (кр.)	0	84,35	0	31,38	31,38	6,28	—	273—301,8
Cu (кр.)	0	33,14	0	24,43	22,64	—	—	298—1357
D (г.)	221,67	123,24	206,52	20,79	20,79	—	—	До 20 000 К
D ₂ (г.)	0	144,86	0	29,20	28,58	0,88	1,96	298—1500
						($c \cdot 10^6$)		
F (г.)	79,38	158,64	62,30	22,75	23,70	-3,21	—	298—500
F ⁻ (г.)	-259,68	145,47	-266,61	20,79	21,08	-0,10	2,67	500—3000
F ₂ (г.)	0	202,67	0	31,30	20,79	—	—	До 20 000 К
Fe-α	0	27,15	0	24,98	34,56	2,51	-3,51	298—2000
					17,24	24,77	—	298—700
					—159,80	181,00	332,36	700—1000
Ga (кр.)	0	41,09	0	26,07	26,07	—	—	298—302,9
Ge (кр.)	0	31,09	0	23,35	25,02	3,43	-2,34	298—1210
H (г.)	217,98	114,60	203,28	20,79	20,79	—	—	До 20 000 К
H ⁺ (г.)	1536,21	108,84	1517,00	20,79	20,79	—	—	До 20 000 К
H ⁻ (г.)	139,03	108,85	132,26	20,79	20,79	—	—	До 20 000 К
H ₂ (г.)	0	130,52	0	28,83	27,28	3,26	0,50	298—3000
Hg (ж.)	0	75,90	0	27,99	26,94	0,00	0,79	298—629,9
Hg (г.)	61,30	174,85	31,80	20,79	20,79	—	—	До 4 000 К
I (г.)	106,76	180,67	70,21	20,79	20,07	0,68	0,46	298—3000
I ⁻ (г.)	-195,02	169,15	-221,92	20,79	20,79	—	—	До 20 000 К
I ₂ (кр.)	0	116,14	0	54,44	40,12	49,79	—	298—385
I ₂ (г.)	62,43	260,60	19,39	36,90	37,40	0,59	-0,71	298—3000
In (кр.)	0	57,82	0	26,74	20,25	21,59	—	298—430
K (кр.)	0	64,18	0	29,58	5,61	8,17	—	298—335
La (кр.)	0	56,90	0	27,82	25,8	6,70	—	298—1153
Li (кр.)	0	28,24	0	24,73	6,86	46,44	3,51	298—450
Mg (кр.)	0	32,68	0	24,89	22,30	10,63	-0,42	298—920
Mn-α	0	32,01	0	26,28	23,85	14,14	-1,59	298—980
Mo (кр.)	0	28,62	0	24,06	21,67	6,95	—	298—2890
N ₂ (г.)	0	191,50	0	29,12	27,88	4,27	—	298—2500
Na (кр.)	0	51,21	0	28,24	16,82	37,82	—	298—371
Na (ж.)	$\Delta H_{371}^{\text{плавл}} = 2,60$	—	—	—	—	—	—	—
Ni-α	0	29,87	0	26,07	16,99	29,46	—	298—633
Ni-β	$\Delta H_{633}^{\alpha \rightarrow \beta} = 0,38$	—	—	—	25,10	7,53	—	633—1725

Вещество	$\Delta H_f^\circ, 298$, кДж/моль	S_{298}° , Дж/ моль·К	$\Delta G_f^\circ, 298$, кДж/моль	$C_p^\circ, 298$, Дж/ моль·К	Коэффициенты уравнения $C_p = f(T)$			Температурный интервал, К
					a	$b \cdot 10^3$	$c \cdot 10^{-5}$	
O (г.)	249,17	160,95	231,75	21,91	20,80	0,01	0,98	298—3000
O* (г.)	1568,78	154,85	1546,96	20,79	20,79	—	—	298—2500
O ⁻ (г.)	101,43	157,69	91,20	21,67	20,84	-0,02	0,75	298—3000
O ₂ (г.)	0	205,04	0	29,37	31,46	3,39	-3,77	298—3000
O ₃ (г.)	142,26	238,82	162,76	39,25	47,02	8,04	-9,04	298—1500
P (бел.)	0	41,09	0	23,82	23,82	—	—	273—317
P (ж.)	$\Delta H_{пл} = 0,66$	—	—	—	26,33	—	—	317—550
P (красн.)	-17,45	22,80	-12,00	21,39	16,95	14,89	—	298—870
P ₂ (г.)	143,85	217,94	103,37	32,05	36,16	0,85	-4,31	298—2000
Pb (кр.)	0	64,81	0	26,82	24,23	8,71	—	298—601
Pb (ж.)	$\Delta H_{пл} = 4,77$	—	—	—	32,49	-3,09	—	601—1200
Pt (кр.)	0	41,55	0	25,86	24,02	5,61	—	298—2000
Ra (кр.)	0	(71,2)	0	(27,2)	—	—	—	—
Rb (кр.)	0	76,23	0	30,88	30,88	—	—	298—310
S (монокл.)	0,38	32,55	0,19	23,64	23,64	—	—	368—392
S (ромб.)	0	31,92	0	22,68	22,68	—	—	273—363
S ₂ (г.)	278,81	228,03	238,31	23,67	36,11	1,09	-3,51	298—2000
S ₂ (кр.)	128,37	167,75	79,42	32,51	23,10	7,28	—	273—900
Sb (кр.)	0	45,69	0	25,23	18,95	23,01	—	273—470
Se (кр.)	0	42,44	0	25,36	22,82	3,86	-3,54	298—1685
Si (кр.)	0	18,83	0	19,93	21,59	18,10	—	298—505
Sn (бел.)	0	51,55	0	26,99	21,54	6,15	12,88	505—800
Sn (ж.)	$\Delta H_{пл} = 7,03$	—	—	—	22,22	13,89	—	298—830
Sr (кр.)	0	55,69	0	26,36	19,12	22,09	—	298—720
Te (кр.)	0	49,50	0	25,71	23,56	12,72	—	298—1600
Tl- α	0	53,39	0	27,32	21,10	10,54	—	298—1155
Tl- α	0	30,63	0	25,02	22,01	14,48	—	273—500
Tl- α	0	64,18	0	26,32	16,19	30,63	2,05	298—940
U- α	0	50,29	0	27,66	22,91	4,69	—	298—2500
W (кр.)	0	32,64	0	24,27	22,38	10,04	—	273—690
Zn (кр.)	0	41,63	0	25,44	21,97	11,63	—	298—1135
Zr- α	0	38,99	0	25,44	—	—	—	—

Неорганические соединения

AgBr (кр.)	-100,42	107,11	-97,02	52,30	33,18	64,43	—	298—700
AgCl (кр.)	-126,78	96,23	-109,54	50,79	62,26	4,18	-11,30	298—725
AgI- α	-61,92	115,48	-66,35	54,43	24,35	100,83	—	298—420
AgNO ₃ - α	-124,52	140,92	-33,60	93,05	36,65	189,12	—	298—433
Ag ₂ O (кр.)	-30,54	121,75	-10,90	65,86	29,46	29,46	—	298—500
Ag ₂ S- α	-31,80	143,51	-39,70	76,53	64,60	39,96	—	298—449
Ag ₂ SO ₄ (кр.)	-715,88	200,00	-618,36	131,38	96,65	116,73	—	298—597
AlBr ₃ (кр.)	-513,38	180,25	-490,60	100,50	49,95	169,58	—	298—370
AlCl ₃ (кр.)	-704,17	109,29	-628,58	91,00	77,12	47,83	—	273—453
AlF ₃ - α	-1510,42	66,48	-1431,15	75,10	72,26	45,86	-9,62	298—727
Al ₂ O ₃ (корунд)	-1675,69	50,92	-1582,27	79,04	114,55	12,89	-34,31	298—1800
Al ₂ (SO ₄) ₃ (кр.)	-3441,80	239,20	-3100,87	259,41	366,31	62,59	-112,47	298—1100
AsCl ₃ (ж.)	-305,01	216,31	-259,16	133,47	—	—	—	—
AsCl ₅ (г.)	-270,34	328,82	-258,04	75,48	82,09	1,00	-5,94	298—2000
As ₂ O ₃ (клардентит)	-653,37	122,72	-577,03	112,21	59,83	175,73	—	298—582
As ₂ O ₃ (арсенолит)	-656,89	108,32	-576,16	95,65	35,02	203,34	—	298—548
As ₂ O ₅ (кр.)	-921,32	105,44	-478,69	116,52	—	—	—	—
BCl ₃ (г.)	-402,96	290,08	-387,98	62,63	70,54	11,97	-10,21	298—1000
BF ₃ (г.)	-1136,58	254,01	-1119,93	50,46	52,05	28,03	-8,87	298—1000
B ₂ O ₃ (кр.)	-1270,43	53,84	-1191,29	62,76	36,53	106,32	-5,48	298—723
BaCO ₃ (кр.)	-1210,85	112,13	-1132,77	85,35	86,90	48,95	-11,97	298—1040
BaCl ₂ (кр.)	-859,39	123,64	-811,71	75,31	71,13	13,97	—	298—1195
Ba(NO ₃) ₂ (кр.)	-992,07	213,80	-797,23	151,63	125,73	149,37	-16,78	298—868
Ba(OH) ₂ (кр.)	-553,54	70,29	-525,84	46,99	53,30	4,35	-8,28	298—1270
BaSO ₄ (кр.)	-943,49	100,83	-855,42	97,91	70,71	91,63	—	298—681
BeO (кр.)	-1458,88	132,21	-1348,43	102,09	141,42	0,0	-35,27	298—1300
BeSO ₄ (кр.)	-598,73	14,14	-569,54	25,56	35,35	16,74	-13,26	298—1175
Bi ₂ O ₃ (кр.)	-1200,81	77,97	-1089,45	85,69	71,78	99,69	-13,78	298—863
CO (г.)	-570,70	151,46	-490,23	113,8	103,51	33,47	—	298—978
CO ₂ (г.)	-110,53	197,55	-137,15	29,14	28,41	4,10	-0,46	298—2500
CO ₂ (г.)	-393,51	213,66	-394,37	37,11	44,14	9,04	-8,54	298—2500
COCl ₂ (г.)	-219,50	283,64	-205,31	57,76	67,15	12,03	-9,04	298—1000
COS (г.)	-141,70	231,53	-168,94	41,55	48,12	8,45	-8,20	298—1800
CS ₂ (ж.)	88,70	151,04	-64,41	75,65	—	—	—	—
CS ₂ (г.)	116,70	237,77	66,55	45,48	52,09	6,69	-7,53	298—1800
CaC ₂ - α	-59,83	69,96	-64,85	62,72	68,62	11,88	-8,66	298—720
CaCO ₃ (кальцит)	-1206,83	91,71	-1128,35	83,47	104,52	21,92	-25,94	298—1200
CaCl ₂ (кр.)	-795,92	108,37	-749,34	72,59	71,88	12,72	-2,51	298—1055

Вещество	ΔH_f° , 298, кДж/моль	S° , 298, Дж/ моль·К	ΔG_f° , 298, кДж/моль	C_p° , 298, Дж/ моль·К	Коэффициенты уравнения $C_p^\circ = f(T)$			Температурный интервал, К
					a	b·10 ⁴	c·10 ⁻⁵	
CaF ₂ -α	-1220,89	68,45	-1168,46	67,03	59,83	30,46	1,97	298—1000
CaHPO ₄ (кр.)	-1808,56	111,38	-1675,38	110,04	138,41	55,10	-40,38	298—1000
CaHPO ₄ ·2H ₂ O (кр.)	-2397,46	189,45	-2148,60	197,07	—	—	—	—
Ca(H ₂ PO ₄) ₂ (кр.)	-3114,57	189,54	-2811,81	—	—	—	—	—
Ca(H ₂ PO ₄) ₂ ·H ₂ O (кр.)	-3408,29	259,83	-3057,00	258,82	122,88	153,97	-17,28	298—800
Ca(NO ₃) ₂ (кр.)	-938,76	193,30	-743,49	149,33	49,62	4,52	-6,95	298—1800
CaO (кр.)	-635,09	38,07	-603,46	42,05	105,19	12,01	-19,00	298—600
Ca(OH) ₂ (кр.)	-985,12	83,39	-897,52	87,49	42,68	15,90	—	298—1000
CaS (кр.)	-476,98	56,61	-471,93	47,49	70,21	98,74	-20,92	298—1400
CaSO ₄ (ангидрит)	-1436,28	106,69	-1323,90	99,66	166,02	40,17	—	298—841
Ca ₃ (PO ₄) ₂ -α	-4120,82	235,98	-3884,9	227,82	61,25	6,38	-4,90	298—1500
CdCl ₂ (кр.)	-390,79	115,27	-343,24	73,22	53,97	3,77	—	298—1273
CdO (кр.)	-258,99	54,81	-229,33	43,64	48,24	7,53	—	298—1500
CdS (кр.)	-156,90	71,13	-153,16	47,32	53,18	3,35	-7,74	298—2000
CdSO ₄ (кр.)	-934,41	257,02	-823,88	99,62	60,29	61,09	-7,78	298—1000
ClO ₂ (г.)	104,60	266,23	122,34	45,44	—	—	—	—
Cl ₂ O (г.)	75,73	266,23	93,40	78,49	—	—	—	—
CoCl ₂ (кр.)	-312,54	109,29	-269,69	103,22	79,50	41,21	—	298—1218
CoSO ₄ (кр.)	-867,76	113,39	-760,83	103,22	82,55	21,67	-17,49	298—470
CrCl ₃ (кр.)	-556,47	123,01	-486,37	91,80	119,37	9,20	-15,65	298—1800
CrO ₃ (кр.)	-590,36	73,22	-513,44	69,33	49,79	9,54	—	298—918
Cr ₂ O ₃ (кр.)	-1140,56	81,17	-1058,97	104,52	48,53	11,21	—	298—894
CsCl (кр.)	-442,83	101,18	-414,61	52,63	—	—	—	—
CsI (кр.)	-336,81	125,52	-331,77	51,88	—	—	—	—
CsOH (кр.)	-406,68	77,82	-354,71	—	38,27	34,38	—	298—703
CuCl (кр.)	-137,24	87,02	-120,06	48,53	67,44	17,56	—	298—766
CuCl ₂ (кр.)	-205,85	108,07	-161,71	71,88	43,83	16,77	-5,88	298—1359
CuO (кр.)	-162,00	42,63	-134,26	42,30	44,35	11,05	—	298—1273
CuS (кр.)	-53,14	66,53	-53,58	47,82	78,53	71,96	—	298—900
CuSO ₄ (кр.)	-770,90	109,20	-661,79	98,87	56,57	29,29	—	298—1500
Cu ₂ O (кр.)	-173,18	92,92	-150,56	63,64	39,25	130,54	—	298—376
Cu ₂ S (кр.)	-79,50	120,92	-86,27	76,32	—	—	—	—
D ₂ O (ж.)	-294,60	75,90	-243,47	84,31	—	—	—	—

D ₂ O (г.)	-249,20	198,23	-234,55	34,27	—	112,13	—	298—855
FeCO ₃ (кр.)	-738,15	95,40	-665,09	83,26	48,56	8,61	-3,31	298—1550
FeO (кр.)	-264,85	60,75	-244,30	49,92	50,80	167,36	—	298—111
FeS-α	-100,42	60,29	-100,78	50,54	0,502	—	—	411—1458
FeS-β	-927,59	—	—	—	50,42	11,42	—	—
FeSO ₄ (кр.)	-927,59	107,53	-819,77	100,58	—	—	—	298—1000
FeS ₂ (кр.)	-177,40	52,93	-166,05	62,17	74,81	5,52	-12,76	298—1000
Fe ₂ O ₃ (кр.)	-822,16	87,45	-740,34	103,76	97,74	72,13	-12,89	298—866
Fe ₃ O ₄ (кр.)	-1117,13	146,19	-1014,17	150,79	86,27	208,92	—	298—2068
Ga ₂ O ₃ (кр.)	-1089,10	84,98	-998,24	92,05	112,88	15,44	-21,00	298—1390
GeO ₂ (reclar.)	-554,71	55,27	-500,79	52,09	68,91	9,83	-17,70	298—1300
GeO ₂ (repar.)	-580,15	39,71	-521,59	50,17	66,61	11,59	-17,74	298—1600
HBr (г.)	-36,38	198,58	-53,43	29,14	26,15	5,86	1,09	298—2500
HCN (г.)	132,00	201,71	121,58	35,90	39,37	11,30	-6,02	298—2000
HCl (г.)	-92,31	186,79	-95,30	29,14	26,53	4,60	2,50	298—1500
HD (г.)	0,32	143,70	-1,47	29,20	29,25	-1,15	(с·10 ⁶)	—
HF (г.)	-273,30	173,67	-275,41	29,14	26,90	3,43	1,09	298—2500
HI (г.)	26,36	206,48	1,58	29,16	26,32	5,94	0,92	298—2000
HNGS (г.)	127,61	248,03	112,89	46,40	26,48	76,99	-34,18	298—1000
HNO ₃ (ж.)	-173,00	156,16	-79,90	109,87	—	—	—	—
HNO ₃ (г.)	-133,91	266,78	-73,78	54,12	—	—	—	—
H ₂ O (кр.)	-291,85	(39,33)	—	—	4,41	109,50	46,47	100—273
H ₂ O (ж.)	-285,83	69,95	-237,23	75,30	39,02	76,64	11,96	273—380
H ₂ O (г.)	-241,81	188,72	-228,61	33,61	30,00	10,71	0,33	298—2500
H ₂ O ₂ (ж.)	-187,86	109,60	-120,52	89,33	53,60	117,15	—	298—450
H ₂ O ₂ (г.)	-135,88	234,41	-105,74	42,39	52,30	11,88	-11,88	298—1500
H ₂ S (г.)	-20,60	205,70	-33,50	33,44	29,37	15,40	—	298—1800
H ₂ SO ₄ (ж.)	-813,99	156,90	-690,14	138,91	156,90	28,30	-23,46	298—553
H ₃ PO ₄ (кр.)	-1279,05	110,50	-1119,20	106,06	49,83	189,24	—	298—316
H ₃ PO ₄ (ж.)	-1266,90	200,83	-1134,00	106,10	—	—	—	—
HgBr ₂ (кр.)	-169,45	170,31	-152,22	75,32	66,58	29,29	—	298—514
HgCl ₂ (кр.)	-228,24	140,02	-180,90	73,91	69,99	20,28	-1,89	298—550
HgI ₂ -α	-105,44	184,05	-103,05	78,24	72,84	16,74	—	273—403
HgI ₂ (красн.)	-90,88	70,29	-58,66	44,88	36,04	29,64	—	298—800
HgS (красн.)	-58,99	82,42	-51,42	48,41	43,84	15,27	—	298—800
Hg ₂ Br ₂ (кр.)	-207,07	217,70	-181,35	—	—	—	—	—

Вещество	ΔH_f° , 298, кДж/моль	S_{298}° , Дж/ моль·К	ΔG_f° , 298, кДж/моль	C_p , 298, Дж/ моль·К	Коэффициенты уравнения $C_p = f(T)$			Температурный интервал, К
					a	$b \cdot 10^3$	$c' \cdot 10^{-6}$	
Hg ₂ Cl ₂ (кр.)	-265,06	192,76	-210,81	101,70	92,47	30,96	—	273—798
Hg ₂ SO ₄ (красн.)	-744,65	200,71	-627,51	131,96	—	—	—	—
In ₂ O ₃ (кр.)	-925,92	107,95	-831,98	92,05	—	—	—	298—943
In ₂ (SO ₄) ₃ (кр.)	-2725,50	302,08	-2385,87	275,00	200,20	251,04	—58,41	278—1000
KAl(SO ₄) ₂ (кр.)	-2465,00	204,50	-2235	193,00	234,10	82,34	—	298—543
KBr (кр.)	-393,80	95,94	-380,60	52,30	48,37	13,89	3,22	298—1000
KCl (кр.)	-436,68	82,55	-408,93	51,49	41,38	21,76	—	—
KClO ₃ (кр.)	-391,20	142,97	-289,80	100,25	—	—	—	298—955
KClO ₄ (кр.)	-430,12	151,04	-300,58	112,40	38,84	28,92	4,93	—
KI (кр.)	-327,90	106,40	-323,18	53,00	—	—	—	273—401
KMnO ₄ (кр.)	-828,89	171,54	-729,14	117,57	60,86	118,83	—	298—522
KNO ₃ ·α	-492,46	132,88	-392,75	96,29	42,66	76,96	—	630—1171
KOH (кр.)	-424,72	79,28	-379,22	65,60	80,29	103,04	—	278—939
K ₂ CO ₃ (кр.)	-1150,18	155,52	-1064,87	114,44	123,72	71,89	—	298—856
K ₂ CrO ₄ (кр.)	-1385,74	200,60	-1277,84	146,00	153,38	229,29	—17,82	298—883
K ₂ Cr ₂ O ₇ (кр.)	-2067,27	291,21	-1887,85	219,70	120,37	99,58	—	273—523
K ₂ SO ₄ (кр.)	-1433,69	175,56	-1316,04	130,01	97,19	21,46	—	298—744
LaCl ₃ (кр.)	-1070,68	144,35	-997,07	103,60	41,42	23,40	—	298—623
LiCl (кр.)	-408,27	59,30	-384,30	48,39	50,17	34,48	—	298—505
LiNO ₃ (кр.)	-482,33	71,13	-374,92	83,26	42,53	93,34	—27,20	298—759
Li ₂ CO ₃ (кр.)	-1216,00	90,16	-1132,67	96,20	118,95	57,74	—17,41	298—900
Li ₂ SO ₄ (кр.)	-1435,86	114,00	-1321,28	117,60	77,91	5,94	—	298—3060
MgCO ₃ (кр.)	-1095,85	65,10	-1012,15	71,25	48,98	3,14	—11,44	298—541
MgCl ₂ (кр.)	-644,80	89,54	-595,30	71,25	102,85	—	—	298—1400
MgO (кр.)	-601,49	27,07	-569,27	37,20	106,44	46,28	—21,90	—
Mg(OH) ₂ (кр.)	-924,66	93,18	-833,75	76,99	92,01	38,91	—19,62	298—700
MgSO ₄ (кр.)	-1287,42	61,55	-1173,25	95,60	75,48	13,22	—5,73	298—923
MgSO ₄ ·6H ₂ O (кр.)	-3089,50	348,10	-2635,10	348,10	46,48	8,12	—3,68	298—1800
MnCO ₃ (кр.)	-881,66	109,54	-811,40	81,50	69,45	10,21	—16,33	—
MnCl ₂ (кр.)	-481,16	118,24	-440,41	72,97	—	—	—	—
MnO (кр.)	-385,10	61,50	-363,34	44,10	—	—	—	—
MnO ₂ (кр.)	-521,49	53,14	-466,68	54,02	—	—	—	—

MnS (кр.)	-214,35	80,75	-219,36	49,92	47,70	7,53	—	298—1800
Mn ₂ O ₃ (кр.)	-957,72	110,46	-879,91	107,50	144,93	45,27	-9,20	298—1445
Mn ₃ O ₄ (кр.)	-1387,60	154,81	-1282,91	148,08	—	—	—	298—1800
NH ₃ (ж.)	-69,87	—	—	80,75	—	—	—	—
NH ₃ (г.)	-45,94	192,66	-16,48	35,16	—	—	—	—
NH ₄ Al(SO ₄) ₂ (кр.)	-2353,50	216,31	-2039,80	226,40	103,60	280,80	—0,59	298—600
NH ₄ Cl·β	-314,22	95,81	-203,22	84,10	29,58	3,85	—6,95	298—2500
NH ₄ NO ₃ (кр.)	-365,43	151,04	-183,93	139,33	41,16	7,70	—7,02	298—1500
(NH ₄) ₂ SO ₄ (кр.)	-1180,31	220,08	-901,53	187,30	45,69	8,62	—8,53	298—2000
NO (г.)	91,26	210,64	87,58	29,86	83,89	39,75	—14,90	298—1000
NOCl (г.)	52,59	263,50	66,37	39,37	127,45	16,54	—32,85	298—2000
NO ₂ (г.)	34,19	240,06	52,29	36,66	87,95	17,70	—17,74	298—1900
N ₂ O (г.)	82,01	219,83	104,12	38,62	47,92	13,31	—	—
N ₂ O ₄ (г.)	11,11	304,35	99,68	79,16	—	—	—	—
N ₂ O ₅ (г.)	13,30	355,65	117,14	95,28	—	—	—	—
NaAlO ₂ (кр.)	-1133,03	70,29	-1069,20	73,30	280,80	3,85	—	298—1070
NaBr (кр.)	-361,41	86,82	-349,34	51,90	29,58	7,70	—1,38	298—1265
NaC ₂ H ₃ O ₂ (кр.)	-710,40	123,10	-608,96	80,33	45,94	16,32	—	298—500
NaCl (кр.)	-411,12	72,13	-384,13	50,81	43,51	16,23	—	298—933
NaF (кр.)	-573,63	51,30	-543,46	46,86	44,89	143,89	—	298—550
NaHCO ₃ (кр.)	-947,30	102,10	-849,65	87,70	48,88	12,05	—	298—566
NaI (кр.)	-287,86	98,32	-284,59	52,50	25,69	225,94	13,38	595—1000
NaNO ₂ ·α	-466,70	116,50	-365,97	93,05	7,34	125,00	—	298—1000
NaOH·α	-426,35	64,43	-380,29	59,66	89,58	-5,86	—	298—1000
NaOH (ж.)	—	—	—	—	206,10	77,09	—37,49	298—1000
Na ₂ B ₄ O ₇ (кр.)	-3276,70	189,50	-3081,80	186,80	70,63	135,6	—	298—723
Na ₂ CO ₃ ·α	-1130,80	138,80	-1048,20	111,30	—	—	—	—
Na ₂ CO ₃ (ж.)	—	—	—	—	—	—	—	—
Na ₂ CO ₃ ·10H ₂ O (кр.)	-4077	2172	-3906	536	—	—	—	—
NaH ₂ PO ₄ (кр.)	-1544,90	127,57	-1394,24	116,94	—	—	—	—
Na ₂ HPO ₄ (кр.)	-1754,86	150,60	-1615,25	135,28	—	—	—	—
Na ₂ O (кр.)	-417,98	75,06	-379,26	68,89	77,11	19,33	-12,59	298—1000
Na ₂ O ₂ ·α	-513,21	94,81	-449,81	90,89	74,00	56,66	—	298—785
Na ₂ S (кр.)	-374,47	79,50	-358,13	84,93	107,11	43,51	—	298—1250
Na ₂ SO ₃ (кр.)	-1089,43	146,02	-1001,21	120,08	82,32	154,36	—	298—1000
Na ₂ SO ₄ ·α	-1387,21	149,62	-1269,50	128,35	82,32	154,36	—	298—522
Na ₂ SO ₄ ·β	—	—	—	—	145,05	54,60	—	522—980
Na ₂ SO ₄ ·γ	—	—	—	—	142,68	59,31	—	980—1157

Вещество	ΔH_f^{298} , кДж/моль	S_{298}^0 , Дж/ моль·К	ΔC_p^{298} , кДж/моль	C_p^{298} , Дж/ моль·К	Коэффициенты уравнения $C_p = f(T)$			Температурный интервал, К
					a	$b \cdot 10^3$	$c \cdot 10^{-6}$	
$\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ (кр.)	—4324,75	591,87	—3644,09	547,46	—	—	—	—
Na_2SO_4 (ж.)	$\Delta H_{\text{плавл}} = 23,01$	—	—	—	197,40	—	—	1157—2000
$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ (кр.)	—1117,13	(225)	(—1043)	145,98	—	—	—	—
Na_2SiF_6 (кр.)	—2849,72	214,64	—2696,29	—	—	—	—	—
Na_2SiO_3 (кр.)	—1561,43	113,76	—1467,50	111,81	130,29	40,17	—27,07	298—1362
Na_2SiO_3 (ж.)	$\Delta H_{\text{плавл}} = 51,80$	—	—	—	177,32	—	—	1362—2000
Na_2SiO_3 (стекл.)	—1541,64	—	—	179,20	179,20	—	—	298—2000
$\text{Na}_2\text{Si}_2\text{O}_5$ (ж.)	—2470,07	164,05	—2324,39	156,50	185,69	70,54	—44,64	298—951
$\text{Na}_2\text{Si}_2\text{O}_5$ (стекл.)	$\Delta H_{\text{плавл}} = 35,56$	—	—	—	292,88	—	—	951—1147
$\text{Na}_2\text{Si}_2\text{O}_5$ (ж.)	—2443,04	—	—	—	261,21	—	—	1147—2000
$\text{Na}_2\text{Si}_2\text{O}_5$ (стекл.)	—3309,54	283,49	—3158,53	219,51	172,27	158,45	—	298—334
Na_2AlF_6 (ж.)	$\Delta H_{\text{плавл}} = 107,28$	—	—	—	151,49	144,29	—	834—1279
Na_2AlF_6 (ж.)	—1924,64	224,68	—1811,31	153,57	396,22	—	—	1279—2560
Na_2PO_4 (кр.)	—2106,64	195,81	—1976,07	184,72	136,16	67,00	—	298—1600
Na_2SiO_4 (кр.)	—304,18	98,07	—258,03	71,67	162,59	74,22	—	298—1393
NiCl_2 (кр.)	—239,74	37,99	—211,60	44,31	73,27	13,23	—4,98	298—1300
NiO (ж.)	—79,50	52,97	—76,87	47,11	—20,88	157,23	16,28	298—525
NiSO_4 (кр.)	—873,49	103,85	—763,76	97,70	38,70	26,78	—	273—597
PCl_3 (ж.)	—320,91	218,49	—274,08	131,38	125,94	41,51	—	298—1200
PCl_3 (г.)	—287,02	311,71	—267,98	71,84	131,38	—	7,99	298—340
PCl_5 (кр.)	—445,89	170,80	—318,36	(138)	80,11	3,10	—	298—1000
PCl_5 (ж.)	—374,89	364,47	—305,10	112,97	(138)	—	—	298—432
P_2O_3 (ж.)	(—1097)	(142)	(—1023)	144,4	129,49	2,93	—16,40	298—1500
P_2O_5 (кр.)	—1507,2	140,3	—1371,7	(41,8)	35,06	22,61	—	(298—500)
P_2O_5 (ж.)	—2984,03	228,86	—2697,60	211,71	93,30	407,19	—	298—630
P_4O_{10} (г.)	—2894,49	394,55	—2657,46	190,79	—	—	—	—
PbBr_2 (кр.)	—282,42	161,75	—265,94	80,54	77,78	9,20	—	298—640
PbCO_3 (кр.)	—699,56	130,96	—625,87	87,45	51,84	119,66	—	298—800

PbCl_2 (кр.)	—359,82	135,98	—314,56	76,99	66,78	33,47	—	298—768
PbCl_2 (ж.)	$\Delta H_{\text{плавл}} = 23,85$	—	—	—	104,18	—	—	768—1226
PbCl_2 (г.)	—173,64	315,89	—182,02	55,23	56,62	0,96	—	298—2000
PbO (ж.)	—175,23	175,35	—173,56	81,17	75,31	19,66	—	298—680
PbO (ж.)	—217,61	63,70	—188,20	45,77	37,87	26,78	—	298—1000
PbO (красн.)	—219,28	66,11	—189,10	45,81	36,15	32,47	—	298—760
PbO_2 (кр.)	—276,56	71,92	—217,55	64,77	53,14	32,64	—	298—1000
Pb_3O_4 (кр.)	—723,41	211,29	—606,17	146,86	177,49	34,39	—29,29	298—1500
PbS (кр.)	—100,42	91,21	—98,77	49,48	46,74	9,20	—	298—1392
PbS (г.)	—122,34	251,33	76,25	35,10	37,32	—2,05	—	1609—2400
PbSO_4 (кр.)	—920,48	148,57	—813,67	103,22	45,86	129,70	17,57	298—1100
PtCl_2 (кр.)	—106,69	219,79	—93,35	(75,52)	67,78	25,98	—	298—854
PtCl_4 (кр.)	—229,28	267,88	—163,80	(150,86)	112,21	129,70	—	298—600
RaCl_2 (кр.)	—887,6	144,4	(—842,9)	(80,25)	77,04	10,9	—	298—1000
$\text{Ra(NO}_3)_2$ (кр.)	—992,27	217,71	(—795,5)	(46,5)	44,0	8,4	—	298—1000
RaO (кр.)	—544	(71)	(—513)	(46,5)	—	—	—	—
RaSO_4 (кр.)	—1473,75	142,35	(—1363,2)	39,87	46,19	7,87	—7,70	298—2000
SO_2 (г.)	—296,90	248,07	—300,21	133,89	133,89	—	—	219—342
SO_2Cl_2 (ж.)	—394,13	216,31	—321,49	133,89	87,91	6,15	—14,23	298—1000
SO_2Cl_2 (г.)	—363,17	311,29	—318,85	77,40	64,98	11,75	—16,37	298—1300
SO_3 (г.)	—395,85	256,69	—371,17	50,09	91,28	—3,84	—119,61	1000—2000
SbCl_3 (кр.)	—381,16	183,26	—322,45	110,46	43,10	213,80	—	273—346
SbCl_3 (г.)	—311,96	338,49	—299,54	77,40	83,05	0,00	—4,98	298—1000
Sb_2O_3 (кр.)	—715,46	132,63	—636,06	111,76	92,05	66,11	—	298—930
Sb_2O_3 (ж.)	—1007,51	125,10	—864,74	117,61	45,86	241,04	—	298—500
Sb_2O_3 (стекл.)	—1417,12	282,00	—1263,10	223,80	101,29	55,23	—	273—820
Sb_2S_3 (ж.)	—157,74	181,59	—156,08	123,22	145,27	—	—	298—330
SiCl_4 (ж.)	—687,85	239,74	—620,75	145,27	101,46	6,86	—11,51	298—1000
SiCl_4 (г.)	—657,52	330,95	—617,62	90,37	91,46	13,26	—19,66	298—1000
SiF_4 (г.)	—1614,94	282,38	—1572,66	73,64	46,26	36,76	—12,77	298—1300
SiH_4 (г.)	34,73	204,56	57,18	42,89	46,99	34,31	—11,30	298—845
SiO_2 (кварц- α)	—910,94	41,84	—856,67	44,43	60,29	8,12	—	846—2000
SiO_2 (кварц- β)	$\Delta H_{\text{плавл}} = 0,63$	—	—	—	13,68	103,76	—	298—390
SiO_2 (тридимит- α)	—909,06	43,51	—855,29	44,60	57,07	11,05	—	390—2000
SiO_2 (тридимит- β)	$\Delta H_{\text{плавл}} = 0,29$	—	—	—	17,91	88,12	—	298—515
SiO_2 (клинтоналит- α)	—909,48	42,68	—855,46	44,18	60,25	8,54	—	515—2000
SiO_2 (клинтоналит- β)	$\Delta H_{\text{плавл}} = 1,30$	—	—	—	—	—	—	—

Вещество	ΔH_f° , 298, кДж/моль	S_{298}° , Дж/ моль·К	ΔG_f° , 298, кДж/моль	C_p° , 298, Дж/ моль·К	Коэффициенты уравнения $C_p^\circ = f(T)$			Температурный интервал, К
					a	b·10 ³	c'·10 ⁻⁵	
SiO ₂ (стекл.)	-903,49	46,86	-850,71	44,35	56,02	15,41	-14,44	298—2000
SnCl ₂ (кр.)	-330,95	131,80	-288,40	75,58	50,63	83,68	—	298—520
SnCl ₄ (ж.)	$\Delta H_{520}^{\text{плавл}} = 14,52$	—	—	—	96,23	—	—	520—925
SnCl ₄ (ж.)	-528,86	258,99	-457,74	165,27	165,27	—	—	298—388
SnCl ₄ (г.)	-489,11	364,84	-449,55	98,32	106,98	0,84	-7,82	298—1000
SnO (кр.)	-285,98	56,48	-256,88	44,35	39,96	14,64	—	298—1200
SnO (г.)	20,85	232,01	-2,39	31,76	35,23	1,34	-3,51	298—2000
SnO ₂ (кр.)	-580,74	52,30	-519,83	52,59	73,85	10,04	-21,59	298—1500
SnS-α	-110,17	76,99	-108,24	49,25	35,69	31,30	3,77	298—875
SnS-β	$\Delta H_{875}^{\alpha \rightarrow \beta} = 0,67$	—	—	—	40,96	15,65	—	875—1150
SrO (кр.)	-592,04	54,39	-562,10	45,03	50,75	5,27	-6,49	298—1800
SrSO ₄ (кр.)	-1444,74	117,57	-1332,42	107,79	91,20	55,65	—	298—1600
TeCl ₄ (кр.)	-323,84	200,83	-236,00	138,49	138,49	—	—	298—500
TeF ₆ (г.)	-1369,00	335,89	-1273,11	117,32	152,08	3,10	-31,71	298—2000
TeO ₂ (кр.)	-323,42	74,06	-269,61	63,88	65,19	14,56	-5,02	298—1000
Th(OH) ₃ (кр.)	-1764,7	134	-1588,6	—	—	—	—	—
ThO ₂ (кр.)	-1226,75	65,23	-1169,15	61,76	66,27	12,05	-6,69	298—2000
ThS ₂ (кр.)	-627,60	96,23	-621,34	74,67	71,80	9,62	—	298—2180
Th(SO ₄) ₂ (кр.)	-2541,36	148,11	-2306,04	173,46	104,60	230,96	—	298—900
TiCl ₄ (ж.)	-804,16	252,40	-737,32	145,20	142,79	8,71	-0,16	298—410
TiCl ₄ (г.)	-763,16	354,80	-726,85	95,45	107,18	0,47	-10,55	298—2000
TiO ₂ (рутил)	-944,75	50,33	-889,49	55,04	62,86	11,36	-9,96	298—2140
TiO ₂ (анатаз)	-933,03	49,92	-877,65	55,21	75,04	0,00	-17,63	298—2000
TiCl (кр.)	-204,18	111,29	-184,98	52,70	50,21	8,37	-1,05	298—700
TiCl (г.)	-68,41	256,06	-92,38	36,23	37,40	0,00	—	298—2000
Ti ₂ O (кр.)	-167,36	134,31	-138,57	68,54	56,07	41,84	—	298—850
UF ₄ (кр.)	-1910,37	151,67	-1819,74	115,98	107,53	29,29	-0,25	298—1309
UF ₄ (ж.)	$\Delta H_{1309}^{\text{плавл}} = 58,6$	—	—	—	133,98	37,68	—	1309—1500
UF ₆ (г.)	-1591,55	349,36	-1559,87	90,79	—	—	—	—
UF ₆ (кр.)	-2188,23	227,61	-2059,82	167,49	52,72	384,93	—	273—337
UF ₆ (ж.)	$\Delta H_{337}^{\text{плавл}} = 19,22$	—	—	—	198,32	—	—	337—450

UF ₆ (г.)	-2138,61	377,98	-2055,03	129,74	151,04	5,44	-20,38	298—1000
UO ₂ (кр.)	-1084,91	77,82	-1031,98	63,71	80,33	6,78	-16,57	298—1500
UO ₂ F ₂ (кр.)	-1637,20	135,56	-1541,06	103,05	222,88	8,62	-19,92	298—1500
UO ₂ (NO ₃) ₂ (кр.)	-1348,99	276,33	-1114,76	—	—	—	—	—
U ₃ O ₈ (кр.)	-3574,81	282,42	-3369,50	237,24	232,42	36,94	-49,95	298—900
WO ₃ (кр.)	-842,91	75,90	-764,11	73,79	87,65	16,17	-17,50	298—1050
W ₂ S ₃ (кр.)	-259,41	64,85	-249,98	63,55	58,63	15,61	-8,66	298—1500
ZnCO ₃ (кр.)	-812,53	80,33	-730,66	80,08	38,91	138,07	—	298—500
ZnCl ₂ (кр.)	-415,05	111,46	-369,39	67,53	60,67	23,01	—	298—590
ZnCl ₂ (г.)	-265,68	276,56	-269,24	56,90	60,25	0,84	—	1005—2000
ZnO (кр.)	-348,11	43,51	-318,10	40,25	48,99	5,10	-9,12	298—1600
ZnS (кр.)	-205,18	57,66	-200,44	45,36	49,25	5,27	-4,85	298—1290
ZnSO ₄ (кр.)	-981,36	110,54	-870,12	99,06	76,36	76,15	—	298—1620
Zn(OH) ₂ (кр.)	-645,43	76,99	-555,92	74,27	124,97	14,14	-8,37	298—607
ZrCl ₄ (кр.)	-979,77	181,42	-889,27	119,77	107,46	0,29	-8,26	607—2000
ZrCl ₄ (г.)	-869,31	368,19	-834,50	98,32	69,62	7,53	-14,06	298—1480
ZrO ₂ -α	-1097,46	50,36	-1039,72	56,05	—	—	—	—

Коэффициенты уравнения
 $C_p^\circ = f(T)$

a	b·10 ³	c·10 ⁶
---	-------------------	-------------------

Органические соединения

Углеводороды

CH ₄ (г.) метан	-74,85	186,27	-50,85	35,71	14,32	74,66	-17,43	298—1500
C ₂ H ₂ (г.) ацетилен	226,75	200,82	209,21	43,93	26,44	66,65	-26,48	298—1000
C ₂ H ₄ (г.) этилен	52,30	219,45	68,14	43,56	11,32	122,01	-37,90	298—1500
C ₂ H ₆ (г.) этан	-84,67	229,49	-32,93	52,64	5,75	175,11	-57,85	298—1500
C ₃ H ₄ (г.) пропadiен (аллен)	192,13	243,93	202,36	58,99	13,05	175,31	-71,17	298—1000
C ₃ H ₆ (г.) пропен	20,41	266,94	62,70	63,89	12,44	188,38	-47,60	298—1000
C ₃ H ₈ (г.) циклопропан	53,30	237,44	104,38	55,94	-14,94	268,91	-105,90	298—1000
C ₃ H ₈ (г.) пропан	-103,85	269,91	-23,53	73,51	1,72	270,75	-94,48	298—1500
C ₄ H ₆ (г.) 1,2-бутадиен	162,21	293,01	198,44	80,12	17,74	234,43	-84,73	298—1000
C ₄ H ₆ (г.) 1,3-бутадиен (дивинил)	110,16	278,74	150,64	79,54	8,08	273,22	-111,75	298—1000

Вещество	ΔH_f^0 , 298, кДж/моль	S_{298}^0 , Дж моль·К	ΔG_f^0 , 298, кДж/моль	C_p^0 , 298, Дж моль·К	Коэффициенты уравнения $C_p = f(T)$			Температурный интервал, К
					a	$b \cdot 10^3$	$c \cdot 10^6$	
C_4H_8 (г.) 1-бутен	-0,13	305,60	71,26	85,65	21,47	258,40	-80,81	298—1500
C_4H_8 (г.) 2-бутен, <i>цис</i> -	-6,99	300,83	65,82	78,91	-2,72	307,11	-111,29	298—1000
C_4H_8 (г.) 2-бутен, <i>транс</i> -	-11,17	296,48	62,94	87,82	20,78	250,88	-75,93	298—1000
C_4H_8 (г.) 2-метилпропен	-16,90	293,59	58,07	89,12	22,30	252,07	-75,00	298—1000
C_4H_8 (г.) циклобутан	26,65	265,39	110,03	72,22	-24,43	365,97	-140,83	298—1000
C_4H_{10} (г.) бутан	-126,15	310,12	-17,19	97,45	18,23	303,56	-92,65	298—1500
C_4H_{10} (г.) 2-метилпропан (изобутан)	-134,52	294,64	-20,95	96,82	9,61	344,79	-128,83	298—1000
C_5H_8 (ж.) 2-метил-1,3-бутадиеп (изопреп)	49,40	229,40	145,22	153,20	—	—	—	—
C_5H_8 (г.) 2-метил-1,3-бутадиеп (изопрен)	75,73	315,64	145,84	104,60	14,23	345,60	-138,49	298—1000
C_5H_{10} (ж.) циклопентан	-105,97	204,40	36,22	126,82	—	—	—	—
C_5H_{10} (г.) циклопентан	-77,24	292,88	38,57	83,01	-42,43	475,30	-182,51	298—1000
C_5H_{12} (г.) пентан	-173,33	262,85	-9,66	172,90	6,90	425,93	-154,39	298—1000
C_5H_{12} (г.) пентан	-146,44	348,95	-8,44	120,21	—	—	—	—
C_5H_{12} (ж.) 2-метилбутан (изопентан)	-179,28	260,37	-14,86	164,85	—	—	—	—
C_5H_{12} (г.) 2-метилбутан (изопентан)	-154,47	343,59	-14,87	118,78	2,05	439,32	-160,54	298—1000
C_5H_{12} (г.) 2,2-диметилпропан (неопентан)	-165,98	306,39	-15,29	121,63	-0,75	463,59	-179,16	298—1000
C_6H_6 (ж.) бензол	49,03	173,26	124,38	135,14	59,50	255,01	—	281—353
C_6H_6 (г.) бензол	82,93	269,20	129,68	81,67	-21,09	400,12	-169,87	298—1000
C_6H_{12} (ж.) циклогексан	-156,23	204,35	26,60	156,48	—	—	—	—
C_6H_{12} (г.) циклогексан	-123,14	298,24	31,70	106,27	-51,71	598,77	-230,00	298—1000
C_6H_{14} (ж.) гексан	-198,82	296,02	-4,41	194,93	—	—	—	—
C_6H_{14} (г.) гексан	-167,19	388,40	-0,32	143,09	8,66	505,85	-194,43	298—1000
C_6H_8 (ж.) толуол	12,01	220,96	113,77	156,05	59,52	326,98	—	291—392
C_7H_8 (г.) толуол	50,00	320,66	122,03	103,64	-21,59	476,85	-190,33	298—1000
C_7H_{16} (ж.) гептан	-224,54	328,79	7,94	138,91	10,00	487,14	-215,56	298—1000
C_7H_{16} (г.) гептан	-187,78	427,90	0,73	165,98	-1,97	449,49	-191,59	298—1000
C_8H_8 (г.) этилбензол (фенил-ацетилен)	327,27	321,67	361,80	114,89	—	—	—	—

C_8H_8 (ж.) фенилэтилен (стирол)	103,89	237,57	202,41	182,59	—	—	—	—
C_8H_8 (г.) фенилэтилен (стирол)	147,36	345,10	213,82	122,09	-7,32	494,42	-202,92	298—1000
C_8H_{10} (ж.) этилбензол	-12,48	255,35	119,65	186,56	—	—	—	—
C_8H_{10} (г.) этилбензол	29,79	360,45	130,59	128,41	-15,61	548,82	-220,37	298—1000
C_8H_{10} (ж.) о-ксилол	-24,43	246,02	110,48	187,86	—	—	—	—
C_8H_{10} (г.) о-ксилол	19,00	352,75	122,09	133,26	0,04	504,59	-193,55	298—1000
C_8H_{10} (ж.) м-ксилол	-25,42	252,17	107,66	183,26	—	—	—	—
C_8H_{10} (г.) м-ксилол	17,24	357,69	118,86	127,57	-11,30	526,64	-204,76	298—1000
C_8H_{10} (ж.) п-ксилол	-24,43	247,69	109,98	183,68	—	—	—	—
C_8H_{10} (г.) п-ксилол	17,95	352,42	121,14	126,86	-10,67	521,03	-200,66	298—1000
C_8H_{18} (ж.) октан	-249,95	360,79	6,40	254,14	11,84	666,51	-244,93	298—1000
C_8H_{18} (г.) октан	-208,45	466,73	16,32	188,87	—	—	—	—
$C_{10}H_8$ (ж.) нафталин	79,07	186,90	201,08	165,27	—	—	—	—
$C_{10}H_8$ (ж.) нафталин	(97)	251,63	(195)	—	(180)	—	—	—
$C_{10}H_8$ (г.) нафталин	150,96	335,64	223,66	132,55	-26,48	609,48	-255,01	352—490
$C_{10}H_8$ (г.) азулен	279,91	337,86	351,95	128,41	-34,85	627,06	-264,85	298—1000
$C_{12}H_{10}$ (ж.) дифенил	100,50	205,85	254,24	197,07	—	—	—	—
$C_{12}H_{10}$ (ж.) дифенил	(119,32)	259,87	(256,95)	—	—	—	—	—
$C_{12}H_{10}$ (г.) дифенил	182,09	392,67	280,12	162,34	140,00	393,30	-325,56	350—528
$C_{14}H_{18}$ (ж.) антрацен	129,16	207,44	285,84	207,94	-36,36	763,58	—	298—1000
$C_{14}H_{18}$ (ж.) фенантрен	116,15	211,84	271,52	234,30	—	—	—	—

Кислородсодержащие соединения

CH_3O (г.) формальдегид	-115,90	218,78	-109,94	35,39	18,82	58,38	-15,61	298—1500
CH_3O_2 (ж.) муравьиная кислота	-424,76	128,95	-361,74	99,04	—	—	—	—
CH_3O_2 (г.) муравьиная кислота	-378,80	248,77	-351,51	45,80	19,40	112,80	-47,50	298—1000
CH_3O (ж.) метанол	-238,57	126,78	-166,27	81,60	—	—	—	—
CH_3O (г.) метанол	-201,00	239,76	-162,38	44,13	15,28	105,20	-31,04	298—1000
$C_2H_3O_4$ (ж.) щавелевая кислота	-829,94	120,03	-731,73	109,00	—	—	—	—
C_2H_4O (г.) ацетальдегид	-166,00	264,20	-132,65	54,64	13,00	153,50	-53,70	298—1000
C_2H_4O (г.) этиленоксид	-52,63	242,42	-13,09	48,50	-2,02	190,60	-73,60	298—1000
$C_2H_3O_2$ (ж.) уксусная кислота	-484,09	159,83	-389,36	123,43	—	—	—	—

Вещество	ΔH_f° , кДж/моль	S_{298}° , Дж/ моль·К	ΔG_f° , кДж/моль	C_p° , 298, Дж/ моль·К	Коэффициенты уравнения $C_p^\circ = f(T)$			Температурный интервал, К
					a	b·10 ³	c·10 ⁶	
C ₂ H ₄ O ₂ (г.) уксусная кислота	-434,84	282,50	-376,68	66,50	14,82	196,70	-77,70	298—1000
C ₂ H ₆ O (ж.) этанол	-276,98	160,67	-174,15	111,96	—	—	—	—
C ₂ H ₆ O (г.) этанол	-234,80	281,38	-167,96	65,75	10,99	204,70	-74,20	298—1000
C ₂ H ₆ O (г.) диметиловый эфир	-184,05	267,06	-112,94	65,81	16,18	183,90	-58,70	298—1000
C ₂ H ₆ O ₂ (ж.) этиленгликоль	-454,90	167,32	-323,49	151,0	—	—	—	—
C ₂ H ₆ O ₂ (г.) этиленгликоль	-389,32	323,55	-304,49	93,30	44,26	200,50	-77,90	298—1000
C ₂ H ₆ O (ж.) ацетон	-248,11	200,41	-155,42	125,00	—	—	—	—
C ₃ H ₈ O (г.) ацетон	-217,57	294,93	-153,05	74,90	22,47	201,80	-63,50	298—1500
C ₃ H ₈ O (ж.) 1-пропанол	-304,55	192,88	-170,70	148,60	—	—	—	—
C ₃ H ₈ O (г.) 1-пропанол	-257,53	324,80	-163,01	87,11	13,10	277,50	-98,44	298—1000
изо-C ₃ H ₈ O (ж.) 2-пропанол	-318,70	180,00	-181,01	153,40	—	—	—	—
изо-C ₃ H ₈ O (г.) 2-пропанол	-272,59	309,91	-173,63	88,74	8,67	303,10	-115,80	298—1000
C ₃ H ₈ O ₃ (ж.) глицерин	-688,60	204,47	-477,07	223,01	—	—	—	—
C ₄ H ₈ O ₄ (кр.) малеиновая кислота	-790,61	159,41	-631,20	136,82	—	—	—	—
C ₄ H ₈ O ₄ (кр.) фумаровая кислота	-811,07	166,10	-653,65	141,84	—	—	—	—
C ₄ H ₈ O ₂ (ж.) масляная кислота	-524,30	255,00	-376,69	177,82	—	—	—	—
C ₄ H ₈ O ₂ (ж.) этилацетат	-479,03	259,41	-332,74	169,87	—	—	—	—
C ₄ H ₈ O ₂ (ж.) 1,4-диоксан	-400,80	196,60	-235,78	152,90	—	—	—	—
C ₄ H ₁₀ O (ж.) бутанол	-325,56	225,73	-160,88	183,26	—	—	—	—
C ₄ H ₁₀ O (г.) бутанол	-274,43	363,17	-150,73	110,00	14,68	358,10	-129,00	298—1000
C ₄ H ₁₀ O (ж.) диэтиловый эфир	-279,49	253,13	-123,05	173,30	—	—	—	—
C ₄ H ₁₀ O (г.) диэтиловый эфир	-252,21	342,67	-122,39	112,51	21,09	341,70	-117,90	298—1000
C ₅ H ₁₂ O (ж.) циклопентанол	-360,16	205,85	-127,84	184,00	—	—	—	—
C ₅ H ₁₂ O (ж.) амилловый спирт	-357,94	254,80	-161,30	209,20	—	—	—	—
C ₅ H ₁₂ O (г.) амилловый спирт	-302,33	402,34	-149,79	132,88	6,29	474,90	-182,45	298—1000
C ₆ H ₁₂ O (ж.) циклогексанол	-186,82	161,08	-85,62	132,00	—	—	—	—
C ₆ H ₁₂ O (кр.) хинон	-164,85	144,01	-50,21	134,70	—	—	—	—
C ₆ H ₆ O (кр.) фенол	-362,96	140,16	-216,68	139,74	—	—	—	—
C ₆ H ₆ O ₂ (кр.) гидрохинон	-385,14	167,57	-245,24	145,18	—	—	—	—
C ₇ H ₈ O ₂ (кр.) бензойная кислота	—	—	—	—	—	—	—	—

C₂H₅O (ж.) бензиловый спирт
C₆H₅O₂ (кр.) ангидрид фталевой кислоты
C₆H₅O₃ (кр.) фталевая кислота
C₁₂H₂₂O₄ (кр.) хингидрон
C₁₂H₂₂O₁₁ (кр.) сахароза

Галогенсодержащие соединения

CCl ₂ F ₂ (г.) дихлордифторметан (фреон-12)	-477,44	300,79	-438,50	72,40	—	—	—	—
CCl ₃ F (г.) трихлорфторметан (фреон-11)	-285,15	309,74	-245,85	77,99	—	—	—	—
CCl ₄ (ж.) тетрахлорметан	-132,84	216,19	-62,66	131,70	—	—	—	—
CF ₄ (г.) тетрафторметан	-100,42	310,12	-58,23	83,76	—	—	—	—
CHClF ₂ (г.) хлордифторметан (фреон-22)	-933,03	261,50	-888,46	61,46	59,36	97,00	-49,57	298—1000
CHCl ₂ F (г.) хлорфторметан (фреон-21)	-479,12	280,84	-448,02	55,85	24,10	146,20	-70,26	298—1000
CHCl ₃ (г.) трихлорметан (хлороформ)	-282,19	293,05	-251,70	60,98	—	—	—	—
CHCl ₃ (ж.) трихлорметан (хлороформ)	-132,21	202,92	-71,85	116,30	—	—	—	—
CHCl ₃ (г.) трихлорметан (хлороформ)	-101,25	295,64	-68,52	65,73	29,50	148,90	-90,70	298—773
CHF ₃ (г.) трифторметан	-697,51	259,58	-663,11	51,04	16,51	133,40	-58,96	298—1000
CH ₂ Cl ₂ (ж.) дихлорметан	-124,26	178,66	-70,45	100,00	—	—	—	—
CH ₂ Cl ₂ (г.) дихлорметан	-95,39	270,24	-68,87	51,13	22,09	111,30	-46,36	298—1000
CH ₂ F ₂ (г.) дифторметан	-452,88	246,60	-425,36	42,88	11,39	118,20	-46,00	298—1000
CH ₃ Br (г.) бромметан	-37,66	245,81	-28,18	42,43	18,53	89,40	-27,28	298—1500
CH ₃ Cl (г.) хлорметан	-86,31	234,47	-62,90	40,75	15,57	92,74	-28,31	298—1500
CH ₃ F (г.) фторметан	-246,90	222,80	-223,04	37,48	11,87	94,58	-29,30	298—1500
CH ₃ I (ж.) иодметан	-13,76	162,76	15,10	127,2	—	—	—	—
CH ₃ Cl (г.) иодметан	13,97	254,01	15,63	44,14	19,67	92,67	-32,28	298—1000
C ₂ H ₅ Cl (г.) хлорэтан	-111,72	275,85	-60,04	62,72	11,63	193,00	-72,92	298—1000
C ₂ H ₅ F (г.) фторэтан	-261,50	264,93	-209,60	59,04	8,27	190,90	-69,55	298—1000
C ₂ H ₅ Cl (ж.) хлорбензол	10,79	209,20	89,17	145,60	—	—	—	—
C ₂ H ₅ Cl (ж.) хлорбензол	51,84	313,46	99,15	98,03	-3,09	388,92	-166,25	298—1000
C ₂ H ₅ F (ж.) фторбензол	-151,17	205,94	-74,84	146,40	—	—	—	—
C ₂ H ₅ F (г.) фторбензол	-116,57	302,63	-69,06	94,43	-9,91	401,30	-171,40	298—1000
C ₂ H ₅ F ₃ (ж.) фенилтрифторметан	-637,64	271,50	-518,74	188,40	—	—	—	—

Вещество	ΔH_f° , 298, кДж/моль	S_{298}° , Дж/ моль·К	ΔG_f° , 298, кДж/моль	C_p° , 298, Дж/ моль·К	Коэффициенты уравнения $C_p = f(T)$			Температурный интервал К
					a	b·10 ³	c·10 ⁶	
$C_2H_5F_3$ (г.) фенилтрифторметан	-600,07	372,58	-511,29	116,10	-7,36	472,10	-193,40	298—1000
Азотсодержащие соединения								
CH_3N_2 (г.) диазометан	192,46	242,80	217,78	48,85	54,02	31,50	-13,16 (с·10 ⁻⁹)	298—1000
CH_3NO_2 (г.) нитрометан	-74,73	275,01	-7,00	57,32	11,76	172,60	-66,49	298—1000
CH_3N_2O (кр.) карбамид (мочевина)	-333,17	104,60	-197,15	93,14	—	—	—	—
CH_3N (г.) метиламин	-23,01	242,59	32,18	50,08	14,70	132,60	-41,08	298—1000
CH_3N_2 (ж.) метилгидразин	53,14	165,94	179,15	134,72	—	—	—	—
CH_3N_2 (г.) метилгидразин	85,35	278,70	177,76	71,13	25,31	178,99	-56,40	298—1000
$C_2H_5NO_2$ (кр.) аминнокислотная кислота (гликоколь)	-524,67	109,20	-366,84	100,42	—	—	—	—
C_2H_5N (г.) диметиламин	-18,83	272,96	67,91	69,04	4,54	242,10	-86,94	298—1000
C_2H_5N (г.) акрилонитрил	184,93	273,93	195,31	63,76	20,46	164,50	-54,13	298—1000
C_2H_5N (г.) триметиламин	-23,85	288,78	98,79	91,76	1,60	341,00	-129,10	298—1000
C_2H_5N (ж.) пиридин	99,96	177,90	181,31	132,72	—	—	—	—
C_2H_5N (г.) пиридин	140,16	282,80	190,23	78,12	-18,45	370,10	-151,20	298—1000
$C_2H_5NO_2$ (ж.) нитробензол	15,90	224,26	146,20	(186)	—	—	—	—
C_2H_5N (ж.) анилин	31,09	191,29	149,08	190,79	—	—	—	—
C_6H_7N (г.) анилин	86,86	319,20	166,67	108,40	-6,00	439,40	-155,30	298—1000

Серусодержащие соединения

CH_3S (г.) метантиол	-22,97	255,06	-9,96	50,25	21,00	108,66	-55,56	298—1000
C_2H_5S (ж.) тиоциклопропан	51,92	162,51	94,24	—	2,38	196,23	-80,58	298—1000
C_2H_5S (г.) тиоциклопропан	82,22	255,27	96,88	117,24	89,33	96,23	—	270—290
C_2H_5S (ж.) диметилсульфид	-65,40	196,40	5,73	(290 К)	—	—	—	—

C_2H_5S (г.) диметилсульфид	-37,53	285,85	6,93	74,10	24,98	182,30	-60,21	298—1000
C_2H_5S (г.) этантиол	-46,11	296,10	-4,71	72,68	20,00	197,36	-69,33	298—1000
$C_2H_5S_2$ (ж.) диметилдисульфид	-62,59	235,39	6,43	146,00	112,13	112,97	—	300—350
$C_2H_5S_2$ (г.) диметилдисульфид	-24,14	336,64	14,69	94,31	38,91	207,65	-73,72	298—1000
C_2H_5S (ж.) тиоциклобутан	25,27	187,11	100,88	113,46	62,34	171,54	—	270—330
C_2H_5S (г.) тиоциклобутан	61,13	285,22	107,49	69,33	-8,03	293,59	-115,39	298—1000
C_2H_5S (ж.) тиофен	81,04	181,17	121,22	123,93	74,06	167,36	-270—340	298—1000
C_2H_5S (г.) тиофен	115,73	278,86	126,78	72,89	4,27	296,52	-126,82	298—1000
C_2H_5S (ж.) тиоциклопентан	-72,43	207,82	37,63	140,32	70,50	234,30	-270—340	298—1000
C_2H_5S (г.) тиоциклопентан	-33,81	309,36	45,98	90,88	-11,46	389,66	-155,85	298—1000
C_2H_5S (ж.) диэтилсульфид	-119,33	269,28	11,32	171,86	111,71	200,83	-120,75	298—1000
C_2H_5S (г.) диэтилсульфид	-83,47	368,02	17,74	111,03	20,84	358,44	-270—300	298—1000
$C_2H_5S_2$ (ж.) диэтилдисульфид	-120,04	305,01	9,47	203,96	152,59	172,38	—	298—1000
$C_2H_5S_2$ (г.) диэтилдисульфид	-74,64	414,51	22,23	141,34	39,04	380,28	-292—340	298—1000
C_2H_5S (ж.) тиоциклогексан	-105,94	218,24	41,64	163,23	64,73	330,54	-216,77	298—1000
C_2H_5S (г.) тиоциклогексан	-63,26	323,26	53,01	108,20	-39,12	558,56	—	300—370
C_2H_5S (ж.) бензолтиол (тиофенол)	63,89	222,80	133,99	173,22	115,69	192,46	—	298—1000
C_6H_5S (г.) бензолтиол (тиофенол)	111,55	336,85	147,65	104,89	-3,01	413,92	-173,30	298—1000
C_2H_5OS (ж.) тиоуксусная кислота	-219,20	—	—	—	—	—	—	—
C_2H_5OS (г.) тиоуксусная кислота	-181,96	313,21	-154,01	80,88	39,50	157,03	-60,04	298—1000

Ионы в водных растворах

Ион	ΔH_f° , 298, кДж/моль	S_{298}° , Дж/(моль·К)	ΔG_f° , 298, кДж/моль	Ион	ΔH_f° , 298, кДж/моль	S_{298}° , Дж/(моль·К)	ΔG_f° , 298, кДж/моль
Ag^+	105,75	73,39	77,10	CH_3COO^-	-485,64	87,58	-369,37
Al^{3+}	-529,69	-301,25	-489,80	CN^-	150,62	96,45	171,58
AsO_4^{3-}	-890,06	-167,28	-648,93	CNO^-	-145,90	101,13	-96,07
Ba^{2+}	-524,05	8,79	-547,50	CNS^-	74,27	146,05	89,96
Br^-	-121,50	82,84	-104,04	CO_3^{2-}	-676,64	-56,04	-527,60
BrO_3^-	-83,63	163,18	1,53	$C_2O_4^{2-}$	-824,25	51,04	-674,86

Ион	ΔH_f° , 298, кДж/моль	S° , 298, Дж/(моль·К)	ΔG_f° , 298, кДж/моль	Ион	ΔH_f° , 298, кДж/моль	S° , Дж/(моль·К)	ΔG_f° , 298, кДж/моль
Ca^{2+}	-542,66	-55,23	-552,70	HPO_3^{2-}	-969,01	(16,81)	-811,70
Cd^{2+}	-75,31	-70,92	-77,65	HPO_3^{3-}	-1292,14	-33,47	-1089,28
Cl^-	-110,07	56,74	-131,29	HS^-	-17,57	62,76	12,15
ClO_2^-	-66,53	101,25	-36,61	HSO_3^-	-627,98	132,38	-527,32
ClO_2^-	-95,56	164,43	-0,19	H_2PO_3^-	-887,77	127,97	-755,23
ClO_4^-	-123,60	183,68	-3,40	HF_2^-	-969,43	79,50	-830,81
Co^{3+}	-56,61	-110,46	-53,64	H_2PO_4^-	-660,65	67,78	-581,52
Co^{3+}	94,14	-285,01	129,70	Hg_2^{2+}	-1296,29	90,37	-1130,34
Cr^{3+}	-138,91	41,87	-183,26	Hg_2^{2+}	173,47	-25,15	164,68
CrO_4^{2-}	-235,98	-215,48	-223,06	I^-	171,75	82,17	153,60
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$	-875,42	46,02	-720,91	I_3^-	-56,90	106,69	-51,94
Cs^+	-1490,93	270,39	-1295,62	IO_3^-	-51,46	239,32	-51,42
Cu^+	-258,04	132,84	-291,96	K^+	-252,17	117,78	-127,16
Cu^+	72,80	44,35	50,00	Li^+	-278,45	101,04	-282,62
$\text{Cu}_2\text{H}_3^{2+}$	66,94	-92,72	65,56	Mg^{2+}	-461,75	11,30	-292,86
$\text{Cu}(\text{NH}_3)^+$	-36,86	17,90	15,76	Mn^{2+}	-220,50	-119,66	-455,24
$\text{Cu}(\text{NH}_3)^+$	-151,04	263,59	-65,37	MnO_4^-	-533,04	96,94	-229,91
$\text{Cu}(\text{NH}_3)^+$	-140,21	117,74	-30,50	NH_4^+	-132,80	196,23	-440,28
$\text{Cu}(\text{NH}_3)^+$	-244,01	204,24	-73,18	NO_2^-	-104,60	112,84	-79,52
$\text{Cu}(\text{NH}_3)^+$	-346,52	280,50	-111,51	NO_3^-	-207,38	139,85	-37,16
$\text{Cu}(\text{NH}_3)^+$	-448,23	309,47	-134,64	Na^+	-240,30	146,94	-111,49
F^-	-333,84	-14,02	-279,99	Ni^{2+}	-53,14	58,41	-261,90
Fe^{2+}	-87,86	-113,39	-84,88	OH^-	-230,02	-126,05	-45,56
Fe^{3+}	-47,70	-293,30	-10,53	PO_3^{3-}	-1277,38	-10,71	-157,35
H^+	0	0	0	PO_3^{3-}	(-1,18)	-24,32	-1018,81
HCOO^-	-426,22	90,81	-351,54	Pb^{2+}	201,25	(11,82)	(11,82)
HCO_2^-	-691,28	92,57	-586,56	PbCl_2^-	-500,82	125,64	-354,01
HC_2O_4^-	-818,18	117,03	-688,47	Ra^{2+}	-669,44	223,43	-485,31
Rb^+	-251,12	120,46	-283,76	Ti^-	-529,69	28,87	(-555,99)
S^{2-}	32,64	-14,52	85,40		5,52	126,20	-32,43
						-176,92	214,76

SO_3^{2-}	-638,27	-38,28	-486,73	U^{3+}	-514,63	-125,52	-520,59
SO_4^{2-}	-909,26	18,20	-743,99	U^{4+}	-590,15	-382,62	-538,91
SiF_6^{2-}	-2396,51	125,94	-2208,25	UO_2^{2+}	-1018,66	-89,68	-954,71
Sn^{2+}	-10,23	-25,26	-26,24	Zn^{2+}	-153,64	-110,62	-147,16
Sr^{2+}	-545,51	-26,36	-560,97				

Ионы в жидком аммиаке

Ион	ΔH_f° , кДж/моль	S° , Дж/(моль·К)	ΔG_f° , кДж/моль	Ион	ΔH_f° , кДж/моль	S° , Дж/(моль·К)	ΔG_f° , кДж/моль
Ag^+	108,8	96,2	73,6	K^+	-169,4	89,5	-196,6
Br^-	-246,9	-126,8	-167,4	Li^+	-205,0	33,5	-225,9
Ca^{2+}	-418,4	-87,9	-418,0	NCS^-	-49,4	—	—
Cl^-	-274,9	-126,8	-184,5	NH_2^-	42,3	-41,8	141,8
ClO_3^-	-199,6	62,8	-74,1	NH_4^+	-67,4	103,3	-11,3
Cs^+	-163,2	121,3	-193,7	NO_3^-	-324,7	-20,9	-178,6
H^+	0,0	0,0	0,0	Na^+	-159,4	63,2	-182,4
Hg^{2+}	189,1	146,4	129,3	Pb^{2+}	87,9	46,0	54,4
I^-	-189,5	-104,6	-121,3	Rb^+	-163,2	121,3	-196,2

45. Величина M_n для вычисления стандартного изменения энергии Гиббса по методу Темкина и Шварцмана

$$\Delta G_T^\circ = \Delta H_{298}^\circ - T \Delta S_{298}^\circ - T (\Delta a M_0 + \Delta b M_1 + \Delta c M_2 + \Delta c' M_{-2})$$

где ΔH_{298}° — стандартный тепловой эффект; $\Delta S_{298}^\circ = \sum (v_i S_{298}^\circ)_{\text{прод}} - \sum (v_i S_{298}^\circ)_{\text{исх}}$;

Δa (соответственно $\Delta b, \Delta c, \Delta c'$) = $\sum (v_i a)_{\text{прод}} - \sum (v_i a)_{\text{исх}}$ (обозначения см. табл. 44).

$$M_0 = \ln \frac{T}{298,15} + \frac{298,15}{T} - 1$$

$$M_n = \frac{T^n}{n(n+1)} + \frac{298,15^{n+1}}{(n+1)T} - \frac{298,15^n}{n} \quad (\text{при } n \neq 0)$$

T, K	M_0	$M_1 \cdot 10^{-3}$	$M_2 \cdot 10^{-6}$	$M_{-2} \cdot 10^6$
300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
400	0,0392	0,0130	0,0043	0,0364
500	0,1133	0,0407	0,0140	0,0916
600	0,1962	0,0759	0,0303	0,1423
700	0,2794	0,1153	0,0498	0,1953
800	0,3597	0,1574	0,0733	0,2213
900	0,4361	0,2012	0,1064	0,2521
1000	0,5088	0,2463	0,1310	0,2783
1100	0,5765	0,2922	0,1652	0,2983
1200	0,6410	0,3389	0,2029	0,3176
1300	0,7019	0,3860	0,2440	0,3340
1400	0,7595	0,4336	0,2886	0,34835
1500	0,8141	0,4814	0,3362	0,3610
1600	0,8665	0,5296	0,3877	0,3723
1700	0,9162	0,5780	0,4424	0,3824
1800	0,9635	0,6265	0,5005	0,3915
1900	1,009	0,6752	0,5619	0,3998
2000	1,0525	0,7240	0,6265	0,4072
2100	1,094	0,7730	0,6948	0,4140
2200	1,134	0,8220	0,7662	0,4203
2300	1,173	0,8711	0,8411	0,4260
2400	1,210	0,9203	0,9192	0,4314
2500	1,246	0,9696	1,0008	0,4363
2600	1,280	1,0189	1,0856	0,4408
2700	1,314	1,0683	1,1738	0,44505
2800	1,346	1,1177	1,2654	0,4490
2900	1,3775	1,1672	1,3603	0,4527
3000	1,408	1,2166	1,4585	0,4562

46. Термодинамические функции линейного гармонического осциллятора (по Эйнштейну)

В таблице даются, в Дж/(моль·К), колебательные составляющие изохорной теплоемкости C , приведенной внутренней энергии $\frac{U-U_0}{T}$, приведенной энергии Гельмгольца $\frac{A-U_0}{T}$ и энтропии S на одну степень свободы. $\theta = \frac{h\nu}{k}$ — характеристическая температура, К.

θ/T	C	$\frac{U-U_0}{T}$	$-\frac{A-U_0}{T}$	S	θ/T	C	$\frac{U-U_0}{T}$	$-\frac{A-U_0}{T}$	S
0,00	8,31	8,31	∞	∞	0,94	7,73	5,01	4,12	9,13
0,02	8,31	8,23	32,61	40,84	0,96	7,70	4,95	4,01	8,97
0,04	8,31	8,15	26,93	35,08	0,98	7,68	4,90	3,91	8,81
0,06	8,31	8,07	23,64	31,71	1,00	7,66	4,84	3,81	8,65
0,08	8,31	7,99	21,33	29,32	1,02	7,63	4,78	3,72	8,50
0,10	8,31	7,91	19,56	27,46	1,04	7,60	4,73	3,63	8,35
0,12	8,30	7,83	18,12	25,95	1,06	7,58	4,67	3,54	8,21
0,14	8,30	7,75	16,92	24,67	1,08	7,55	4,62	3,45	8,07
0,16	8,30	7,67	15,89	23,56	1,10	7,52	4,56	3,36	7,93
0,18	8,29	7,59	15,00	22,58	1,12	7,50	4,51	3,28	7,79
0,20	8,29	7,51	14,20	21,71	1,14	7,47	4,46	3,20	7,66
0,22	8,28	7,43	13,49	20,92	1,16	7,44	4,40	3,13	7,53
0,24	8,28	7,36	12,84	20,20	1,18	7,41	4,35	3,05	7,40
0,26	8,27	7,28	12,26	19,54	1,20	7,38	4,30	2,98	7,27
0,28	8,26	7,20	11,72	18,92	1,22	7,36	4,25	2,91	7,16
0,30	8,25	7,13	11,23	18,36	1,24	7,33	4,20	2,84	7,04
0,32	8,24	7,06	10,77	17,82	1,26	7,30	4,15	2,77	6,92
0,34	8,24	6,98	10,34	17,32	1,28	7,27	4,10	2,71	6,81
0,36	8,22	6,91	9,95	16,85	1,30	7,24	4,05	2,65	6,70
0,38	8,22	6,83	9,58	16,41	1,32	7,20	4,00	2,58	6,58
0,40	8,20	6,76	9,23	15,99	1,34	7,17	3,95	2,52	6,48
0,42	8,19	6,69	8,90	15,59	1,36	7,14	3,90	2,47	6,37
0,44	8,18	6,62	8,59	15,21	1,38	7,11	3,86	2,41	6,27
0,46	8,17	6,55	8,30	14,84	1,40	7,08	3,81	2,35	6,16
0,48	8,16	6,48	8,02	14,50	1,42	7,05	3,76	2,30	6,06
0,50	8,14	6,41	7,76	14,16	1,44	7,02	3,72	2,25	5,97
0,52	8,13	6,34	7,50	13,84	1,46	6,98	3,67	2,20	5,87
0,54	8,12	6,27	7,28	13,54	1,48	6,95	3,63	2,15	5,77
0,56	8,10	6,20	7,04	13,24	1,50	6,92	3,58	2,10	5,68
0,58	8,08	6,14	6,82	12,96	1,52	6,88	3,54	2,05	5,59
0,60	8,07	6,07	6,62	12,68	1,54	6,85	3,49	2,01	5,50
0,62	8,05	6,00	6,42	12,42	1,56	6,82	3,45	1,96	5,41
0,64	8,04	5,94	6,23	12,16	1,58	6,78	3,41	1,92	5,32
0,66	8,02	5,87	6,05	11,92	1,60	6,75	3,36	1,88	5,24
0,68	8,00	5,80	5,87	11,68	1,62	6,71	3,32	1,83	5,16
0,70	7,98	5,74	5,71	11,45	1,64	6,68	3,28	1,79	5,08
0,72	7,96	5,68	5,55	11,22	1,66	6,64	3,24	1,75	4,99
0,74	7,94	5,61	5,39	11,00	1,68	6,61	3,20	1,72	4,92
0,76	7,92	5,55	5,24	10,79	1,70	6,57	3,16	1,68	4,84
0,78	7,90	5,49	5,10	10,59	1,72	6,54	3,12	1,64	4,76
0,80	7,88	5,43	4,96	10,39	1,74	6,50	3,08	1,60	4,68
0,82	7,86	5,37	4,83	10,19	1,76	6,46	3,04	1,57	4,61
0,84	7,84	5,31	4,70	10,00	1,78	6,43	3,00	1,54	4,54
0,86	7,82	5,24	4,58	9,82	1,80	6,39	2,96	1,50	4,47
0,88	7,80	5,19	4,46	9,64	1,82	6,36	2,93	1,47	4,40
0,90	7,78	5,13	4,34	9,46	1,84	6,32	2,89	1,44	4,32
0,92	7,75	5,07	4,23	9,30	1,86	6,28	2,85	1,41	4,26
					1,88	6,24	2,82	1,38	4,19

θ/T	C	$\frac{U - U_0}{T}$	$-\frac{A - U_0}{T}$	S	θ/T	C	$\frac{U - U_0}{T}$	$-\frac{A - U_0}{T}$	S
1,90	6,21	2,78	1,35	4,12	3,50	3,27	0,91	0,26	1,16
1,92	6,17	2,74	1,32	4,06	3,55	3,19	0,87	0,24	1,12
1,94	6,13	2,71	1,29	4,00	3,60	3,11	0,84	0,23	1,07
1,96	6,10	2,67	1,26	3,93	3,65	3,04	0,81	0,22	1,03
1,98	6,06	2,64	1,24	3,87	3,70	2,96	0,78	0,21	0,99
2,00	6,02	2,60	1,21	3,81	3,75	2,88	0,75	0,20	0,95
2,02	5,98	2,57	1,18	3,75	3,80	2,81	0,72	0,19	0,91
2,04	5,94	2,54	1,16	3,69	3,85	2,74	0,70	0,18	0,88
2,06	5,91	2,50	1,13	3,64	3,90	2,67	0,67	0,17	0,84
2,08	5,87	2,47	1,11	3,58	3,95	2,60	0,64	0,16	0,81
2,10	5,83	2,44	1,09	3,52	4,00	2,53	0,62	0,15	0,77
2,12	5,79	2,40	1,06	3,47	4,05	2,46	0,60	0,15	0,74
2,14	5,75	2,37	1,04	3,41	4,10	2,40	0,57	0,14	0,71
2,16	5,72	2,34	1,02	3,36	4,15	2,33	0,55	0,13	0,68
2,18	5,68	2,31	1,00	3,31	4,20	2,27	0,53	0,13	0,66
2,20	5,64	2,28	0,98	3,26	4,25	2,20	0,51	0,12	0,63
2,22	5,60	2,25	0,96	3,20	4,30	2,14	0,49	0,11	0,60
2,24	5,56	2,22	0,94	3,16	4,35	2,08	0,47	0,11	0,58
2,26	5,52	2,19	0,92	3,11	4,40	2,03	0,46	0,10	0,56
2,28	5,49	2,16	0,90	3,06	4,45	1,97	0,44	0,10	0,54
2,30	5,45	2,13	0,88	3,01	4,50	1,91	0,42	0,09	0,51
2,32	5,41	2,10	0,86	2,96	4,60	1,80	0,39	0,08	0,47
2,34	5,37	2,07	0,84	2,92	4,70	1,70	0,36	0,08	0,44
2,36	5,33	2,05	0,82	2,87	4,80	1,60	0,33	0,07	0,40
2,38	5,29	2,02	0,81	2,83	4,90	1,51	0,31	0,06	0,37
2,40	5,26	1,99	0,79	2,78	5,00	1,42	0,28	0,06	0,34
2,42	5,22	1,96	0,78	2,74	5,10	1,34	0,26	0,05	0,31
2,44	5,18	1,94	0,76	2,70	5,20	1,25	0,24	0,05	0,29
2,46	5,14	1,91	0,74	2,65	5,30	1,18	0,22	0,04	0,26
2,48	5,10	1,88	0,73	2,61	5,40	1,10	0,20	0,04	0,24
2,50	5,06	1,86	0,71	2,57	5,50	1,04	0,19	0,03	0,22
2,52	5,02	1,83	0,70	2,53	5,60	0,97	0,17	0,03	0,20
2,56	4,95	1,78	0,67	2,45	5,70	0,91	0,16	0,03	0,19
2,60	4,87	1,73	0,64	2,38	5,80	0,85	0,15	0,02	0,17
2,64	4,80	1,69	0,62	2,30	5,90	0,80	0,14	0,02	0,16
2,68	4,72	1,64	0,59	2,23	6,00	0,75	0,12	0,02	0,14
2,72	4,64	1,60	0,57	2,16	6,20	0,65	0,10	0,02	0,12
2,76	4,57	1,55	0,54	2,09	6,40	0,57	0,09	0,01	0,10
2,80	4,49	1,51	0,52	2,03	6,60	0,49	0,08	0,01	0,09
2,84	4,42	1,46	0,50	1,97	6,80	0,43	0,06	0,01	0,07
2,88	4,34	1,42	0,48	1,90	7,00	0,37	0,05	0,01	0,06
2,92	4,27	1,38	0,46	1,84	7,20	0,32	0,04	0,01	0,05
2,96	4,20	1,34	0,44	1,79	7,40	0,28	0,04	0,01	0,04
3,00	4,13	1,31	0,42	1,72	7,60	0,24	0,03	0,00	0,04
3,05	4,04	1,26	0,40	1,66	7,80	0,21	0,03	0,00	0,03
3,10	3,95	1,22	0,38	1,60	8,00	0,18	0,02	0,00	0,02
3,15	3,86	1,17	0,36	1,54	8,40	0,13	0,02	0,00	0,02
3,20	3,77	1,13	0,35	1,48	8,80	0,10	0,01	0,00	0,01
3,25	3,68	1,09	0,33	1,42	9,20	0,07	0,01	0,00	0,01
3,30	3,60	1,05	0,31	1,36	9,60	0,05	0,01	0,00	0,01
3,35	3,52	1,01	0,30	1,31	10,0	0,04	0,00	0,00	0,00
3,40	3,43	0,98	0,28	1,26	11,0	0,02	0,00	0,00	0,00
3,45	3,35	0,94	0,27	1,21	12,0	0,01	0,00	0,00	0,00

47. Характеристическая температура кристаллических веществ

Характеристическая температура по Дебаю: $\theta = \frac{h\nu_{\text{макс}}}{k}$. Величины θ в скобках вычислены из приведенных значений мольного объема V и температуры плавления $T_{\text{плавл}}$.

Вещество	$T_{\text{плавл}}, \text{K}$	$V \cdot 10^4, \text{м}^3/\text{моль}$	θ, K	Вещество	$T_{\text{плавл}}, \text{K}$	$V \cdot 10^4, \text{м}^3/\text{моль}$	θ, K
Ag	1235	10,28	214 (210)	K	336,4	45,30	100
Al	933,5	10,19	389	Li	456	11,76	385
Au	1337,6	10,21	173 (165)	Mg	923	13,98	290
Ba	983	36,34	115	N ₂	62,7	13,65 **	68
Be	1556	5,26	1000	Na	370,7	22,85	172
Bi	544,5	21,26	80 (78)	Ni	1728	6,59	375 (390)
Br ₂	265,8	25,08 **	86	O ₂	54,7	11,22 **	89
C (алмаз)	3800 *	3,41	1910 (2240)	Pb	600,6	18,28	88 (87)
Ca	1123	25,22	228	Pt	2045	8,66	(229)
Cd	594	12,99	168	Si	1688	11,37	(660)
Cl ₂	171,9	21,36 **	115	Sn	505	(18,2)	110
Co	1767	6,76	385 (390)	Ti	1941	10,5	(392)
Cr	2130	7,72	(490)	W	3653	9,83	(370)
Cu	1358	7,12	313 (325)	KBr	1003	44,0	177
F ₂	50	16,66 **	100	KCl	1049	37,5	230
Fe	1806	7,11 **	433 (410)	NaCl	1073	27,0	281
H ₂	13,8	13,21 **	91	BaF ₂	1563	36,4	177
I ₂	386,8	25,93	76	CaF ₂	1691	24,5	474
				H ₂ O	273,15	19,6	192

* При давлении > 10132,5 кПа.

** Атомный объем.

48. Термодинамические колебательные функции кристаллических веществ (по Дебаю)

η/T	C	$\frac{U - U_0}{T}$	$-\frac{A - U_0}{T}$	S	η/T	C	$\frac{U - U_0}{T}$	$-\frac{A - U_0}{T}$	S
0	24,94	24,94	∞	∞	4,4	11,17	3,82	1,58	5,40
0,2	24,89	23,12	50,29	73,43	4,6	10,50	3,50	1,42	4,92
0,4	24,77	21,40	34,81	56,23	4,8	9,83	3,20	1,27	4,48
0,6	24,52	19,77	26,44	46,23	5,0	9,20	2,94	1,14	4,08
0,8	24,18	18,25	20,97	39,22	5,2	8,62	2,69	1,04	3,73
1,0	23,76	16,82	17,08	32,90	5,6	7,61	2,29	0,86	3,15
1,2	23,22	15,48	14,09	29,57	6,0	6,61	1,93	0,71	2,64
1,4	22,68	14,23	11,81	26,04	6,4	5,77	1,64	0,59	2,23
1,6	22,05	13,08	9,98	23,06	6,8	5,10	1,42	0,50	1,92
1,8	21,34	12,00	8,56	20,50	7,2	4,47	1,22	0,42	1,64
2,0	20,58	10,99	7,29	18,28	7,6	3,92	1,05	0,36	1,42
2,2	19,83	10,08	6,29	16,37	8,0	3,48	0,92	0,31	1,24
2,4	19,04	9,23	5,45	14,68	8,4	3,14	0,82	0,28	1,10
2,6	18,16	8,45	4,74	13,19	8,8	2,82	0,73	0,25	0,98
2,8	17,32	7,72	4,14	11,87	9,2	2,51	0,64	0,22	0,86
3,0	16,51	7,07	3,63	10,69	9,6	2,19	0,56	0,19	0,75
3,2	15,65	6,46	3,19	9,65	10	1,89	0,48	0,16	0,64
3,4	14,85	5,91	2,82	8,73	11	1,435	0,36	0,12	0,48
3,6	14,06	5,42	2,49	7,91	12	1,12	0,28	0,09	0,37
3,8	13,30	4,96	2,21	7,17	13	0,88	0,22	0,07	0,29
4,0	12,56	4,53	1,97	6,50	14	0,70	0,18	0,06	0,23
4,2	11,84	4,16	1,76	5,92	15	0,57	0,14	0,05	0,20

49. Логарифмы констант равновесия реакций образования некоторых веществ

Приведенные значения $\lg K_f$, T относятся к образованию (индекс f — formation) соединений из простых веществ, устойчивых при 101,325 кПа (1 атм) и 298 К. Расчет $\lg K_f$, T произведен с использованием средних теплосмкостей. Значения $\lg K_f$, T служат для вычисления констант равновесия химических реакций при указанных температурах T (в К) по уравнению: $\lg K_a$, $T = \Delta \lg K_f$, $T = \sum \nu_i \lg K_f$, i (прод.) — $\sum \nu_i \lg K_f$, i (исх.)

Вещество	Температура, К					
	500	600	700	800	900	1000

Неорганические соединения

AgCl (кр.)	10,30	9,79	7,08	—	—	—
Ag ₂ O (кр.)	—0,248	—	—	—	—	—
AlF ₃ -α	143,95	117,71	99,00	—	—	—
Al ₂ O ₃ (корунд)	158,68	129,54	108,73	93,13	81,00	—
AsCl ₃ (г.)	26,09	21,38	18,01	15,48	—	—
As ₂ O ₃ (клаудетит)	55,08	—	—	—	—	—
As ₂ O ₃ (арсенолит)	54,61	—	—	—	—	—
BCl ₃ (г.)	39,47	32,45	27,44	23,68	20,76	18,42
BF ₃ (г.)	115,76	95,95	81,79	71,17	62,91	56,31
B ₂ O ₃ (кр.)	118,85	96,75	81,00	—	—	—
BaCO ₃ (кр.)	112,89	91,87	—	—	—	—
BaCl ₂ (кр.)	81,50	66,59	—	—	—	—
Ba(NO ₃) ₂ (кр.)	69,66	52,56	—	—	—	—
BaO (кр.)	53,05	43,40	—	—	—	—
Ba(OH) ₂ (кр.)	83,25	66,95	—	—	—	—
BeO (кр.)	57,42	47,00	39,57	34,00	29,67	26,22
Bi ₂ O ₃ (кр.)	45,62	—	—	—	—	—
CO (г.)	16,22	14,29	12,90	11,86	11,04	10,37
CO ₂ (г.)	41,25	34,39	29,48	25,80	22,94	20,64
COCl ₂ (г.)	20,46	16,64	13,92	11,88	10,30	9,04
CaC ₂ -α	7,21	6,21	5,50	—	—	—
CaCO ₃ (кальцит)	112,38	91,42	76,47	—	—	—
CaCl ₂ (кр.)	75,06	61,25	51,40	—	—	—
CaF ₂ -α	118,43	97,23	82,10	—	—	—
Ca(NO ₃) ₂ (кр.)	64,00	47,84	36,40	—	—	—
CaO (кр.)	60,83	49,79	41,90	—	—	—
Ca(OH) ₂ (кр.)	87,79	70,82	—	—	—	—
CdCl ₂ (кр.)	32,58	25,86	—	—	—	—
CdO (кр.)	21,82	17,40	—	—	—	—
ClO ₂ (г.)	—14,05	—12,23	—10,93	—9,95	—9,19	—8,57
Cl ₂ O (г.)	—11,01	—9,70	—8,75	—8,05	—7,49	—7,05
CoCl ₂ (кр.)	25,28	19,95	16,20	—	—	—
CrCl ₃ (кр.)	45,95	36,34	29,51	24,42	20,49	17,37
Cr ₂ O ₃ (кр.)	104,9	85,1	71,02	52,20	45,61	35,72
CuCl (кр.)	11,38	9,05	7,41	—	—	—

Вещество	Температура, К					
	500	600	700	800	900	1000
CuCl ₂ (кр.)	13,85	10,33	7,84	—	—	—
CuO (кр.)	12,10	9,32	7,34	5,88	4,75	3,86
Cu ₂ O (кр.)	14,09	11,10	8,96	7,38	6,16	5,19
FeCO ₃ (кр.)	64,36	51,56	42,47	35,70	—	—
FeO (кр.)	24,13	19,55	16,28	13,83	11,92	10,35
Fe ₂ O ₃ (кр.)	71,66	57,44	47,33	39,78	33,92	29,20
Fe ₃ O ₄ (кр.)	98,83	79,55	65,89	55,75	—	—
GeO ₂ (гекс.)	48,54	38,92	32,07	26,94	22,97	19,81
GeO ₂ (тетраг.)	50,37	40,30	33,13	27,77	23,61	20,29
HCN (г.)	-11,98	-9,69	-7,99	-6,74	-5,89	-5,14
HCl (г.)	10,15	8,53	7,37	6,49	5,81	5,26
HF (г.)	28,91	24,14	20,73	18,16	16,17	14,57
H ₂ O (г.)	22,89	18,64	15,59	13,30	11,52	10,08
H ₂ O ₂ (г.)	8,85	6,45	4,74	3,45	2,44	1,66
HgO (кр.)	3,88	2,33	—	—	—	—
Hg ₂ Cl ₂ (кр.)	18,27	13,73	—	—	—	—
MgCO ₃ (кр.)	99,83	80,80	67,23	—	—	—
MgCl ₂ (кр.)	67,36	47,60	39,65	33,70	29,08	—
MgO (кр.)	57,19	46,73	39,26	33,66	29,31	—
MnCO ₃ (кр.)	79,83	64,53	53,61	—	—	—
MnCl ₂ (кр.)	43,20	34,88	28,95	24,52	21,08	—
MnO (кр.)	36,44	29,74	24,96	21,38	18,59	16,35
MnO ₂ (кр.)	44,90	35,84	29,38	—	—	—
Mn ₂ O ₃ (кр.)	86,45	69,80	57,84	49,03	42,12	36,60
NH ₃ (г.)	-0,480	-1,35	-1,98	-2,46	-2,84	-3,13
NO (г.)	-8,88	-7,29	-6,16	-5,30	-4,64	-4,11
NO ₂ (г.)	-6,77	-6,18	-5,76	-5,45	-5,20	-5,00
NOCl (г.)	-7,94	-7,03	-6,39	-5,90	-5,53	-5,22
N ₂ O (г.)	-12,45	-11,01	-9,99	-9,22	-8,61	-8,12
N ₂ O ₄ (г.)	-16,69	-16,47	-16,30	-16,14	-16,00	-15,86
N ₂ O ₅ (г.)	-19,55	-19,26	-19,02	-18,82	-18,64	-18,48
SbCl ₃ (г.)	30,41	24,98	21,10	18,18	15,91	—
Sb ₂ O ₃ (кр.)	60,95	48,60	39,30	33,30	28,26	—
SiCl ₄ (г.)	61,79	50,35	42,19	36,07	31,31	27,52
SiF ₄ (г.)	161,46	133,29	113,16	98,06	86,39	77,01
SiH ₄ (г.)	-7,73	-7,22	-6,87	-6,60	-6,39	-6,22
SiO ₂ (кр.)	85,65	69,81	58,52	50,07	—	—
SrO (кр.)	56,70	46,41	39,06	33,55	—	—
TeF ₆ (г.)	126,39	102,56	85,54	—	—	—
TeO ₂ (кр.)	24,44	18,84	14,85	—	—	—
ThO ₂ (кр.)	118,25	96,90	81,66	70,23	61,35	54,25
TiCl ₄ (г.)	73,46	60,19	50,70	43,59	38,05	33,62
TiO ₂ (рутил)	89,15	72,71	60,98	52,18	45,35	39,89

Вещество	Температура, К					
	500	600	700	800	900	1000
TiO ₂ (анатаз)	87,92	71,70	60,12	51,45	44,71	39,31
UF ₄ (кр.)	184,05	150,84	127,14	109,37	95,57	—
UF ₆ (кр.)	209,08	171,84	145,24	125,29	109,77	—
UO ₂ (кр.)	104,26	85,40	71,94	61,85	54,00	—
U ₃ O ₈ (кр.)	338,20	276,12	231,85	198,67	172,89	—
UO ₂ F ₂ (кр.)	154,49	126,04	95,97	90,52	78,69	—
WO ₃ (кр.)	74,31	59,71	49,31	41,53	35,50	30,69

Органические соединения

Углеводороды

CH ₄ (г.) метан	3,44	2,02	0,991	0,213	-0,392	-0,873
C ₂ H ₂ (г.) ацетилен	-21,41	-17,49	-14,70	-12,61	-10,99	-9,70
C ₂ H ₄ (г.) этилен	-8,41	-7,61	-7,06	-6,84	-6,31	-6,04
C ₂ H ₆ (г.) этан	-0,496	-2,14	-3,33	-4,22	-4,91	-5,45
C ₃ H ₄ (г.) пропadiен (аллен)	-22,01	-18,76	-16,45	-14,71	-13,35	-12,27
C ₃ H ₆ (г.) пропиен	-9,81	-9,62	-9,50	-9,40	-9,30	-9,20
C ₃ H ₆ (г.) циклопропан	-14,82	-14,06	-13,53	-13,12	-12,79	-12,51
C ₃ H ₈ (г.) пропан	-3,58	-5,60	-7,05	-8,13	-8,96	-9,60
C ₄ H ₆ (г.) 1,2-бутадиен	-23,53	-20,86	-18,97	-17,54	-16,43	-15,52
C ₄ H ₈ (г.) 1,3-бутадиен (дивинил)	-18,83	-17,06	-15,79	-14,84	-14,08	-13,46
C ₄ H ₈ (г.) 1-бутен	-12,83	-13,03	-13,20	-13,31	-13,39	-13,42
C ₄ H ₈ (г.) 2-бутен, <i>цис</i> -	-12,42	-12,77	-13,049	-13,25	-13,39	-13,49
C ₄ H ₈ (г.) 2-бутен, <i>транс</i> -	-12,17	-12,58	-12,90	-13,13	-13,30	-13,41
C ₄ H ₁₀ (г.) 2-метилпропен	-11,71	-12,21	-12,59	-12,87	-13,07	-13,20
C ₄ H ₁₀ (г.) циклобутан	-17,80	-17,57	-17,41	-17,28	-17,15	-17,02
C ₄ H ₁₀ (г.) бутан	-6,34	-8,79	-10,56	-11,88	-12,89	-13,66
C ₄ H ₁₀ (г.) изобутан	-6,26	-8,85	-10,71	-12,10	-13,16	-13,99
C ₅ H ₈ (г.) 2-метил-1,3-бутадиен (изопрен)	-20,49	-19,38	-18,54	-17,93	-17,43	-17,01
C ₅ H ₁₀ (г.) циклопентан	-12,76	-14,42	-15,61	-16,49	-17,14	-17,62
C ₅ H ₁₂ (г.) пентан	-9,33	-12,24	-14,30	-15,82	-16,98	-17,88
C ₅ H ₁₂ (г.) 2-метилбутан (изопентан)	-8,84	-11,82	-13,97	-15,57	-16,78	-17,71
C ₅ H ₁₂ (г.) 2,2-диметилпропан (неопентан)	-9,56	-12,72	-15,00	-16,67	-17,95	-18,94
C ₆ H ₆ (г.) бензол	-17,17	-15,91	-15,03	-14,34	-13,80	-13,35
C ₆ H ₁₂ (г.) циклогексан	-14,86	-17,33	-19,09	-20,37	-21,31	-22,00
C ₆ H ₁₄ (г.) гексан	-12,36	-15,61	-17,96	-19,70	-21,02	-22,04

Вещество	Температура, К					
	500	600	700	800	900	1000
C_6H_6 (г.) толуол	-18,25	-17,62	-17,17	-16,81	-16,51	-16,24
C_7H_{10} (г.) гептан	-15,34	-19,00	-21,63	-23,58	-25,06	-26,20
C_8H_6 (г.) этилбензол (фенилацетилен)	-40,50	-34,96	-31,00	-28,02	-25,67	-23,78
C_8H_8 (г.) фенилэтилен (стирол)	-27,41	-25,06	-23,39	-22,12	-21,11	-20,27
C_8H_{10} (г.) этилбензол	-21,25	-21,01	-20,85	-20,71	-20,57	-20,43
C_8H_{10} (г.) о-ксилол	-20,51	-20,46	-20,44	-20,41	-20,36	-20,29
C_8H_{10} (г.) м-ксилол	-20,11	-20,10	-20,10	-20,09	-20,05	-20,00
C_8H_{10} (г.) п-ксилол	-20,45	-20,44	-20,44	-20,43	-20,40	-20,34
C_8H_{18} (г.) октан	-18,35	-22,41	-25,33	-27,49	-29,13	-30,39
$C_{10}H_8$ (г.) нафталин	-28,92	-26,54	-24,84	-23,53	-22,49	-21,63
$C_{11}H_8$ (г.) азулен	-42,29	-37,67	-34,37	-31,87	-29,90	-28,29
$C_{12}H_{10}$ (г.) дифенил	-36,70	-33,82	-31,76	-30,18	-28,91	-27,86

Кислородсодержащие соединения

CH_2O (г.) формальдегид	10,96	8,87	7,37	6,24	5,36	4,66
CH_2O_2 (г.) муравьиная кислота	34,70	28,05	23,30	19,75	11,98	14,78
CH_4O (г.) метанол	14,03	10,4	7,80	5,84	4,32	3,1
C_2H_4O (г.) ацетальдегид	11,35	8,34	6,18	4,56	3,30	2,30
C_2H_4O (г.) этиленоксид	-1,65	-2,72	-3,44	-4,00	-4,43	-4,76
$C_2H_4O_2$ (г.) уксусная кислота	35,04	27,35	21,86	17,75	14,56	12,02
C_2H_6O (г.) этанол	12,54	8,28	5,23	2,94	1,17	-0,23
C_3H_8O (г.) диметиловый эфир	6,48	3,11	0,68	-1,14	-2,55	-3,66
$C_2H_6O_2$ (г.) этиленгликоль	25,62	18,74	13,82	10,14	7,29	5,02
C_3H_6O (г.) ацетон	11,14	7,17	4,32	2,18	0,52	-0,79
C_3H_8O (г.) 1-пропанол	9,98	5,28	1,90	-0,63	-2,58	-4,12
C_3H_8O (г.) 2-пропанол	10,79	5,84	2,30	-0,35	-2,39	-4,00
$C_4H_{10}O$ (г.) диэтиловый эфир	3,17	-1,48	-4,82	-7,31	-9,23	-10,74
$C_4H_{10}O$ (г.) бутанол	6,55	1,30	-2,11	-4,81	-6,89	-8,53
$C_5H_{12}O$ (г.) амиловый спирт	4,34	-1,47	-5,20	-8,17	-10,45	-12,24

Вещество	Температура, К					
	500	600	700	800	900	1000
Галогенсодержащие соединения						
CCl_4 (г.) тетрахлоорметан	3,10	1,36	0,113	-0,820	-1,54	-2,12
CF_4 (г.) тетрафторметан	89,66	73,42	61,82	53,12	46,36	40,95
$CHCl_3$ (г.) трихлоорметан (хлоороформ)	4,85	3,09	1,83	0,893	0,367	-0,422
CHF_3 (г.) трифторметан	66,84	54,70	46,03	39,53	34,47	30,43
CH_2Cl_2 дихлоорметан	5,21	3,49	2,25	1,33	0,623	0,061
CH_2F_2 (г.) дифторметан	42,35	34,38	28,68	24,40	21,09	18,44
CH_3Cl (г.) хлоорметан	4,76	3,16	2,01	1,15	0,480	-0,046
CH_3F (г.) фторметан	21,44	17,04	13,88	11,51	9,67	8,20
C_2H_5Cl (г.) хлорэтан	2,62	0,678	-0,707	-1,75	-2,55	-3,20
C_2H_5F (г.) фторэтан	18,23	13,68	10,43	7,99	6,10	4,59
C_6H_5Cl (г.) хлорбензол	-13,70	-12,79	-12,15	-11,66	-11,28	-10,97
$C_6H_5F_3$ (г.) фенилтрифторметан	46,75	36,08	28,45	22,74	18,33	14,81

Азотсодержащие соединения

CH_3N_2 (г.) диазометан	-24,62	-21,32	-18,96	-17,18	-15,80	-14,68
CH_3NO_2 (г.) нитрометан	-4,25	-5,65	-6,66	-7,40	-8,03	-8,40
CH_5N (г.) метиламин	-7,50	-8,04	-8,44	-8,73	-8,96	-9,12
CH_6N_2 (г.) метилгидразин	-25,36	-24,01	-23,04	-22,31	-21,71	-21,21
C_2H_7N (г.) диметиламин	-13,56	-14,08	-14,45	-14,72	-14,92	-15,06
C_3H_5N (г.) акрилонитрил	-21,27	-18,12	-15,89	-14,21	-12,89	-11,83
C_3H_9N (г.) триметиламин	-19,40	-20,04	-20,50	-20,83	-21,06	-21,22
C_5H_5N (г.) пиридин	-23,70	-21,42	-19,79	-18,54	-17,55	-16,74
C_6H_7N (г.) анилин	-23,39	-22,06	-21,10	-20,36	-19,77	-19,27

50. Приведенная энергия Гиббса, приращение энтальпии и веществ в состоянии

Приведенная энергия Гиббса $\Phi_T = -\frac{G_T^\circ - H_0^\circ}{T}$, приращение энтальпии $H_T^\circ - H_0^\circ$ в кДж/моль:

$$\Delta H_T^\circ = \Delta H_0^\circ + \Delta (H_T^\circ - H_0^\circ);$$

В отдельной таблице приведены функции Φ_T некоторых веществ от 2000 до 5000 К.

Вещество	$\Phi_T = -\frac{G_T^\circ - H_0^\circ}{T}$ [Дж/(К·моль)] при T , К						
	298	500	600	700	800	900	1000
Простые							
Br	154,13	164,88	168,66	171,79	174,65	177,08	179,30
Br ₂	212,76	230,07	236,33	241,68	246,45	250,50	254,40
C (графит)	2,20	4,85	6,24	7,62	8,99	10,34	11,64
Cl	144,05	155,06	159,02	162,48	165,32	168,02	170,24
Cl ₂	192,20	208,57	214,55	219,68	224,22	228,19	231,94
F	136,78	148,16	152,19	155,68	158,53	161,10	163,41
F ₂	173,08	188,71	194,40	199,42	203,65	207,59	211,05
D	102,46	113,16	116,99	120,26	122,97	125,48	127,61
D ₂	116,12	130,92	136,28	140,82	144,63	148,06	151,22
H	93,82	104,57	108,35	111,62	114,34	116,84	118,98
H ₂	102,17	116,92	122,19	126,52	130,48	133,80	136,96
I	159,89	170,64	174,43	177,65	180,41	182,86	185,05
I ₂	226,65	244,57	251,01	256,60	261,34	265,62	269,45
N ₂	162,42	177,47	182,79	187,34	191,27	194,70	197,93
O	138,39	149,92	153,97	157,34	160,26	162,77	165,09
O ₂	175,92	191,06	196,46	201,00	205,16	208,75	212,08
P ₂	188,17	203,95	209,75	214,72	219,09	223,00	226,53
S	145,40	157,00	161,20	164,70	167,70	170,35	172,70
S ₂	198,00	214,35	219,62	224,64	229,08	234,00	236,60
Неорганические							
CO	168,47	183,53	188,88	193,39	197,37	200,91	204,08
CO ₂	182,26	199,44	206,02	211,92	217,16	222,00	226,41
COCl ₂	240,40	264,85	274,45	283,00	290,83	297,80	304,40
COS	198,17	216,69	223,75	230,20	235,80	241,00	245,75
CS ₂	202,02	221,89	229,56	236,40	242,49	248,00	253,10
HF	169,58	184,61	189,90	194,40	198,36	201,80	204,98
HCl	157,81	172,82	178,14	182,65	186,52	190,00	193,11
HF	144,82	159,78	165,04	169,50	173,42	176,80	179,93
HI	177,45	192,48	197,80	202,30	206,30	209,80	213,00
H ₂ O	155,50	172,77	178,93	184,20	188,84	192,90	196,74
H ₂ S	172,30	189,77	196,07	201,50	206,35	210,60	214,65
NH ₃	158,98	176,82	183,30	189,30	194,46	199,25	203,65
NO	179,82	195,63	201,23	205,95	210,07	213,70	217,00
NO ₂	205,81	224,12	230,85	236,85	242,25	247,18	251,70
SO ₂	212,71	231,76	238,95	245,25	250,87	256,00	260,67
SO ₃	217,40	239,30	248,20	256,00	263,50	270,00	276,25

* Из Br₂ (ж.).
 ** Из I₂ (кр.).
 *** Из P (бел., кр.).
 **** Из S (ромб.).

стандартная теплота образования (при $T = 0$ К) некоторых идеального газа

и теплота образования $\Delta H_{f,0}^\circ$ служат для вычисления тепловых эффектов и констант равновесия:

$$\ln K_{a,T} = -\frac{1}{R} \left[\Delta \left(\frac{G_T^\circ - H_0^\circ}{T} \right) + \frac{\Delta H_0^\circ}{T} \right]$$

$H_T^\circ - H_0^\circ$ (кДж/моль) при T , К							$\Delta H_{f,0}^\circ$ кДж/моль
298	500	600	700	800	900	1000	
вещества							
6,20	10,40	12,48	14,56	16,66	18,77	20,89	117,94 *
9,72	17,13	20,84	24,58	28,32	32,08	35,84	45,70 *
1,05	3,45	5,03	6,80	8,70	10,70	12,83	0
6,27	10,80	13,08	15,34	17,61	19,85	22,09	119,66
9,18	16,31	19,92	23,60	27,30	31,00	34,74	0
6,52	11,03	13,24	15,41	17,57	19,71	21,84	77,28
8,82	15,50	18,96	22,52	26,14	29,80	33,50	0
6,20	10,39	12,47	14,55	16,63	18,71	20,79	219,75
8,57	14,45	17,40	20,39	23,40	26,49	29,60	0
6,20	10,39	12,47	14,55	16,63	18,71	20,79	216,03
8,47	14,38	17,30	20,22	23,18	26,16	29,16	0
6,20	10,39	12,47	14,55	16,63	18,71	20,79	107,16 **
10,12	17,64	21,38	25,15	28,91	32,70	36,50	65,51 **
8,67	14,60	17,56	20,62	23,72	26,90	30,13	0
6,73	11,06	13,19	15,29	17,40	19,49	21,59	246,80
8,68	14,80	17,92	21,20	24,52	27,94	31,39	0
8,90	15,70	19,19	22,79	26,38	30,05	33,71	145,64 **
6,66	11,34	13,60	15,81	18,01	20,17	22,33	276,56 **
8,96	15,90	19,40	23,00	26,70	30,40	34,00	128,23 **
и вещества							
8,67	14,62	17,61	20,71	23,84	27,10	30,35	-113,81
9,37	17,70	22,27	27,10	32,17	37,30	42,76	-393,15
12,87	25,75	32,65	40,00	47,30	55,00	62,55	-217,81
9,93	19,10	24,15	29,20	34,70	40,00	45,85	-141,83
10,66	20,60	25,94	31,45	37,12	42,85	48,74	115,91
8,65	14,56	17,52	20,55	23,61	26,75	29,94	-28,54 *
8,64	14,53	17,47	20,46	23,48	26,56	29,69	-92,13
8,60	14,48	17,41	20,34	23,28	26,25	29,25	-273,26
8,66	14,60	17,59	20,65	23,80	27,00	30,31	27,00 **
9,91	16,80	20,41	24,10	27,93	31,90	35,95	-238,91
9,96	17,15	20,98	25,00	29,17	33,52	38,05	-17,68 **
10,04	17,85	22,20	26,80	31,80	37,00	42,60	-39,22
9,18	15,25	18,33	21,45	24,74	28,00	31,41	90,15
10,21	18,30	22,85	27,55	32,55	37,50	42,85	36,50
10,55	19,30	24,09	29,00	34,25	39,40	44,95	-294,36 **
11,74	23,30	29,85	36,70	44,05	51,22	59,00	-391,44 **

Вещество	$\Phi_T = -\frac{G_T^\circ - H_0^\circ}{T}$ [Дж/(К·моль)] при T , К						
	298	500	600	700	800	900	1000

Органические

Угле

CH_4 метан	152,60	170,60	177,46	183,63	189,26	194,55	199,31
C_2H_2 ацетилен	167,23	186,25	193,77	200,55	206,69	212,35	217,56
C_2H_4 этилен	184,00	204,02	212,18	219,73	226,79	233,45	239,77
C_3H_6 этан	189,37	212,45	222,12	231,18	239,70	247,80	255,66
C_3H_4 пропадиен (аллен)	201,56	226,30	236,66	246,28	255,22	263,71	271,72
C_3H_6 пропиен	221,47	248,22	259,63	270,36	280,51	290,22	299,45
C_3H_8 пропан	220,58	250,31	263,36	275,79	287,65	299,02	309,98
C_4H_8 1,2-бутадиен	238,90	271,15	284,96	297,90	310,14	321,71	332,79
C_4H_6 1,3-бутадиен (дивинил)	227,81	258,94	272,74	285,74	298,10	309,83	321,01
C_4H_8 1-бутен	247,84	282,53	297,67	311,99	325,60	338,62	351,11
C_4H_8 2-бутен, <i>цис</i> -	244,91	278,06	292,44	306,12	319,13	331,65	343,71
C_4H_8 2-бутен, <i>транс</i> -	237,63	272,84	288,09	302,45	316,07	329,09	341,54
C_4H_{10} 2-метилпропан	236,26	271,06	286,33	300,75	314,50	327,59	340,15
C_4H_{10} бутан	244,88	284,14	301,32	317,64	333,19	348,06	362,40
C_4H_{10} изобутан	234,58	271,74	288,50	304,49	319,84	334,59	348,84
C_5H_8 2-метил-1,3-бутадиен (изопрен)	252,83	292,07	309,68	326,41	342,33	357,49	371,95
C_5H_{10} циклопентан	242,33	274,65	290,12	305,39	320,42	335,19	349,62
C_5H_{12} пентан	269,88	317,74	338,80	358,83	377,91	396,21	413,76
C_5H_{12} 2-метилбутан (изопентан)	269,22	315,10	335,70	355,38	374,26	392,45	409,33
C_5H_{12} 2,2-диметилпропан (неопентан)	235,74	280,54	301,14	320,98	340,04	358,41	376,14
C_6H_6 бензол	221,43	252,08	266,56	280,64	294,34	310,57	320,41
C_6H_{12} циклогексан	238,72	277,84	296,92	315,97	334,74	353,22	371,38
C_6H_{14} гексан	295,39	351,90	376,86	400,59	423,22	444,94	465,76
C_7H_8 толуол	260,18	298,90	317,07	334,77	351,95	368,59	384,69
C_7H_{16} гептан	320,94	386,10	414,95	442,40	468,57	493,71	517,83
C_8H_8 фенилэтилен (стирол)	275,08	319,87	340,66	360,71	380,03	398,62	416,50
C_8H_{10} этилбензол	285,52	333,26	355,50	376,98	397,74	417,82	437,16
C_8H_{10} <i>m</i> -ксилол	282,48	330,08	352,10	373,35	393,87	413,68	432,81
C_8H_{10} <i>o</i> -ксилол	274,43	323,83	346,46	368,22	389,15	409,30	428,71
C_8H_{10} <i>p</i> -ксилол	277,16	324,65	346,55	367,73	388,12	407,84	426,86
C_8H_{18} октан	345,82	419,63	452,38	483,54	513,25	541,77	569,16

Кислородсодержащие

CH_2O формальдегид	185,14	203,05	209,73	215,68	221,07	226,02	230,64
CH_2O_2 муравьиная кислота	212,25	232,73	240,95	248,40	255,32	261,72	267,78
CH_3O метанол	201,34	222,37	230,61	238,11	245,04	251,52	257,65
$\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$ этиленоксид	205,96	227,18	236,20	244,73	252,82	260,56	267,92
$\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$ ацетальдегид	221,00	245,46	255,39	264,58	273,11	281,17	288,79

$H_T^\circ - H_0^\circ$ (кДж/моль) при T , К							$\Delta H_{f,0}^\circ$ (кДж/моль)
298	500	600	700	800	900	1000	

соединения

водороды

10,03	18,27	23,25	28,77	34,88	41,45	48,52	-66,89
10,01	20,05	25,66	31,52	37,67	44,03	50,59	227,31
10,56	21,44	28,17	35,71	43,86	52,57	61,81	60,78
11,95	25,17	33,58	43,00	53,37	64,58	76,51	-69,11
12,62	27,10	35,84	45,46	55,76	66,68	78,18	199,60
13,54	29,65	39,77	51,07	63,46	76,72	90,78	35,43
14,69	33,64	45,78	59,42	74,35	90,42	107,45	-81,51
16,12	35,91	48,09	61,56	76,12	91,64	108,00	175,70
15,17	35,95	48,18	62,07	77,01	92,87	109,48	124,60
17,20	39,09	52,94	68,42	85,28	103,32	122,44	20,75
16,66	37,16	50,38	65,36	81,76	99,50	118,29	14,43
17,53	39,45	51,92	68,49	85,23	103,18	122,17	9,38
17,08	39,42	53,36	68,88	85,78	103,86	122,98	4,10
19,44	44,38	60,19	77,97	97,39	118,27	140,40	-99,04
17,89	42,91	58,89	76,80	96,34	117,30	139,52	-105,86
18,71	45,36	61,81	79,88	99,34	120,00	141,64	96,15
15,06	38,91	55,39	74,39	95,43	118,28	142,63	-44,70
23,55	54,30	73,84	95,68	119,61	145,22	172,42	-113,92
22,15	52,82	72,44	94,45	118,51	144,32	171,73	-120,55
21,05	52,60	72,76	95,32	119,83	146,07	173,81	-130,96
14,23	36,66	51,43	68,08	86,28	105,69	126,24	100,41
17,73	47,85	68,69	92,71	119,44	148,44	179,32	-83,75
27,71	64,28	87,50	113,48	141,85	172,27	204,48	-129,31
18,02	46,09	64,59	85,47	108,27	132,70	158,60	73,21
31,86	74,29	101,19	131,27	164,12	199,30	236,54	-144,53
20,86	52,99	73,54	96,46	121,28	147,72	175,54	168,78
22,32	56,50	78,68	103,57	130,64	159,64	190,22	58,22
22,40	56,04	77,80	102,31	129,09	157,79	188,09	45,59
23,33	57,81	79,81	104,50	131,40	160,15	190,56	46,42
22,42	55,81	77,44	101,79	128,44	157,02	187,27	46,28
36,02	84,62	114,85	149,07	186,35	226,35	268,61	-159,84

соединения

10,02	17,97	22,57	27,59	33,03	38,81	44,87	-112,06
10,87	21,71	28,11	35,10	42,58	50,41	58,61	-371,47
11,43	21,85	28,17	35,24	42,89	51,14	59,84	-190,10
10,86	23,45	31,57	40,65	50,57	61,19	72,41	-40,11
12,87	26,13	34,29	43,29	53,08	63,50	74,54	-155,49

Вещество	$\Phi_T = -\frac{G_T^\circ - H_0^\circ}{T}$ [Дж/(К·моль)] при T , К						
	298	500	600	700	800	900	1000
$C_2H_4O_2$ уксусная кислота	236,43	263,68	275,23	286,00	296,14	305,71	314,76
C_2H_6O этанол	234,97	262,71	274,42	285,39	295,65	305,45	314,76
C_2H_6O диметиловый эфир	219,10	246,90	258,52	269,38	279,54	289,22	298,42
C_3H_6O ацетон	240,30	272,05	285,42	297,93	309,69	320,87	331,54
C_3H_8O 1-пропанол	264,17	300,02	315,36	329,80	343,44	356,45	368,92
C_3H_8O 2-пропанол	252,18	287,19	302,62	317,19	331,05	344,32	356,98
$C_4H_{10}O$ бутанол	288,59	333,09	352,33	370,48	387,70	404,09	419,82
C_6H_6O фенол	256,75	294,51	312,02	328,89	345,11	360,64	375,51

Галогенсодержащие

CCl_4 тетрахлорметан	252,29	285,75	299,18	311,25	322,06	331,98	341,05
$CHCl_3$ трихлорметан (хлороформ)	248,04	275,36	286,36	296,27	305,28	313,57	321,25
CH_2Cl_2 дихлорметан	230,50	253,09	262,14	270,36	277,91	284,91	291,42
CH_3Cl хлорметан	199,51	218,79	226,40	233,28	239,65	245,58	251,17

Температура

Вещество	$\Phi_T = -\frac{G_T^\circ - H_0^\circ}{T}$ [Дж/(моль·К)]		
	2000 К	3000 К	5000 К
Br	193,98	202,80	214,06
Br ₂	279,67	294,80	314,53
C	22,50	30,17	41,60
Cl	185,51	194,34	205,33
Cl ₂	256,57	271,64	291,18
F	178,41	187,07	197,88
F ₂	233,15	250,17	270,02
H	133,38	141,81	152,43
H ₂	157,60	170,38	187,59
I	199,48	208,00	218,96
I ₂	295,11	310,39	330,34
N ₂	219,56	233,00	250,66
O	179,92	188,50	199,28
O ₂	234,32	248,81	267,60
S ₂	261,00	276,44	296,24
CH ₄	239,00	268,29	310,67

	$H_T^\circ - H_0^\circ$ (кДж/моль) при T , К							$\Delta H_{f,0}^\circ$ кДж/моль
	298	500	600	700	800	900	1000	
	13,72	30,12	40,12	51,12	62,97	75,43	88,53	-420,84
	14,18	30,50	40,66	51,92	64,18	77,27	91,08	-217,13
	14,29	30,40	40,27	51,36	63,45	76,46	90,23	-166,49
	16,27	34,85	46,39	59,32	73,38	88,49	104,47	-200,94
	18,06	39,86	53,50	68,69	85,26	102,95	121,74	-234,22
	17,20	39,79	53,94	69,63	86,70	104,85	123,98	-248,42
	22,22	49,83	67,16	86,49	107,49	130,00	153,81	-245,76
	17,53	44,73	61,92	81,00	101,50	123,26	146,02	-77,84

соединения

	17,23	35,72	45,64	55,85	66,22	76,77	87,40	-98,24
	14,18	29,16	37,48	46,23	55,27	64,56	74,01	-98,22
	11,85	24,02	31,00	38,49	46,40	54,68	63,26	-85,61
	10,41	20,16	25,97	32,38	39,28	46,60	54,34	-72,85

2000 — 5000 К

Вещество	$\Phi_T = -\frac{G_T^\circ - H_0^\circ}{T}$ [Дж/(моль·К)]		
	2000 К	3000 К	5000 К
CO	225,91	239,45	257,24
CO ₂	258,76	279,96	308,54
COCl ₂	351,00	380,63	419,72
CS ₂	289,10	311,83	341,72
HBr	226,50	239,92	257,78
HCl	214,35	227,57	245,19
HF	200,61	213,38	230,42
HI	234,82	248,44	266,53
H ₂ O	223,39	241,10	266,03
H ₂ S	243,26	262,35	288,87
NH ₃	237,03	260,66	294,97
NO	239,50	253,25	271,27
NO ₂	283,80	305,39	334,44
SO ₂	293,97	315,24	343,53
SO ₃	320,90	350,60	389,15

51. Эмпирические данные и зависимости для вычисления термодинамических величин

Теплоемкость

Твердые и жидкие вещества: $C_p = \sum C_i n_i$ [Дж/(моль·К)], где C_i — атомная теплоемкость; n_i — число атомов в молекуле.

Теплоемкость	Элементы					
	C	H	N	B	Be	O
C_i твердых веществ, Дж/(моль·К)	7,53	9,62	11,30	11,72	15,90	16,74
C_i жидких веществ, Дж/(моль·К)	11,72	17,99	—	19,66	—	25,10

Теплоемкость	Элементы				
	Si	F	S	P	остальные элементы
C_i твердых веществ, Дж/(моль·К)	20,08	20,92	22,59	23,01	25,94—26,78
C_i жидких веществ, Дж/(моль·К)	24,27	29,29	30,96	29,29	33,47

Сплавы, шлаки, стекла, растворы: $c = \frac{g_1 c_1 + g_2 c_2 + \dots}{100}$ [Дж/(г·К)], где g_i ,

g_2 — массовые доли компонентов, %; c_1, c_2 — их удельная теплоемкость.

Примечание. При значительной теплоте смешения (растворения) получаются повышенные результаты.

Теплота сгорания органических соединений в газообразном состоянии

$$\Delta H_{\text{сгор}} = -(204,2n + 44,4m + \sum x) \text{ [кДж/моль]}$$

где n — число атомов кислорода, необходимое для полного сгорания вещества; m — число молей образующейся воды; x — поправка (термическая характеристика), постоянная в пределах гомологического ряда.

Численные значения термической характеристики

Группы атомов или типы связей	x , кДж/моль
Ординарная связь	C—C 0
Двойная связь	C=C 87,9
Тройная связь	C≡C 213,4
Фенильная группа	R—C ₆ H ₅ 100,4
Спиртовая группа	R—CH ₂ OH 50,2
Простые эфиры	R—O—R 87,9
Альдегидная группа	R—CHO 75,3
Кетогруппа	R—CO—R 50,2
Кислотная группа в одноосновной кислоте	R—COOH 0
Кислотные группы в двухосновной кислоте	HOOC—R—COOH 12,6
Алкилциклогексаны	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C}-\text{CH}_2 \\ \quad \quad \\ \text{R}-\text{HC} \quad \quad \text{CH}_2 \\ \quad \quad \\ \text{H}_2\text{C}-\text{CH}_2 \end{array}$ 0
Алкилциклопентаны	$\begin{array}{c} \text{H}_2\text{C} \quad \quad \text{CH}_2 \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{R}-\text{HC} \quad \quad \text{CH}_2 \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{H}_2\text{C} \end{array}$ 25,1


Пример. Вычисление теплоты сгорания газообразного коричневого альдегида C₆H₅CH=CHCHO.

Термическая характеристика коричневого альдегида складывается из следующих значений:

Фенильная группа	100,4
Двойная связь	87,9
Альдегидная группа	75,3

$$x = 263,6 \text{ кДж/моль}$$

Реакция сгорания:



$$n = 21; m = 4.$$

$$\Delta H_{\text{сгор}} = -(204,2 \cdot 21 + 44,4 \cdot 4 + 263,6) = -4729,4 \text{ кДж/моль}$$

По литературным данным, $\Delta H_{\text{сгор}} = -4727,9 \text{ кДж/моль}$.

Теплота испарения неполярных жидкостей при нормальной температуре кипения

$$\frac{\Delta H_{\text{исп}}}{T_{\text{кип}}} = 36,61 + 19,14 \lg T_{\text{кип}} \text{ Дж/(моль·К)}$$

$$\frac{\Delta H_{\text{исп}}}{T_{\text{кип}}} \approx 89,12 \text{ Дж/(моль·К)}$$

Теплота плавления

$$\text{Простые вещества: } \frac{\Delta H_{\text{плавл}}}{T_{\text{плавл}}} = 10,5 \pm 2,1 \text{ Дж/(моль·К)}.$$

$$\text{Неорганические вещества: } \frac{\Delta H_{\text{плавл}}}{T_{\text{плавл}}} \approx 25,1 \pm 4,2 \text{ Дж/(моль·К)}.$$

$$\text{Органические вещества: } \frac{\Delta H_{\text{плавл}}}{T_{\text{плавл}}} = 54,4 \pm 12,6 \text{ Дж/(моль·К)}.$$

Энтропия

Твердые неорганические вещества: $S_{298}^\circ = A \lg M + B$, где M — относительная молекулярная масса; A и B — константы, характерные для каждого типа соединений. Каждому типу окислов (ЭО, Э₂О₃, ЭО₂ и т. п.) отвечают свои значения A и B , которые определяют по известным энтропиям двух веществ данного типа.

Константы A и B , Дж/(моль·К), для некоторых типов соединений

Здесь Э — металл, X — галоген.

Тип соединения	A	B	Тип соединения	A	-B
Э ₂ O	87,45	-87,45	ЭX	62,76	-38,07
ЭО	60,67	-70,71	ЭX ₂	136,82	-185,35
Э ₂ O ₃	138,49	-227,61	ЭXO ₃	35,98	68,20
ЭО ₂	64,02	-68,62	ЭS	69,87	-73,22
Э ₂ O ₅	133,05	-209,20	ЭNO ₃	90,79	-60,67

$$\lg S_{298}^{\circ} = A \lg M + \lg B \text{ или } S_{298}^{\circ} = BM^A \text{ [Дж/(моль} \cdot \text{К)]}$$

где M — относительная молекулярная масса; A и B — константы, определяемые в основном числом атомов в молекуле.

Зависимость постоянных A и B от числа атомов в молекуле

Молекулы газов	A	B	$\lg B$	Молекулы газов	A	B	$\lg B$
Двухатомные	0,136	124,68	2,096	Пятиатомные	0,213	102,51	2,011
Трехатомные	0,211	101,67	2,007	Шестиатомные	0,294	82,42	1,916
Четырехатомные	0,221	101,25	2,005				

Твердые нормальные парафины: $S_{298}^{\circ} = 75,31 \pm 24,27n$ [Дж/(моль·К)], где n — число атомов углерода в молекуле.

Жидкие парафины (в том числе с разветвленной цепью), циклические и ароматические углеводороды (в том числе с боковыми цепями):

$$S_{298}^{\circ} = 104,60 + 32,22n - 18,83(r-2) + 81,59p_1 + 110,88p_2 \text{ [Дж/(моль} \cdot \text{К)]}$$

где n — число углеродных атомов вне кольца; p_1 — число фенильных групп; p_2 — число насыщенных колец (циклопентана или циклогексана); r — число разветвлений на прямой цепи или число углеводородных групп (алифатических, ароматических или циклических), присоединенных к какому-либо углеродному атому алифатической цепи.

Примеры. Трифенилметан: $n = 1$, $r = 3$, $p_1 = 3$; трет-бутилбензол: $n = 4$, $r = 4$, $p_1 = 1$.

Газообразные нормальные парафины: $S_{298}^{\circ} = 142,3 + 41,8n$ [Дж/(моль·К)], где n — число атомов углерода в молекуле.

Твердые органические вещества: $S_{298}^{\circ} = 1,1C_p$ [Дж/(моль·К)], где C_p — молярная теплоемкость.

Жидкие органические вещества: $S_{298}^{\circ} = 1,4C_p$ [Дж/(моль·К)], где C_p — молярная теплоемкость.

Ионы одноатомные в водных растворах:

$$S_{298}^{\circ} = 28,7 \lg A - \frac{1130z}{(r+x)^2} + 155 \text{ [Дж/(моль} \cdot \text{К)]}$$

где A — атомная масса; z — заряд иона; r — радиус иона в кристаллическом веществе (табл. 123), Å; x принят равным 2,0 для положительных и 1,0 для отрицательных ионов.

Приближенное вычисление стандартной теплоты образования, теплоемкости и энтропии органических веществ в состоянии идеального газа см. в предыдущих изданиях справочника (теплоту образования можно вычислить из теплоты сгорания).

52. Вязкость газов при 25 °С и атмосферном давлении

Вещество	$\eta \cdot 10^7$, Па·с	Вещество	$\eta \cdot 10^7$, Па·с
Азот	177,8	Кислород	205,2
Аммиак	102,5	Метан	110,8
Воздух	184,0	Оксид углерода	176,5
Водяной пар	97,5	Сернистый газ	127,0
Диоксид углерода	148,6	Хлор	136,0

53. Вязкость воды в интервале 5—100 °С

t , °С	η_0 , мПа·с	$x = \lg \eta_0$	t , °С	η_0 , мПа·с	$x = \lg \eta_0$
5	1,5193	0,182	55	0,5044	−0,297
10	1,3073	0,116	60	0,4670	−0,331
15	1,1383	0,056	65	0,4339	−0,363
20	1,0020	0,001	70	0,4046	−0,393
25	0,8902	−0,050	75	0,3785	−0,422
30	0,7973	−0,098	80	0,3551	−0,450
35	0,7191	−0,143	85	0,3341	−0,476
40	0,6527	−0,185	90	0,3150	−0,502
45	0,5961	−0,225	95	0,2978	−0,526
50	0,5471	−0,262	100	0,2821	−0,550

54. Вязкость жидкостей в интервале 0—60 °C

Вещество	η · 10 ³ , Па·с, при температуре, °C						
	0	10	20	25	30	40	50
Аллиловый спирт C ₃ H ₇ O	2,145	1,703	1,363	(1,200)	1,070	0,914	0,767
Анилин C ₆ H ₇ N	10,20	6,46	4,40	(3,77)	3,20	2,35	1,821
Ацетон C ₃ H ₆ O	0,397	0,361	0,325	(0,310)	0,296	0,271	0,249
Ацетонитрил C ₃ H ₃ N	0,442	0,396	0,357	(0,345)	0,325	—	—
Ацетофенон C ₈ H ₈ O	—	2,30	1,84	1,67	1,51	1,38	1,24
Бензиловый спирт C ₇ H ₉ O	—	—	5,800	5,054	4,320	3,288	2,574
Бензол C ₆ H ₆	0,910	0,755	0,652	0,600	0,559	0,503	0,436
Бромбензол C ₆ H ₅ Br	1,520	1,310	1,130	(1,060)	0,990	0,890	0,790
1-Бутанол C ₄ H ₁₀ O	5,19	3,87	2,95	2,60	2,28	1,78	1,41
2-Бутанол C ₄ H ₁₀ O	8,30	5,65	3,95	3,35	2,88	2,12	1,61
Вода * H ₂ O	1,792	1,308	1,002	0,894	0,801	0,656	0,549
Гексан C ₆ H ₁₄	0,381	0,343	0,307	0,294	0,290	0,253	0,248
Гептан C ₇ H ₁₆	—	—	0,414	0,390	0,373	0,338	0,308
Глицерин C ₃ H ₈ O ₃	12,1 · 10 ³	3,95 · 10 ³	1,49 · 10 ³	0,95 · 10 ³	0,63 · 10 ³	330	180
1,4-Диоксан C ₄ H ₈ O ₂	—	—	1,255	1,196	1,063	0,917	0,778
Диэтиловый эфир C ₄ H ₁₀ O	0,284	0,258	0,233	0,222	0,213	0,197	0,180
o-Ксилол C ₈ H ₁₀	1,108	0,939	0,809	0,756	0,708	0,625	0,557
m-Ксилол C ₈ H ₁₀	0,80	0,70	0,61	0,581	0,55	0,490	0,433
p-Ксилол C ₈ H ₁₀	—	0,74	0,64	0,605	0,57	0,51	0,456
Метанол CH ₃ O	0,817	0,690	0,597	0,547	0,510	0,450	0,396
Метилацетат C ₃ H ₆ O ₂	0,479	0,425	0,381	0,362	0,344	0,312	0,284

* При 5° C—1,519, при 15° C—1,140 Па·с.

Метилформиат C ₂ H ₄ O ₂	0,429	0,385	0,348	0,330	0,318	—	—
Муравьиная кислота CH ₃ CO ₂	—	2,262	1,804	1,160	1,460	1,290	0,890
Нитробензол C ₆ H ₅ NO ₂	3,090	2,483	2,034	(1,845)	1,682	1,438	1,251
Нитрометан CH ₃ NO ₂	0,85	0,74	0,66	0,627	0,595	0,530	0,478
Октан C ₈ H ₁₈	0,714	0,622	0,546	0,514	0,486	0,435	0,392
Пентан C ₅ H ₁₂	0,283	0,259	0,240	0,230	0,220	—	—
Пиридин C ₅ H ₅ N	1,330	1,120	0,974	0,895	0,830	0,735	0,651
1-Пропанол C ₃ H ₇ O	3,883	2,897	2,234	2,00	1,75	1,400	1,129
2-Пропанол C ₃ H ₇ O	4,60	3,26	2,39	2,05	1,77	1,33	1,03
Пропионовая кислота C ₃ H ₇ CO ₂	1,52	1,29	1,10	1,02	0,958	0,840	0,746
Сероуглерод CS ₂	0,433	0,396	0,365	(0,352)	0,341	0,319	0,297
Стирол (винилбензол) C ₈ H ₈	1,047	0,879	0,749	0,695	0,648	0,565	0,502
Тетрахлорметан CCl ₄	1,330	1,132	0,969	(0,900)	0,843	0,739	0,651
Тиофен C ₄ H ₄ S	0,871	0,753	0,658	(0,620)	0,582	0,520	0,468
Толуол C ₇ H ₈	0,770	0,667	0,584	(0,552)	0,517	0,469	(0,425)
Уксусная кислота C ₂ H ₄ O ₂	—	1,450	1,210	(1,125)	1,040	0,900	0,790
Уксусный альдегид C ₂ H ₄ O	0,276	0,253	0,225	—	—	—	—
Уксусный ангидрид C ₄ H ₆ O ₃	1,245	1,058	0,907	(0,845)	0,787	0,699	0,623
Фенилгидразин C ₆ H ₅ N ₂	—	—	0,456	(0,45)	0,443	0,404	—
Фенол C ₆ H ₆ O	—	—	11,6	8,8	7,00	4,77	3,42
Формамид CH ₃ CON	7,5	5,0	3,75	3,30	2,94	2,43	2,04
Фтортрихлорметан (фреон-11) CFCl ₃	0,540	0,480	0,440	0,420	0,405	0,375	0,355
Хлорбензол C ₆ H ₅ Cl	1,056	0,915	0,802	(0,750)	0,708	0,635	0,573
Хлороформ (трихлорметан) CHCl ₃	0,700	0,630	0,570	(0,542)	0,514	0,466	0,426
Циклогексан C ₆ H ₁₂	—	—	0,970	0,898	0,822	0,706	0,610
Этанол C ₂ H ₅ O	1,773	1,466	1,200	1,096	1,003	0,834	0,702
Этилацетат C ₄ H ₈ O ₂	0,582	0,512	0,458	0,430	0,403	0,360	0,324
Этиленгликоль C ₂ H ₆ O ₂	—	—	19,9	(16,5)	13,2	9,13	(6,65)
Этилформиат C ₃ H ₆ O ₂	0,51	0,45	0,402	0,382	0,358	0,329	0,308

55. Вязкость водных растворов в зависимости от концентрации

Растворенное вещество	t, °C	$\eta \cdot 10^4$, Па·с, при массовом содержании растворенного вещества, %									
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
HCl	20	1,16	1,36	1,70	—	—	—	—	—	—	—
HNO ₃	20	1,03	1,12	1,30	1,55	1,84	2,02	2,02	1,88	1,33	0,9
H ₂ SO ₄	20	1,12	1,38	1,82	2,48	3,58	5,52	9,65	23,2	23,1	27,8
H ₃ PO ₄	20	1,7	2,0	2,5	3,7	5,5	9,0	16,7	34	—	—
NaCl	0	2,01	2,67	—	—	—	—	—	—	—	—
NaOH	20	1,19	1,56	—	—	—	—	—	—	—	—
CH ₃ OH	0	1,86	4,48	—	—	—	—	—	—	—	—
	20	2,59	3,23	3,61	3,65	3,35	2,89	2,37	1,76	1,19	0,82
C ₂ H ₅ OH	20	1,32	1,58	1,76	1,84	1,76	1,60	1,39	1,14	0,86	0,58
	0	3,311	5,319	6,94	7,14	6,58	5,75	4,762	3,690	2,732	1,773
CH ₃ COOH	25	1,323	1,815	2,18	2,35	2,40	2,24	2,037	1,748	1,424	1,096
C ₉ H ₈ O ₃ (глицерин)	50	0,734	0,907	1,050	1,132	1,155	1,127	1,062	0,968	0,848	0,702
C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁ (сахароза)	20	1,22	1,45	1,70	1,96	2,21	2,43	2,66	2,75	2,43	1,22
	20	1,311	1,769	2,501	3,750	6,050	10,96	22,94	62,0	234,6	1499
	25	—	1,0794	1,1252	1,1744	1,2273	1,2840	1,3445	—	—	—

56. Вязкость водных растворов электролитов

Формулы для вычисления вязкости (в мПа·с) в указанном интервале температур с помощью приведенных в таблице коэффициентов:

$$\eta = \eta_0 \cdot 10^3; \quad \lg \eta = (a + bx) \cdot 10^{-3}$$

Значения η_0 и x см. в табл. 53.

Растворенное вещество	Кoeffи- циент	Коэффициенты уравнения $\lg \eta = f(x)$ при массовом содержании растворенного вещества, %								Темпера- турный интервал, °C	Макси- мальная погреш- ность, %
		5	10	15	20	25	30	35	40		
BaCl ₂	a	25	53	83	114	—	—	—	—	10—50	10
	b	—30	—55	—75	—90	—	—	—	—	—	—
CaCl ₂	a	51	115	193	287	400	535	—	—	10—60	10
	b	—38	—63	—74	—70	—50	—13	—	—	—	—
CsCl	a	—7	—14	—21	—27	—32	—35	—34	—31	15—90	5
	b	—34	—68	—102	—136	—170	—202	—232	—261	—	—
HCl	a	32	65	100	139	183	234	294	—	10—80	5
	b	—86	—160	—218	—255	—266	—246	—190	—	—	—
KCl	a	—5	—6	—3	5	18	—	—	—	10—80	5
	b	—60	—114	—161	—201	—235	—	—	—	—	—
KNO ₃	a	—10	—15	—14	—7	7	—	—	—	10—90	5
	b	—49	—89	—120	—143	—160	—	—	—	—	—
KOH	a	42	91	148	214	291	381	487	614	18—90	10
	b	—33	—59	—76	—82	—74	—47	5	89	—	—
LiCl	a	72	148	231	326	440	581	756	970	10—100	5
	b	—14	—27	—38	—44	—28	16	91	199	—	—
MgBr ₂	a	47	95	145	200	265	343	436	545	20—60	10
	b	—17	—31	—41	—45	—35	—16	8	34	—	—
MgCl ₂	a	92	193	310	450	619	823	—	—	20—60	10
	b	1	9	27	60	115	201	—	—	—	—

Растворенное вещество	Коэффициент	Коэффициенты уравнения $\lg \eta_r = f(x)$ при массовом содержании растворенного вещества, %							Температурный интервал, °C	Максимальная погрешность, %
		5	10	15	20	25	30	35	40	
MgSO ₄	a	118	261	428	618	—	—	—	—	5
NH ₄ Cl	b	11	60	147	234	—	—	—	—	5
NH ₄ NO ₃	b	—8	—13	—174	—7	3	—	—	—	5
NaCl	a	—67	—125	—24	—212	—239	—3	—	—	5
NaNO ₃	b	—12	—20	—146	—182	—214	—242	—	—	5
NaOH	a	—57	—105	—127	—192	—274	—	—	—	5
Na ₂ SO ₄	b	—29	—50	—55	—39	—5	—	—	—	5
	a	12	32	61	99	146	204	272	350	10
	b	—37	—62	—76	—80	—75	—62	—41	—13	10
	a	120	260	420	630	870	1110	—	—	20
	b	40	115	225	380	590	860	—	—	20
	a	80	176	289	420	—	—	—	—	20
	b	—15	15	80	170	—	—	—	—	20
CH ₃ COOH		10	20	30	40	50	60	70	80	
HClO ₄	a	77	147	211	270	324	373	418	420	5
HNO ₃	b	33	62	88	111	132	148	158	148	10
H ₃ PO ₄	a	2	17	56	128	259	448	653	—	10
H ₂ SO ₄	a	—69	—122	—167	—187	—167	—114	—122	—	10
	b	15	45	118	193	260	308	308	270	20
	a	—92	—150	—173	—160	—110	—50	—50	—110	20
	b	119	255	409	581	771	979	1211	1505	20
	a	50	101	154	211	275	355	495	703	20
	b	100	190	316	459	614	781	1013	1316	20
	a	0	0	0	0	0	0	166	534	20

57. Коэффициенты диффузии газов в воздухе при нормальном атмосферном давлении

Вещество	$t, ^\circ\text{C}$	$D \cdot 10^6, \text{м}^2/\text{с}$	Вещество	$t, ^\circ\text{C}$	$D \cdot 10^6, \text{м}^2/\text{с}$
Анилин	20	0,061	Муравьиная кислота	20	0,131
Бензол	20	0,077	Нафталин	96,6	0,051
Вода	8,0	0,239	Толуол	16,4	0,071
Диоксид углерода	0,0	0,139	Уксусная кислота	22,9	0,106
Диэтиловый эфир	17,1	0,078	Этанол	18,35	0,102
Метанол	14,5	0,132	Этилацетат	18,9	0,071

58. Коэффициенты самодиффузии неэлектролитов в жидкостях при нормальном атмосферном давлении

Вещество	$t, ^\circ\text{C}$	$D \cdot 10^6, \text{м}^2/\text{с}$	Вещество	$t, ^\circ\text{C}$	$D \cdot 10^6, \text{м}^2/\text{с}$
Бензол	25	2,15	Тетрахлорметан	25	1,41
	45	2,67		45	1,99
Этанол	25	1,05	Вода	25	2,43
	45	1,70		45	3,84

59. Коэффициенты диффузии электролитов в водных растворах в зависимости от температуры и состава

При $c = 0$ дано значение D° по Нернсту (из ионных электрических проводимостей). Погрешность измерений $\pm 3\%$, в редких случаях — до $\pm 10\%$.

Электролит	$D \cdot 10^6, \text{м}^2/\text{с}$, при 25 °C и концентрации c , моль/л					
	0,000	0,001	0,003	0,005	0,010	0,05
BaCl ₂	1,385	1,320	1,283	1,265	—	1,179
CaCl ₂	1,335	1,249	1,201	1,179	—	1,121
LiCl	1,366	1,345	1,331	1,323	1,312	1,28
KCl	1,993	1,964	1,945	1,934	1,917	1,864
KClO ₄	1,871	1,845	1,835	1,829	1,790	—
KNO ₃	1,928	1,899	1,879	1,866	1,846	—
MgCl ₂	1,249	1,187	1,158	—	—	—
NaCl	1,610	1,585	1,570	1,560	1,545	1,507
NaNO ₃	1,568	—	—	1,516	1,503	—
Na ₂ SO ₄	1,230	1,175	1,147	1,123	—	—
ZnSO ₄	0,846	0,748	0,724	0,705	—	—

Электродит	с, моль/л, при 25°	D · 10 ⁹ , м ² /с		Электродит	с, моль/л, при 25°	D · 10 ⁹ , м ² /с	
		25 °С	60 °С			25 °С	60 °С
LiCl	0	1,37	2,83	NH ₄ Cl	0,48	1,74	3,36
	0,10	1,28	2,36		0,96	1,64	3,25
	0,28	1,23	2,14		1,96	1,28	2,96
	0,45	1,26	2,03		2,83	1,10	2,58
	0,96	1,30	2,03		0	2,00	3,86
	1,97	1,36	2,65		0,20	1,87	3,29
NaCl	3,11	1,43	2,94		0,42	1,86	3,33
	0	1,61	3,30	NH ₄ NO ₃	1,58	1,98	3,46
	0,07	1,51	2,53		2,92	2,12	3,68
	0,22	1,48	2,09		0	1,92	3,65
	0,57	1,47	2,18		0,20	1,74	3,18
	1,08	1,48	2,52		0,50	1,71	3,04
KCl	2,10	1,52	2,94		1,00	1,68	3,01
	3,11	1,57	3,03	MgCl ₂	1,97	1,60	2,96
	0	1,99	3,92		3,00	1,58	2,82
	0,05	1,86	3,37		0	1,25	2,56
	0,26	1,83	3,17		0,20	1,06	1,80
	0,53	1,81	3,19		0,53	1,24	1,98
RbCl	1,18	1,91	3,38		1,03	1,40	2,12
	2,01	2,00	3,54	MgBr ₂	1,56	1,46	2,20
	3,11	2,11	3,38		2,31	1,44	2,20
	0	2,05	3,97		3,27	1,37	2,27
	0,01	2,02	3,13		0	1,26	2,64
	0,20	1,70	2,99		0,18	1,16	1,83
CsF	0,48	1,75	3,15	CaCl ₂	0,62	1,39	2,29
	0,96	1,85	3,48		1,02	1,46	2,39
	1,96	2,03	3,80		2,03	1,41	2,42
	2,83	2,24	3,61		2,99	1,33	2,31
	0	1,71	3,33		0	1,39	2,70
	0,04	1,49	2,95	SrCl ₂	0,18	1,12	1,77
CsCl	0,18	1,43	2,28		0,52	1,14	1,02
	0,50	1,45	2,40		1,02	1,22	2,12
	1,02	1,47	2,68		2,05	1,29	2,28
	2,04	1,51	3,08		3,01	1,27	2,16
	2,94	1,56	3,39		0	1,39	2,65
	0	2,04	3,97	BaCl ₂	0,17	1,19	2,00
CsI	0,04	2,04	2,64		0,49	1,16	1,80
	0,19	1,86	3,42		1,01	1,18	1,70
	0,39	1,86	3,37		1,91	1,21	1,72
	0,99	1,90	3,74		3,02	1,18	1,64
	1,95	2,03	4,01		0	1,35	2,64
	2,96	1,22	3,02		0,18	1,16	1,96
KNO ₃	0	2,05	3,96	MgSO ₄	0,49	1,17	1,83
	0,02	1,89	3,52		1,01	1,19	1,88
	0,17	1,93	3,26		1,55	1,18	1,90
	0,56	2,15	3,27		0	0,85	1,86
	0,94	1,98	3,33		0,20	0,58	1,11
	1,47	1,60	3,35		0,51	0,48	0,96
	1,97	1,28	3,31		1,01	0,44	0,81
	0	1,93	3,73		1,94	0,36	0,78
	0,20	1,77	3,34		2,59	0,32	0,76

60. Коэффициенты диффузии в твердых телах

Диффундирующее вещество	Диффузионная среда	D · 10 ⁴ , м ² /с	Диффундирующее вещество	Диффузионная среда	D · 10 ⁴ , м ² /с
C	α-Fe	$2 \cdot 10^{-2} e^{-\frac{10100}{T}}$	Fe	FeO	$0,118 e^{-\frac{14950}{T}}$
	γ-Fe	$1,9 \cdot 10^{-2} e^{-\frac{14200}{T}}$		Fe ₂ O ₃	$4,0 \cdot 10^{15} e^{-\frac{56400}{T}}$
Co	CoO	$2,15 \cdot 10^{-3} e^{-\frac{17360}{T}}$	Fe ₃ O ₄		$5,2 e^{-\frac{27700}{T}}$
		$3,0 e^{-\frac{30700}{T}}$			$2,2 \cdot 10^{-3} e^{-\frac{1460}{T}}$
Cu	Fe	$1,01 \cdot 10^{-3} e^{-\frac{17900}{T}}$	H ₂	α-Fe	$6,6 \cdot 10^{-3} e^{-\frac{9360}{T}}$
	Ni	$5,0 \cdot 10^{-3} e^{-\frac{3590}{T}}$		N ₂	$1,3 e^{-\frac{21140}{T}}$
Fe	PbS	$1,6 \cdot 10^{-3} e^{-\frac{46200}{T}}$	Pb	PbS	
	Cu				

61. Удельная электрическая проводимость предельно чистой воды, перегнанной в вакууме

Удельная проводимость воды, перегнанной в присутствии воздуха, $\kappa = (1-2) \cdot 10^{-4}$ См/м и возрастает с увеличением температуры на 1 °С (вблизи комнатной температуры) на 2-2,5 %.

t, °С	$\kappa \cdot 10^4$, См/м	t, °С	$\kappa \cdot 10^4$, См/м	t, °С	$\kappa \cdot 10^4$, См/м
10	2,85	25	(6,33)	34	9,62
18	4,41	26	6,70	35	(10,02)
20	(4,85)	30	(8,15)	50	18,9

62. Удельная электрическая проводимость растворов KCl в интервале 0—30 °С

Концентрация KCl, моль/л	κ , См/м, при температуре, °С						
	0	5	10	15	20	25	30
0,01	0,0776	0,0896	0,1020	0,1147	0,1278	0,1413	0,1552
0,02	0,1521	0,1752	0,1994	0,2243	0,2501	0,2765	0,3036
0,1	0,715	0,822	0,933	1,048	1,167	1,288	1,412
1,0	6,541	7,414	8,319	9,252	10,207	11,180	—

63. Молярная электрическая проводимость разбавленных водных растворов электролитов при 25 °C

$$\lambda_c = \lambda^* (1 - a \sqrt{c + bc})$$

λ_c — молярная проводимость при концентрации c , моль/л. Коэффициенты λ^* , a и b применимы в области концентраций 0,001 — 0,1 моль/л.

Молярная проводимость λ^* в таблице выражена в (См·м²)/моль.

Электролит	$\lambda^* \cdot 10^4$	a	b	Электролит	$\lambda^* \cdot 10^4$	a	
AgNO ₃	133,3	0,68	0,35	LiNO ₃	111	0,77	0,45
1/2 Ag ₂ SO ₄	142	1,30	—3,5	LiOH	236,5	0,48	0,5
1/3 AlBr ₃	139	1,64	2,2	1/2 Li ₂ SO ₄	119,2	1,48	1,4
1/3 AlCl ₃	137,6	1,65	2,0	1/2 MgBr ₂	129	1,34	2,2
1/3 AlI ₃	137,6	1,66	3,1	1/2 Mg(NO ₃) ₂	129	1,35	1,8
1/3 Al(NO ₃) ₃	129,5	1,72	2,2	1/2 MnBr ₂	128	1,34	1,7
1/2 BaBr ₂	141,1	1,28	1,78	1/2 MnCl ₂	126	1,36	1,6
1/2 Ba ₂ (COOCH ₃) ₂	104,2	1,59	1,7	NH ₄ Br	155	0,62	0,60
1/2 BaCl ₂	139,5	1,28	1,74	NH ₄ Cl	150,5	0,63	0,49
1/2 Ba(NO ₃) ₂	132	1,34	1,2	NH ₄ NCS	140,8	0,65	0,5
1/2 CaBr ₂	133	1,32	2,1	NH ₄ NO ₃	145,3	0,64	0,55
1/2 CaCl ₂	135,6	1,3	1,8	NaBr	126,0	0,70	0,5
1/2 Ca(NO ₃) ₂	130	1,35	2,0	1/2 Na ₂ CO ₃	124,1	1,47	1,6
1/2 CdCl ₂	104	1,65	0,9	NaCOOCH ₃	91,1	0,89	0,34
1/2 CdSO ₄	105	2,89	3,7	NaCl	126,5	0,70	0,74

1/2 CoCl ₂	124,5	1,37	1,2	NaClO ₃	115	0,75	0,6
1/2 Co(NO ₃) ₂	122,4	1,39	2,0	NaClO ₄	110	0,77	0,6
CsCl	154,6	0,62	—0,7	NaF	106	0,79	0,6
CsOH	271	0,45	0,5	NaI	127,0	0,70	0,80
1/2 CuCl ₂	131	1,33	1,5	NaHCO ₃	96,0	0,85	0,6
1/2 CuSO ₄	113	2,79	3,3	NaNCS	110,5	0,77	0,75
1/3 FeCl ₃	137	1,34	1,05	NaOH	246,5	0,47	0,3
HBr	429,4	0,37	0,35	1/2 Na ₂ SO ₄	129,0	1,39	1,50
HCl	426,0	0,37	0,38	1/2 NiCl ₂	123,3	1,37	1,7
HClO ₄	417	0,36	0,4	1/2 NiSO ₄	100	2,7	1,6
HI	428	0,37	0,42	1/2 PbCl ₂	145,0	1,26	—7
HIO ₃	391,2	0,38	—4,7	RbBr	148	0,63	0,2
HNCS	404	0,38	0,37	RbCl	153	0,62	0,7
HNO ₃	420	0,37	0,36	RbOH	272	0,45	0,5
KBr	151,7	0,62	0,62	1/3 SmBr ₃	140,2	1,63	2,9
KBrO ₃	129,4	0,69	0,48	1/3 SmCl ₃	139,8	1,64	3,0
KCOOCH ₃	115,4	0,75	1,3	1/3 SmI ₃	138,5	1,64	3,4
KCl	149,8	0,63	0,64	1/2 SrCl ₂	136,0	1,30	1,74
KClO ₃	138,7	0,66	0,4	1/2 Sr(NO ₃) ₂	131,8	1,34	1,5
KF	128	0,70	0,5	TiCl	150,3	0,63	—1,3
1/2 K ₃ Fe(CN) ₆	167,8	1,56	1,8	TiClO ₃	137,6	0,65	0,45
1/2 K ₄ Fe(CN) ₆	169	2,48	3,6	TiOH	218,1	0,45	0,45
KI	150,8	0,63	0,62	1/3 YCl ₃	136	1,67	3,5
KNCS	140	0,65	0,65	1/2 ZnBr ₂	159	1,23	0,7
KNO ₃	144,5	0,64	0,36	1/2 Zn(COOCH ₃) ₂	88	1,77	1,2
KOH	271	0,45	0,4	1/2 ZnCl ₂	130	1,48	2,3
1/2 K ₂ SO ₄	151,4	1,24	1,14	1/2 ZnSO ₄	105	2,90	4,2
LiBr	121,4	0,72	0,5	(CH ₃) ₄ NI	118,6	0,73	0,35
LiCl	115	0,75	0,78	(C ₂ H ₅) ₄ NI	108	0,78	—
LiI	117,7	0,74	0,8	(C ₃ H ₇) ₄ NI	100	0,83	—

64. Числа переноса катионов в водных растворах электролитов при 25 °С

Электролит	Концентрация, моль/л					
	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01	0
AgNO ₃	—	0,468	0,466	0,465	0,465	0,464
1/2CaCl ₂	0,395	0,406	0,414	0,422	0,426	0,438
HCl	0,834	0,831	0,829	0,827	0,825	0,821
KBr	0,484	0,483	0,483	0,483	0,483	0,485
KCOOCH ₃	—	0,661	0,657	0,652	0,650	0,643
KCl	0,489	0,490	0,490	0,490	0,490	0,491
KI	0,489	0,488	0,488	0,488	0,488	0,489
KNO ₃	0,512	0,510	0,509	0,509	0,508	0,507
1/2K ₂ SO ₄	0,491	0,489	0,487	0,485	0,483	0,479
1/3LaCl ₃	0,423	0,438	0,448	0,458	0,462	0,477
LiCl	0,311	0,317	0,321	0,326	0,329	0,336
NH ₄ Cl	0,491	0,491	0,490	0,491	0,491	0,491
NaCl	0,382	0,385	0,386	0,390	0,392	0,396
NaCOOCH ₃	0,561	0,559	0,557	0,555	0,554	0,551
1/2Na ₂ SO ₄	0,383	0,383	0,383	0,384	0,385	0,386
KOH	0,263	0,263	0,263	0,263	0,263	—
LiOH	0,150	0,150	—	—	—	—
NaOH	0,177	0,183	0,189	0,197	0,203	—

65. Предельная молярная электрическая проводимость ионов в воде в интервале 0—100 °С

$$\lambda_0, t = \lambda_{0,25} [1 + \alpha (t - 25)]$$

В интервале от 15 до 35 °С температурный коэффициент электрической проводимости $\alpha = \frac{1}{\lambda_{0,25}} \left(\frac{d\lambda}{dt} \right) \approx 0,02$.

Катион	$\lambda_0 \cdot 10^4$, (См·м ²)/моль, при температуре, °С					$\alpha \cdot 10^4$
	0	18	25	55	100	
Ag ⁺	63,1	53,5	61,9	—	175	1,94
1/3Al ³⁺	29	—	63	—	—	2,1
1/2Ba ²⁺	34,0	54,6	63,6	—	195	2,0
1/2Be ²⁺	—	—	45	—	—	≈2
1/2Ca ²⁺	31,2	50,7	59,5	—	180	2,1
1/2Cd ²⁺	28	45,1	54	—	—	2,0
1/2Ce ³⁺	—	—	69,6	—	—	≈2
1/2Co ²⁺	28	45	54	—	—	≈2
CNS ⁻	41,7	56,6	66,5	—	—	≈2
1/3Cr ³⁺	—	—	67	—	—	≈2
Cs ⁺	44	67	77,2	123,6	200	1,9
1/2Cu ²⁺	28	45,3	56,6	—	—	2,4
1/3Eu ³⁺	—	—	67,8	—	—	≈2
1/2Fe ²⁺	28	44,5	53,5	—	—	2,4
1/3Fe ³⁺	—	—	68,0	—	—	≈2
H ⁺	225	315	349,8	483,1	630	1,42
1/2Hg ²⁺	—	—	63,6	—	—	≈2
1/2Hg ₂ ²⁺	—	—	68,6	—	—	≈2
K ⁺	40,7	63,9	73,5	119,2	195	1,87
1/3La ³⁺	35	59,2	69,6	—	220	1,5
Li ⁺	19,4	32,8	38,5	68,7	115	2,14
1/2Mg ²⁺	28,9	44,9	53,0	—	170	2,18
1/2Mn ²⁺	27	44,5	53,5	—	—	2,5
Na ⁺	26,5	42,8	50,1	86,8	145	2,08
NH ₄ ⁺	40,2	63,9	73,5	—	180	1,87
N(CH ₃) ₄ ⁺	24,1	40,0	44,9	—	—	1,56
N(C ₂ H ₅) ₄ ⁺	16,4	28,2	32,6	—	—	1,93
N(C ₃ H ₇) ₄ ⁺	11,5	20,9	23,4	—	—	1,52
N(C ₄ H ₉) ₄ ⁺	9,6	—	19,4	—	—	≈2
N(C ₆ H ₁₁) ₄ ⁺	8,8	—	17,4	—	—	≈2
1/3Nd ³⁺	—	—	64,3	—	—	≈2
1/2Ni ²⁺	28	45	54	—	—	≈2
1/2Pb ²⁺	37,5	60,5	70	—	—	1,78
1/3Pr ³⁺	—	—	69,8	—	—	≈2
1/2Ra ²⁺	33	56,6	66,8	—	—	1,88
Rb ⁺	43,9	66,5	77,8	124,2	—	2,07
1/3Sc ³⁺	—	—	64,7	—	—	≈2

Катион	$\lambda_0 \cdot 10^4$, (См·м ²)/моль, при температуре, °С					$\alpha \cdot 10^2$
	0	18	25	55	100	
$\frac{1}{2}\text{Sm}^{3+}$	—	—	65,8	—	—	≈ 2
$\frac{1}{2}\text{Sr}^{2+}$	31	50,6	59,4	—	—	2,12
Ti^{4+}	43,3	66,0	74,7	—	—	1,76
UO_2^{2+}	—	—	32	—	—	≈ 2
$\frac{1}{2}\text{Zn}^{2+}$	28	45	54	—	—	1,85
Анион						
Br^-	42,6	68,0	78,1	127,8	—	1,85
BrO_3^-	43,1	49,0	55,8	—	155	≈ 2
Cl^-	41,0	66,0	76,35	126,4	212	1,94
ClO_2^-	—	—	52	—	—	≈ 2
ClO_3^-	36	55	64,6	—	172	2,12
ClO_4^-	36,9	58,8	67,3	—	179	2,0
CN^-	—	—	78	—	—	2
$\frac{1}{2}\text{CO}_3^{2-}$	36	60,5	69,3	—	—	1,92
$\frac{1}{2}\text{CrO}_4^{2-}$	42	72	85	—	—	2,1
F^-	—	47,3	55,4	—	—	2,1
$\frac{1}{2}\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}$	—	—	99,1	—	—	≈ 2
$\frac{1}{2}\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}$	—	—	111	—	—	≈ 2
HCO_3^-	—	—	44,5	—	—	≈ 2
$\frac{1}{2}\text{HPO}_4^{2-}$	—	—	57	—	—	≈ 2
H_2PO_4^-	—	28	36	—	—	≈ 2
HS^-	40	57	65	—	—	≈ 2
HSO_3^-	27	—	50	—	—	≈ 2
HSO_4^-	—	—	52	—	—	≈ 2
I^-	41,4	66,5	76,8	125,4	—	1,92
IO_3^-	21	33,9	41,0	—	127	2,4
IO_4^-	—	49	54,5	—	—	1,44
MnO_4^-	36	53	61,3	—	—	2,24
NO_2^-	44	59	72	—	—	2,48
NO_3^-	40,0	62,3	71,46	—	195	1,84
OH^-	105	171	198,3	—	450	1,96
$\frac{1}{2}\text{PO}_4^{3-}$	—	—	69	—	—	≈ 2
$\frac{1}{2}\text{S}^{2-}$	—	53,5	—	—	—	≈ 2
$\frac{1}{2}\text{SO}_3^{2-}$	—	—	72	—	—	≈ 2
$\frac{1}{2}\text{SO}_4^{2-}$	41	68,4	80,0	—	260	2,06
$\frac{1}{2}\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	—	—	87,4	—	—	≈ 2
$\frac{1}{2}\text{S}_2\text{O}_4^{2-}$	34	—	66,5	—	—	≈ 2
$\frac{1}{2}\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$	—	65	75,7	—	—	≈ 2
HCOO^-	—	47	54,6	—	—	≈ 2
CH_3COO^-	20,3	34	40,9	—	130	2,06
$\text{C}_2\text{H}_5\text{COO}^-$	—	—	35,8	—	—	≈ 2
$\text{C}_3\text{H}_7\text{COO}^-$	—	—	32,6	—	—	≈ 2
$\text{C}_4\text{H}_9\text{COO}^-$	—	—	28,8	—	—	≈ 2
$\text{C}_6\text{H}_5\text{COO}^-$	17	—	32,3	—	—	≈ 2
$\text{CH}_2\text{ClCOO}^-$	—	—	39,8	—	—	≈ 2
$\text{CHCl}_2\text{COO}^-$	—	—	38,3	—	—	≈ 2
CCl_3COO^-	—	—	36,6	—	—	≈ 2
$\text{CH}_2\text{CNCOO}^-$	—	—	39,8	—	—	≈ 2
HOOC-COO^- оксалат-ион	—	—	40,2	—	—	≈ 2
$\frac{1}{2}\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ оксалат-ион	32	—	74	—	—	≈ 2
$\text{C}_6\text{H}_2\text{O}_7\text{N}_3^-$ пикрат-ион	15,3	—	30,4	—	—	≈ 2

66. Электрическая проводимость растворов слабых кислот и оснований при 25 °С

Кислота	$\mu \cdot 10^4$, (См·м ²)/моль, при разведении, л/моль					
	32	64	128	256	512	1024
Дихлоруксусная CHCl_2COOH	269,8	309,9	338,4	359,2	375,4	383,8
Изомасляная $\text{изо-C}_4\text{H}_9\text{COOH}$	8,0	11,4	15,9	22,2	30,8	42,6
Масляная $\text{C}_4\text{H}_9\text{COOH}$	8,2	11,6	16,3	22,7	31,5	43,3
Муравьиная HCOOH	31,2	43,2	59,2	80,6	108,8	143
Пропионовая $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOH}$	7,8	11,1	15,5	21,7	30,1	41,3
Трихлоруксусная CCl_3COOH	344,3	354,8	363,5	371,4	377,0	379,5
Угльная H_2CO_3	(1,32)	(1,9)	—	—	—	—
Уксусная CH_3COOH	9,2	12,9	18,1	25,4	34,3	49,0
Фо.форная H_3PO_4	156	195	240	279	317	341
Хлоруксусная CH_2ClCOOH	77,2	103,2	130,1	174,8	219,4	265,7
Щавелевая $(\text{COOH})_2$	285	319	345	369	388	408
Основание	$\mu \cdot 10^4$, (См·м ²)/моль, при разведении, л/моль					
	8	16	32	64	128	256
Гидразин $\text{N}_2\text{H}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	1,4	1,7	2,1	2,7	3,8	5,5
Гидроксид аммония NH_4OH	3,4	4,8	6,7	9,5	13,5	18,2
Диметиламин $(\text{CH}_3)_2\text{NH} \cdot \text{H}_2\text{O}$	17,2	24,0	33,2	45,3	61,2	80,7
Диэтиламин $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH} \cdot \text{H}_2\text{O}$	20,4	28,8	39,7	53,8	71,8	92,7
Метиламин $\text{CH}_3\text{NH}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$	15,1	21,0	28,9	39,3	53,0	70,0
Пиперидин $\text{CH}_2(\text{CH}_2)_4\text{NH} \cdot \text{H}_2\text{O}$	23,0	32,3	44,2	59,2	77,8	99,7
Пропиламин $\text{C}_3\text{H}_7\text{NH}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$	13,2	18,7	25,6	35,4	47,8	63,8
Триметиламин $(\text{CH}_3)_3\text{N} \cdot \text{H}_2\text{O}$	—	—	—	15,4	21,4	29,4
Этиламин $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$	14,8	21,0	28,9	39,2	52,9	70,2

67. Ионное произведение воды в интервале 0—100 °C

$$K_B = a_{H^+} \cdot a_{OH^-}; \quad pK_B = -\lg K_B$$

$t, ^\circ\text{C}$	$K_B \cdot 10^{14}$	pK_B	$t, ^\circ\text{C}$	$K_B \cdot 10^{14}$	pK_B
0	0,1139	14,9435	25	1,008	13,9965
5	0,1846	14,7338	30	1,469	13,8330
10	0,290	14,5346	35	2,089	13,6801
15	0,4505	14,3463	40	2,918	13,5348
18	0,5702	14,2439	45	4,018	13,3960
20	0,6809	14,1669	50	5,474	13,2617
21	0,742	14,1296	55	7,297	13,1369
22	0,802	14,0958	60	9,614	13,0171
23	0,868	14,0615	100	59,0	12,2291
24	0,948	14,0232			

68. Значения функции кислотности при 25 °C

Согласно реакции $B + H^+ \rightarrow HB^+$ функция кислотности:

$$H_0 = pK_{HB^+} - \lg \frac{c_{HB^+}}{c_B} = -\lg \frac{a_{H^+} \cdot \gamma_B}{\gamma_{HB^+}} = -\lg h_0$$

Кислотой является H^+ , основанием — B . По определению, основание — соединение, у которого зависимость $\lg \left(\frac{c_{HB^+}}{c_B} \right)$ от H_0 — прямая с тангенсом наклона, равным единице.

Здесь m — моляльность; c — молярность; a_w — активность воды.

Массовое содержание, %	m , моль/кг раствора	c , моль/л раствора	a_w	$-H_0$	Массовое содержание, %	m , моль/кг раствора	c , моль/л раствора	a_w	$-H_0$
------------------------	------------------------	-----------------------	-------	--------	------------------------	------------------------	-----------------------	-------	--------

Соляная кислота

3	0,85	0,83	0,961	0,13	22	7,75	6,69	0,531	2,35
6	1,71	1,69	0,919	0,58	26	9,65	8,05	0,419	2,87
9	2,71	2,57	0,865	0,90	30	11,76	9,45	0,317	3,39
12	3,74	3,48	0,801	1,21	34	14,14	10,90	0,225	3,95
15	4,83	4,41	0,730	1,54	36	15,40	11,64	0,186	—
18	6,04	5,37	0,649	1,87	40	18,32	13,15	0,121	—


Серная кислота

10	1,13	1,085	0,956	0,31	60	15,31	9,16	0,160	4,46
20	2,55	2,32	0,879	1,01	70	23,81	11,48	0,050	5,80
30	4,37	3,73	0,752	1,72	80	40,82	14,07	0,005	7,34
40	6,80	5,31	0,564	2,41	90	91,84	16,65	0,0003	8,92
50	10,19	7,11	0,352	3,38	100	—	—	—	11,94

Хлорная кислота


10	1,10	1,05	0,956	0,35	50	9,95	6,98	0,330	3,52
20	2,49	2,23	0,890	0,95	60	14,92	9,13	0,110	5,25
30	4,26	3,58	0,770	1,60	70	23,20	11,60	—	7,72
40	6,63	5,15	0,580	2,40	78,6	—	—	—	10,31

69. Константы кислотности в воде при 18 °C



Кислота	Основание	K_a	Кислота	Основание	K_a
H_3O^+	H_2O	55,5	H_3BO_3	$H_2BO_3^-$	$6 \cdot 10^{-10}$
H_2O	OH^-	$1,07 \cdot 10^{-10}$	NH_4^+	NH_3	$5,5 \cdot 10^{-10}$
H_2S	HS^-	$8 \cdot 10^{-8}$	$Al(H_2O)_6^{3+}$	$Al(H_2O)_5OH^{2+}$	$1,3 \cdot 10^{-5}$
HS^-	S^{2-}	$2 \cdot 10^{-13}$	$Fe(H_2O)_6^{3+}$	$Fe(H_2O)_5OH^{2+}$	$6,3 \cdot 10^{-3}$
H_2SO_3	HSO_3^-	$1,7 \cdot 10^{-2}$	$HCOOH$	$HCOO^-$	$2,1 \cdot 10^{-4}$
HSO_3^-	SO_3^{2-}	$5 \cdot 10^{-9}$	CH_3COOH	CH_3COO^-	$1,8 \cdot 10^{-5}$
HSO_4^-	SO_4^{2-}	$2 \cdot 10^{-2}$	$CH_2ClCOOH$	CH_2ClCOO^-	$1,4 \cdot 10^{-3}$
H_3PO_4	$H_2PO_4^-$	$7,6 \cdot 10^{-3}$	$CHCl_2COOH$	$CHCl_2COO^-$	$5,5 \cdot 10^{-2}$
$H_2PO_4^-$	HPO_4^{2-}	$5,9 \cdot 10^{-8}$	$COOHCOOH$	$COOHCOO^-$	$5,7 \cdot 10^{-2}$
HPO_4^{2-}	PO_4^{3-}	$3,5 \cdot 10^{-13}$	$COOHCOO^-$	$(COO)_2^{2-}$	$6,8 \cdot 10^{-5}$
H_2CO_3	HCO_3^-	$4,3 \cdot 10^{-7}$	$CH_3NH_3^+$	CH_3NH_2	$1,6 \cdot 10^{-11}$
HCO_3^-	CO_3^{2-}	$4,7 \cdot 10^{-4}$	$(CH_3)_2NH_2^+$	$(CH_3)_2NH$	$1,2 \cdot 10^{-10}$
HCN	CN^-	$7 \cdot 10^{-10}$			

Области существования кислот и оснований в различных растворителях



70. рН стандартных растворов

Раствор	Температура, °C									
	10	20	25	30	40	50	60	70	80	90
0,05 М $\text{KH}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ (тетраоксалат калия)	1,669	1,676	1,681	1,685	1,697	1,712	1,726	1,743	1,766	1,792
Насыщенный при 25 °C раствор $(\text{CH}_3\text{O})_2(\text{COOH})\text{COOK}$ (первичный тартрат калия)	—	—	3,555	3,547	3,543	3,549	3,565	5,580	3,603	3,650
0,01 М $(\text{CH}_3\text{O})_2(\text{COOH})\text{COOK}$ (первичный тартрат калия)	3,671	3,647	3,637	3,633	3,630	3,640	3,654	—	—	—
0,05 М $\text{C}_6\text{H}_4(\text{COOH})\text{COOK}$ (первичный фталат калия)	4,001	4,001	4,005	4,011	4,030	4,059	4,097	4,12	4,16	4,20
0,01 М $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ (тетраборат натрия)	9,328	9,223	9,177	9,135	9,066	9,012	8,961	8,93	8,89	8,85
0,025 М KH_2PO_4 (первичный фосфат калия) + 0,025 М Na_2HPO_4 (вторичный фосфат натрия)	6,923	6,881	6,865	6,853	6,838	6,833	6,836	6,845	6,859	6,877
0,01 М Na_2PO_4 (третичный фосфат натрия)	—	—	11,72	—	—	—	—	—	—	—

При 25 °C рН буферных растворов:
 0,025 М NaHCO_3 (бикарбонат натрия) + 0,025 М Na_2CO_3 (карбонат натрия) — 10,02;
 0,025 М $(\text{CH}_3)_2(\text{COOH})\text{COOK}$ (первичный сукцинат натрия) + 0,025 М $(\text{CH}_3)_2(\text{COONa})_2$ (сукцинат натрия) — 5,40;
 0,01 М CH_3COOH (уксусная кислота) + 0,01 М CH_3COONa (ацетат натрия) — 4,67.

71. Осмотические коэффициенты электролитов в водных растворах при 25 °C

m, моль/кг воды	Осмотические коэффициенты, ϕ , электролитов									
	HCl	HClO ₄	NaOH	NaCl	NaClO ₄	NaBr	NaNO ₃	KCl	KNO ₃	KOH
0,1	0,943	0,947	0,925	0,932	0,930	0,934	0,921	0,927	0,906	0,933
0,2	0,945	0,951	0,925	0,925	0,920	0,928	0,902	0,913	0,873	0,930
0,3	0,952	0,958	0,929	0,922	0,915	0,928	0,890	0,906	0,851	0,934
0,4	0,963	0,966	0,933	0,920	0,912	0,929	0,881	0,902	0,833	0,941
0,5	0,974	0,976	0,937	0,921	0,910	0,933	0,873	0,899	0,817	0,951
0,6	0,986	0,988	0,941	0,923	0,909	0,937	0,867	0,898	0,802	0,960
0,7	0,998	1,000	0,945	0,926	0,910	0,942	0,862	0,897	0,790	0,970
0,8	1,011	1,013	0,949	0,929	0,911	0,947	0,858	0,897	0,778	0,982
0,9	1,025	1,026	0,953	0,932	0,912	0,953	0,854	0,897	0,767	0,992
1,0	1,039	1,041	0,958	0,936	0,913	0,958	0,851	0,897	0,756	1,002
1,2	1,067	1,072	0,969	0,943	0,916	0,969	0,845	0,899	0,736	1,025
1,4	1,096	1,106	0,980	0,951	0,920	0,983	0,839	0,901	0,718	1,050
1,6	1,126	1,141	0,991	0,962	0,925	0,997	0,835	0,904	0,700	1,075
1,8	1,157	1,175	1,002	0,972	0,930	1,012	0,830	0,903	0,684	1,099
2,0	1,188	1,210	1,015	0,983	0,934	1,028	0,826	0,912	0,659	1,124
2,5	1,266	1,305	1,054	1,013	0,947	1,067	0,817	0,924	0,621	1,183
3,0	1,348	1,406	1,094	1,045	0,960	1,107	0,810	0,937	0,602	1,248
3,5	1,431	1,511	1,139	1,080	0,975	1,150	0,804	0,950	0,577	1,317
4,0	1,517	1,622	1,195	1,116	0,991	1,199	0,797	0,960	—	1,387
4,5	1,598	1,738	1,255	1,153	1,008	—	0,792	0,980	—	1,459
5,0	1,680	1,860	1,314	1,192	1,025	—	0,788	—	—	1,524
5,5	1,763	1,981	1,374	1,231	1,042	—	0,787	—	—	1,594
6,0	1,845	2,106	1,434	1,271	1,060	—	0,788	—	—	1,661

72. Средние ионные коэффициенты активности сильных электролитов в водных растворах при 25 °С

Коэффициенты активности $\gamma_{\pm}$ приведены в интервалах концентраций (м) 0,001—3,0, 4,0—11,0 и 12,0—20,0 моль/кг водн.

Концентрация, моль/кг воды

Электролит

	0,001	0,002	0,003	0,01	0,02	0,05	0,1	0,2	0,5	1,0	2,0	3,0
AgNO ₃	—	—	0,925	0,897	0,860	0,793	0,734	0,657	0,536	0,429	0,316	0,252
AlCl ₃	—	—	—	—	—	0,447	0,337	0,305	0,331	0,539	—	—
Al(OH) ₃	0,78	0,72	—	—	0,45	0,35	0,30	0,27	0,26	—	—	—
Al ₂ (SO ₄) ₃	—	—	—	—	—	0,564	0,500	0,444	0,397	0,395	—	—
BaCl ₂	0,881	0,840	0,774	0,716	0,651	0,526	0,443	0,370	0,448	0,500	0,792	—
Ba(OH) ₂	—	0,853	0,773	0,712	0,627	0,583	0,518	0,472	0,363	0,336	0,345	0,380
CaCl ₂	0,889	0,852	0,789	0,731	0,668	0,545	0,485	0,426	0,363	0,336	0,345	0,380
Ca(NO ₃) ₂	0,88	0,84	0,77	0,71	0,64	0,504	0,428	0,364	0,304	0,251	0,180	0,0352
CdCl ₂	0,819	0,743	0,623	0,524	0,456	0,304	0,228	0,164	0,101	0,0669	0,0441	—
CdSO ₄	—	—	—	0,379	0,281	0,167	0,106	0,0885	0,0376	0,0251	0,0180	—
CoCl ₂	0,726	0,639	0,505	0,399	0,307	0,206	0,150	0,102	0,061	0,041	0,032	0,033
Co(NO ₃) ₂	—	—	—	—	—	—	0,522	0,479	0,462	0,531	0,860	1,458
Cr ₂ (SO ₄) ₃	—	—	—	—	—	—	0,518	0,471	0,445	0,490	0,726	1,182
CsCl	—	—	0,92	0,90	0,86	0,809	0,756	0,694	0,606	0,544	0,495	0,479
CuCl ₂	—	—	—	—	—	—	0,754	0,692	0,599	0,533	0,470	0,434
CuSO ₄	0,885	0,849	0,783	0,723	0,659	0,577	0,508	0,455	0,411	0,417	0,466	0,520
FeSO ₄	0,74	—	0,573	0,438	0,317	0,217	0,154	0,104	0,062	0,043	—	—
FeCl ₃	0,89	0,86	0,80	0,75	0,70	0,62	0,52	0,47	0,45	0,51	0,79	—
HBr	0,966	—	0,930	0,906	0,879	0,838	0,805	0,782	0,789	0,871	1,183	1,693
HCl	0,965	0,952	0,928	0,904	0,875	0,830	0,796	0,767	0,757	0,809	1,009	1,316
HClO ₄	—	—	—	—	—	—	0,803	0,778	0,769	0,823	1,055	1,448
HF	0,544	—	0,300	0,224	—	0,106	0,077	0,031	—	0,024	—	—
HNO ₃	0,965	0,951	0,927	0,902	0,871	0,823	0,791	0,754	0,720	0,724	0,793	0,909
H ₂ SO ₄	0,830	0,757	0,639	0,544	0,453	0,340	0,265	0,209	0,156	0,132	0,128	0,142
KBr	0,965	0,952	0,927	0,903	0,872	0,822	0,772	0,722	0,657	0,617	0,593	0,595
KCl	0,965	0,952	0,927	0,902	0,869	0,816	0,770	0,718	0,649	0,604	0,573	0,569
KClO ₃	0,967	0,955	0,932	0,907	0,875	0,813	0,749	0,681	0,568	—	—	—
KClO ₄	0,965	0,951	0,924	0,895	0,857	0,813	0,749	0,681	0,568	—	—	—
KF	—	—	—	—	—	—	0,775	0,727	0,670	0,645	0,658	0,705
K ₃ Fe(CN) ₆	—	—	—	—	—	—	0,268	0,212	0,155	0,128	—	—
K ₄ Fe(CN) ₆	—	—	—	—	—	—	0,139	0,100	0,062	—	—	—
KI	0,952	—	0,928	0,903	0,872	0,820	0,778	0,733	0,676	0,645	0,637	0,652
KNO ₃	0,965	0,951	0,925	0,898	0,862	0,799	0,739	0,663	0,545	0,443	0,333	0,269

KOH	0,790	0,729	0,639	0,562	0,490	0,824	0,798	0,760	0,732	0,756	0,888	1,081
LaBr ₃	0,790	0,729	0,636	0,560	0,483	0,402	0,314	0,274	0,266	0,342	0,825	—
LaCl ₃	0,963	0,948	0,921	0,895	0,865	0,819	0,790	0,757	0,739	0,774	0,921	—
LiCl	—	—	—	—	—	—	0,812	0,794	0,808	0,887	1,158	1,582
LiClO ₄	—	—	—	—	—	—	0,529	0,489	0,481	0,570	1,053	2,32
MgCl ₂	—	—	—	—	—	—	0,590	0,578	0,647	0,946	2,65	9,19
Mg(ClO ₄) ₂	—	—	—	—	—	—	0,150	0,108	0,068	0,049	0,042	0,049
MgSO ₄	—	—	0,924	0,896	0,862	0,808	0,770	0,718	0,649	0,603	0,570	0,561
NH ₄ Cl	—	—	0,925	0,897	0,860	0,799	0,740	0,677	0,582	0,504	0,419	0,368
NH ₄ NO ₃	—	—	0,94	0,91	0,89	0,85	0,782	0,741	0,697	0,687	0,731	0,714
NaBr	0,97	0,96	0,928	0,903	0,872	0,822	0,778	0,735	0,681	0,657	0,668	0,714
NaCl	0,965	0,952	0,928	0,903	0,872	0,822	0,775	0,720	0,645	0,589	0,538	0,515
NaClO ₃	0,965	0,953	0,928	0,904	0,873	0,822	0,775	0,720	0,645	0,589	0,538	0,515
NaClO ₄	—	—	—	—	—	—	0,775	0,720	0,645	0,589	0,538	0,515
NaF	—	—	—	—	—	—	0,765	0,710	0,632	0,573	0,609	0,611
NaH ₂ PO ₄	—	—	—	—	—	—	0,744	0,675	0,563	0,468	0,371	0,320
NaI	—	—	—	—	—	—	0,787	0,751	0,723	0,736	0,820	0,963
NaNO ₃	0,966	0,953	0,929	0,905	0,873	0,821	0,762	0,703	0,617	0,548	0,478	0,437
NaOH	—	—	—	—	—	—	0,766	0,727	0,690	0,678	0,709	0,784
Na ₂ SO ₄	0,887	0,847	0,778	0,714	0,642	0,536	0,445	0,365	0,266	0,201	0,152	0,137
Na ₂ S ₂ O ₃	—	—	—	—	—	—	0,457	0,382	0,292	0,234	0,198	0,199
Pb(NO ₃) ₂	—	—	—	—	—	—	0,150	0,105	0,063	0,042	0,034	—
SnCl ₄	0,88	0,84	0,76	0,69	0,60	0,46	0,37	0,27	0,17	0,11	—	—
TiCl ₄	0,809	0,716	0,624	0,512	0,398	0,283	0,233	—	—	—	—	—
UO ₂ (ClO ₄) ₂	0,962	0,946	0,876	0,876	0,876	0,876	0,876	0,876	0,876	0,876	0,876	0,876
UO ₂ (NO ₃) ₂	—	—	—	—	—	—	0,730	0,652	0,527	—	—	—
UO ₂ (NO ₃) ₂	—	—	—	—	—	—	0,626	0,634	0,790	1,390	5,91	30,9
ZnBr ₂	—	—	—	—	—	—	0,551	0,520	0,542	0,689	1,237	2,03
ZnCl ₂	—	—	—	—	—	—	0,547	0,510	0,511	0,552	0,572	0,598
ZnSO ₄	0,84	0,84	0,77	0,71	0,64	0,56	0,515	0,462	0,394	0,339	0,289	0,287
HCOONa	0,608	0,608	0,477	0,387	0,298	0,202	0,150	0,104	0,063	0,043	0,035	0,041
CH ₃ COONa	—	—	—	—	—	—	0,778	0,734	0,685	0,661	0,658	0,678
CH ₃ COOLi	—	—	—	—	—	—	0,799	0,711	0,762	0,802	0,95	1,145
CH ₃ COONa	—	—	—	—	—	—	0,784	0,742	0,700	0,689	0,729	0,798
CH ₃ COORb	—	—	—	—	—	—	0,791	0,757	0,735	0,757	0,851	0,982
CH ₃ COOTl	—	—	—	—	—	—	0,796	0,767	0,755	0,792	0,933	1,126
C ₂ H ₅ COONa	—	—	—	—	—	—	0,750	0,686	0,589	0,515	0,444	0,405
C ₂ H ₅ COONa	—	—	—	—	—	—	0,800	0,772	0,764	0,808	0,966	1,160
C ₄ H ₉ COONa	—	—	—	—	—	—	0,800	0,774	0,782	0,868	1,083	1,278
C ₆ H ₁₁ COONa	—	—	—	—	—	—	0,800	0,776	0,790	0,868	1,030	0,982
C ₆ H ₁₁ COONa	—	—	—	—	—	—	0,803	0,779	0,794	0,858	0,763	0,612

Электролит	Концентрация, моль/кг воды									
	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0		
AgNO ₃	0,210	0,181	0,159	0,142	0,129	0,118	0,109	0,102		
CaCl ₂	2,93	5,89	11,11	18,28	26,0	34,2	43,0	51,0		
HCl	1,762	2,38	3,22	4,37	5,90	7,94	10,44	13,51		
HClO ₄	2,08	3,11	4,76	7,44	11,83	19,11	30,9	50,1		
H ₂ SO ₄	0,170	0,208	0,257	0,317	0,386	0,467	0,559	0,643		
KOH	1,352	1,72	2,20	2,88	3,77	4,86	6,22	8,10		
LiCl	1,510	2,02	2,72	3,71	5,10	6,96	9,40	12,55		
NH ₄ Cl	0,560	0,562	0,564	0,566	0,245	0,232	0,221	0,210		
NH ₄ NO ₃	0,331	0,302	0,279	0,261	—	—	—	—		
NaClO ₄	0,626	0,649	0,677	—	—	—	—	—		
NaH ₂ PO ₄	0,293	0,276	0,265	—	—	—	—	—		
NaOH	0,903	1,077	1,299	1,603	2,01	2,55	3,23	4,10		
UO ₂ (ClO ₄) ₂	160,2	750	—	—	—	—	—	—		
ZnBr ₂	0,664	0,774	0,930	1,149	1,439	1,809	2,26	—		
ZnCl ₂	0,307	0,354	0,417	0,499	0,607	0,737	0,898	—		

Электролит	Концентрация, моль/кг воды									
	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	
AgNO ₃	0,096	0,090	—	—	—	—	—	—	—	
HCl	17,25	21,8	27,3	34,1	42,4	—	—	—	—	
HClO ₄	80,8	129,5	205,0	322,0	500,0	—	—	—	—	
H ₂ SO ₄	0,742	0,830	0,967	1,093	1,234	—	—	—	—	
KOH	10,5	13,2	15,8	19,6	24,6	—	—	—	—	
LiCl	16,41	20,9	26,2	31,9	37,9	—	—	—	—	
NH ₄ NO ₃	0,202	0,194	0,186	0,180	0,174	—	—	—	—	
NaOH	5,19	6,50	8,04	9,74	11,58	—	—	—	—	
ZnBr ₂	3,39	—	4,63	—	5,90	—	—	—	—	
ZnCl ₂	1,294	—	1,73	—	2,18	—	—	—	—	

73. Средние ионные коэффициенты активности электролитов в водных растворах в интервале 0—60 °C

m, моль/кг воды	γ _± при температуре, °C					
	0	20	30	40	50	60
Соляная кислота						
0,005	0,930	0,929	0,928	0,926	0,925	0,924
0,01	0,906	0,905	0,903	0,902	0,900	0,899
0,05	0,835	0,832	0,828	0,825	0,821	0,817
0,1	0,803	0,798	0,794	0,789	0,785	0,781
0,5	0,776	0,762	0,753	0,743	0,734	0,724
1,0	0,842	0,816	0,802	0,786	0,770	0,751
1,5	0,945	0,906	0,885	0,860	0,840	0,818
2,0	1,078	1,024	0,993	0,960	0,932	0,907
3,0	1,452	1,345	—	—	—	—
4,0	2,006	1,812	—	—	—	—
Серная кислота						
0,0005	0,912	0,890	0,880	0,869	0,859	0,848
0,001	0,876	0,839	0,823	0,806	0,790	0,775
0,005	0,734	0,656	0,623	0,593	0,566	0,533
0,01	0,649	0,562	0,527	0,495	0,467	0,441
0,05	0,426	0,354	0,326	0,301	0,279	0,260
0,1	0,341	0,278	0,254	0,227	0,214	0,197
0,5	0,202	0,162	0,147	0,133	0,122	0,107
1,0	0,173	0,137	0,123	0,111	0,101	0,0922
1,5	0,167	0,131	0,117	0,106	0,0956	0,0869
2,0	0,170	0,132	0,118	0,105	0,0949	0,0859
3,0	0,210	0,151	0,132	0,117	0,104	0,0926
4,0	0,254	0,184	0,159	0,138	0,121	0,106
6,0	0,427	0,289	0,242	0,205	0,174	0,150
10,0	1,012	0,618	0,493	0,398	0,325	0,268
17,5	3,217	1,703	1,275	0,972	0,752	0,589
Хлорид калия						
0,1	0,786	0,770	0,768	0,765	—	—
0,5	0,642	0,651	0,651	0,646	—	—
1,0	0,588	0,604	0,604	0,603	—	—
1,5	0,563	0,582	0,585	0,585	—	—
2,0	0,547	0,573	0,578	0,578	—	—
3,0	0,539	0,567	0,573	0,573	—	—
4,0	—	0,574	0,582	0,585	—	—

m , моль/кг воды	$\gamma_{\pm}$ при температуре, °C					
	0	20	30	40	50	60

Гидроксид калия

0,05	0,829	0,825	0,823	—	—	—
0,1	0,795	0,796	0,792	0,782	0,780	0,773
0,5	0,737	0,732	0,725	—	—	—
1,0	0,755	0,756	0,752	0,742	0,730	0,715
1,5	0,809	0,814	0,812	—	—	—
2,0	0,880	0,888	0,878	0,860	0,840	0,814
3,0	1,088	1,087	1,072	—	—	—
4,0	1,391	1,375	1,337	1,292	1,238	1,180
6,0	—	2,33	—	2,09	—	1,81
10,0	—	6,73	—	5,50	—	4,37

Хлорид натрия

0,1	0,781	0,779	0,779	0,774	0,770	0,766
0,2	0,731	0,733	0,731	0,728	(0,72)	0,721
0,5	0,671	0,679	0,679	(0,67)	(0,67)	0,672
1,0	0,635	0,654	0,657	0,657	(0,66)	0,655
1,5	0,626	0,652	0,658	(0,66)	(0,66)	(0,66)
2,0	0,630	0,665	0,674	(0,68)	(0,68)	0,683
3,0	0,660	0,712	0,724	(0,73)	(0,73)	0,736
4,0	0,717	0,783	0,797	(0,80)	(0,80)	(0,80)

Гидроксид натрия

0,05	0,820	0,819	0,818	—	—	—
0,1	0,767	0,766	0,765	—	—	—
0,5	0,648	0,643	0,693	—	—	—
1,0	0,660	0,678	0,680	—	—	—
1,5	0,661	0,682	0,685	0,684	0,674	0,657
2,0	0,682	(0,71)	0,712	0,707	0,696	0,677
3,0	0,763	(0,79)	0,791	0,783	0,767	0,742
4,0	0,900	0,916	0,911	0,895	0,87	0,839
6,0	1,39	1,35	1,32	1,27	1,21	1,14
10,0	4,12	3,61	3,31	3,00	2,01	2,34
17,0	22,5	15,82	13,00	10,52	9,39	6,60

74. Соотношения между концентрацией, активностью и средним ионным коэффициентом активности электролитов разного типа

Средняя ионная моляльность $m_{\pm} = (\nu_+^{\nu_+} \nu_-^{\nu_-})^{\frac{1}{\nu}} m$; активность $a = (m_{\pm} \gamma_{\pm})^{\nu} = a_{\pm}^{\nu}$, где ν_+ — число катионов; ν_- — число анионов; ν — общее число ионов.

В зависимости от способа выражения концентрации раствора средние ионные коэффициенты активности электролитов обозначают: $\gamma_{\pm, c} \equiv \gamma_{\pm}; \gamma_{\pm, m} \equiv \gamma_{\pm}; \gamma_{\pm, X} \equiv \gamma_{\pm}$. Соотношения между ними: $\gamma_{\pm, c} = m \rho_0 \gamma_{\pm, m} / c$; $\gamma_{\pm, X} = \gamma_{\pm} (1 + \nu M_0 m \cdot 10^{-3}) = \gamma_{\pm} [\rho + c (\nu M_0 - M) \cdot 10^{-3}] / \rho_0$, где ρ_0 и ρ — плотность растворителя и раствора, г/см³; M_0 и M — молярная масса растворителя и раствора, г/моль; X — молярная доля растворенного вещества; c — молярность, моль/л раствора; m — моляльность, моль/кг растворителя.

Тип валентности электролита	Пример	$\gamma_{\pm}$	$m_{\pm}$	a
Неэлектролит	Сахароза	—	—	$m\gamma$
1-1, 2-2; 3-3	KCl, ZnSO ₄ , LaFe(CN) ₆	$(\gamma_+ \gamma_-)^{\frac{1}{2}}$	m	$m^2 \gamma_{\pm}^2$
2-1	CaCl ₂	$(\gamma_+ \gamma_-^2)^{\frac{1}{3}}$	$\frac{1}{4} m$	$4 m^3 \gamma_{\pm}^3$
1-2	Na ₂ SO ₄	$(\gamma_+^2 \gamma_-)^{\frac{1}{3}}$	$\frac{1}{4} m$	$4 m^3 \gamma_{\pm}^3$
3-1	LaCl ₃	$(\gamma_+ \gamma_-^3)^{\frac{1}{4}}$	$\frac{1}{27} m$	$27 m^4 \gamma_{\pm}^4$
1-3	K ₃ Fe(CN) ₆	$(\gamma_+^3 \gamma_-)^{\frac{1}{4}}$	$\frac{1}{27} m$	$27 m^4 \gamma_{\pm}^4$
4-1	Th(NO ₃) ₄	$(\gamma_+ \gamma_-^4)^{\frac{1}{5}}$	$\frac{1}{256} m$	$256 m^5 \gamma_{\pm}^5$
1-4	K ₄ Fe(CN) ₆	$(\gamma_+^4 \gamma_-)^{\frac{1}{5}}$	$\frac{1}{256} m$	$256 m^5 \gamma_{\pm}^5$
3-2	Al ₂ (SO ₄) ₃	$(\gamma_+^2 \gamma_-^3)^{\frac{1}{5}}$	$\frac{1}{108} m$	$108 m^5 \gamma_{\pm}^5$

75. Константы диссоциации слабых кислот
и оснований в водных растворах при 25 °C

Звездочкой отмечены выраженные через активности термодинамические константы диссоциации. Остальные константы выражены через концентрации.

Кислота	K	pK
Аспарагиновая $C_4H_7O_4N$	(I) $3,71 \cdot 10^{-5}$ *	4,430
Аспарагиновая $C_4H_7O_4N$	(II) $3,87 \cdot 10^{-6}$	5,412
Аспарагиновая $C_4H_7O_4N$	$5,56 \cdot 10^{-6}$ *	4,255
Аспарагиновая $C_4H_7O_4N$	(I) $1,29 \cdot 10^{-2}$	1,990
Аспарагиновая $C_4H_7O_4N$	(II) $1,26 \cdot 10^{-4}$	3,900
Бензойная $C_7H_6O_2$	$6,3 \cdot 10^{-5}$ *	4,201
Борная H_2BO_3	(I) $5,83 \cdot 10^{-10}$ *	9,234
Борная H_2BO_3	(II) $1,8 \cdot 10^{-13}$	12,745
Борная H_2BO_3	(III) $1,6 \cdot 10^{-14}$	13,80
м-Бромбензойная $C_7H_5O_2Br$	$1,54 \cdot 10^{-4}$	3,812
о-Бромбензойная $C_7H_5O_2Br$	$1,4 \cdot 10^{-3}$	2,854
п-Бромбензойная $C_7H_5O_2Br$	$1,07 \cdot 10^{-4}$	3,971
Валериановая $C_6H_{10}O_2$	$1,44 \cdot 10^{-5}$	4,842
Германиевая H_2GeO_3	(I) $2,6 \cdot 10^{-9}$	8,585
Германиевая H_2GeO_3	(II) $1,9 \cdot 10^{-12}$	12,721
м-Гидроксibenзойная $C_7H_6O_3$	$8,33 \cdot 10^{-5}$	4,079
о-Гидроксibenзойная $C_7H_6O_3$	$1,06 \cdot 10^{-3}$	2,975
п-Гидроксibenзойная $C_7H_6O_3$	$2,85 \cdot 10^{-5}$	4,545
Гидрохинон $C_6H_4O_2$	(I) $4,5 \cdot 10^{-11}$	10,347
Гликолевая $C_2H_4O_3$	$1,48 \cdot 10^{-4}$ *	3,831
Глицин $C_2H_5O_2N$	(I) $4,47 \cdot 10^{-3}$	2,350
Глутаровая $C_6H_8O_4$	(I) $4,54 \cdot 10^{-5}$ *	4,343
Глутаровая $C_6H_8O_4$	(II) $3,8 \cdot 10^{-6}$	5,420
Дихлоруксусная $C_2H_2O_2Cl_2$	$3,32 \cdot 10^{-2}$	1,479
Изовалериановая $C_5H_{10}O_2$	$1,73 \cdot 10^{-5}$	4,762
Изомасляная $C_4H_8O_2$	$1,42 \cdot 10^{-5}$	4,848
Каприловая $C_8H_{16}O_2$	$1,28 \cdot 10^{-5}$	4,894
цис-Коричная $C_9H_8O_2$	$1,32 \cdot 10^{-4}$ *	3,879
транс-Коричная $C_9H_8O_2$	$3,65 \cdot 10^{-5}$	4,438
Лимонная $C_6H_8O_7$	(I) $7,45 \cdot 10^{-4}$ *	3,128
Лимонная $C_6H_8O_7$	(II) $1,73 \cdot 10^{-5}$ *	4,761
Лимонная $C_6H_8O_7$	(III) $4,02 \cdot 10^{-9}$	5,396
Малеиновая $C_4H_4O_4$	(I) $1,42 \cdot 10^{-2}$ *	1,848
Малеиновая $C_4H_4O_4$	(II) $8,57 \cdot 10^{-2}$ *	6,067
Малоновая $C_3H_4O_4$	(I) $1,40 \cdot 10^{-2}$ *	2,855
Малоновая $C_3H_4O_4$	(II) $2,01 \cdot 10^{-6}$ *	5,696
Масляная $C_4H_8O_2$	$1,51 \cdot 10^{-5}$ *	4,820
Миндальная $C_8H_8O_3$	$3,88 \cdot 10^{-4}$	3,411
Молочная $C_3H_6O_3$	$1,37 \cdot 10^{-4}$ *	3,863
Муравьиная CH_2O_2	$1,772 \cdot 10^{-4}$	3,752
м-Нитробензойная $C_7H_5O_4N$	$3,21 \cdot 10^{-4}$ *	3,493
о-Нитробензойная $C_7H_5O_4N$	$6,71 \cdot 10^{-5}$ *	2,173
п-Нитробензойная $C_7H_5O_4N$	$3,76 \cdot 10^{-4}$	3,425
Нитроуксусная $C_2H_3O_4N$	$5,5 \cdot 10^{-3}$	2,26
Пимелиновая $C_6H_{12}O_4$	(I) $3,1 \cdot 10^{-5}$ *	4,509
Пимелиновая $C_6H_{12}O_4$	(II) $4,88 \cdot 10^{-6}$	5,312
Пропионовая $C_3H_6O_2$	$1,34 \cdot 10^{-5}$ *	4,874
Сероводородная H_2S	(I) $1,1 \cdot 10^{-2}$	6,96
Сероводородная H_2S	(II) $3,63 \cdot 10^{-12}$	11,44
	(20 °C)	

Продолжение

Кислота	K	pK
Трихлоруксусная $C_2HO_2Cl_3$	0,2	0,7
Угольная H_2CO_3	(I) $4,45 \cdot 10^{-7}$	6,352
Угольная H_2CO_3	(II) $4,69 \cdot 10^{-11}$	10,329
Уксусная $C_2H_4O_2$	$1,754 \cdot 10^{-5}$ *	4,756
Фенилуксусная $C_8H_8O_2$	$4,87 \cdot 10^{-5}$ *	4,312
Фенол C_6H_6O	$1,01 \cdot 10^{-10}$	9,998
Фосфорная H_3PO	(I) $7,11 \cdot 10^{-3}$ *	2,148
Фосфорная H_3PO	(II) $6,34 \cdot 10^{-8}$ *	7,198
Фосфорная H_3PO	(III) $1,26 \cdot 10^{-12}$	11,90
с-Фталевая $C_6H_4O_4$	(I) $1,12 \cdot 10^{-3}$ *	2,950
с-Фталевая $C_6H_4O_4$	(II) $3,91 \cdot 10^{-6}$ *	5,408
м-Фторбензойная $C_7H_5O_2F$	$1,36 \cdot 10^{-4}$	3,865
о-Фторбензойная $C_7H_5O_2F$	$5,41 \cdot 10^{-4}$	3,267
п-Фторбензойная $C_7H_5O_2F$	$7,23 \cdot 10^{-6}$	4,141
Фторуксусная $C_2H_3O_2F$	$2,61 \cdot 10^{-3}$	2,584
Фумаровая $C_4H_4O_4$	(I) $9,50 \cdot 10^{-4}$ *	3,022
Фумаровая $C_4H_4O_4$	(II) $4,8 \cdot 10^{-6}$ *	4,319
л-Хлорбензойная $C_7H_5O_2Cl$	$1,50 \cdot 10^{-4}$ *	3,824
о-Хлорбензойная $C_7H_5O_2Cl$	$1,14 \cdot 10^{-3}$ *	2,943
п-Хлорбензойная $C_7H_5O_2Cl$	$1,06 \cdot 10^{-4}$ *	3,975
Хлоруксусная $C_2H_3O_2Cl$	$1,36 \cdot 10^{-3}$ *	2,865
Щавелевая $C_2H_2O_4$	(I) $6,5 \cdot 10^{-2}$ *	1,187
Щавелевая $C_2H_2O_4$	(II) $5,18 \cdot 10^{-5}$ *	4,296
Щавелевая $C_2H_2O_4$	(I) $6,21 \cdot 10^{-5}$	4,207
Щавелевая $C_2H_2O_4$	(II) $2,31 \cdot 10^{-6}$	5,636
Янтарная $C_4H_6O_4$		
Основание		
Анилин $C_6H_7N \cdot H_2O$	$3,82 \cdot 10^{-10}$ *	9,418
Бензиламин $C_7H_9N \cdot H_2O$	$2,35 \cdot 10^{-5}$	4,629
Бутиламин $C_4H_{11}N \cdot H_2O$	$4,57 \cdot 10^{-4}$ *	3,340
Гидразин $N_2H_4 \cdot H_2O$	$1,7 \cdot 10^{-6}$	5,77
Гидроксид аммония NH_4OH	$1,77 \cdot 10^{-5}$ *	4,752
Диметиламин $C_2H_7N \cdot H_2O$	$6 \cdot 10^{-4}$ *	3,222
Диэтиламин $C_4H_{11}N \cdot H_2O$	$9,6 \cdot 10^{-4}$ *	3,018
Метиламин $CH_5N \cdot H_2O$	$4,24 \cdot 10^{-4}$ *	3,373
Пиперидин $C_5H_{11}N \cdot H_2O$	$1,32 \cdot 10^{-3}$	2,879
Пиридин $C_5H_7N \cdot H_2O$	$1,71 \cdot 10^{-8}$	8,767
Пропиламин $C_3H_7N \cdot H_2O$	$5,62 \cdot 10^{-4}$ *	3,256
Триметиламин $C_3H_9N \cdot H_2O$	$6,31 \cdot 10^{-5}$ *	4,200
Хинолин $C_9H_7N \cdot H_2O$	$1 \cdot 10^{-9}$	9,000
Этаноламин $C_2H_7ON \cdot H_2O$	$3 \cdot 10^{-5}$ *	4,523
Этиламин $C_2H_7N \cdot H_2O$	$3,18 \cdot 10^{-4}$ *	3,498



76. Характеристики кислотно-основных индикаторов

Индикаторные константы, интервал pH изменения окраски и окраска приведены при комнатной температуре.

Индикатор	pH	Интервал pH изменения окраски	Окраска
Тимоловый голубой	1,51	1,2—2,8	Красная — желтая
β-Динитрофенол	3,69	2,2—4,0	Бесцветная — желтая
Метиловый оранжевый	3,7	3,1—4,4	Красная — желтая
Бромфеноловый голубой	3,98	3,0—4,6	Желтая — голубая
α-Динитрофенол	4,06	2,8—4,5	Бесцветная — желтая
Бромкрезоловый зеленый	4,67	3,8—5,4	Желтая — голубая
Метиловый красный	5,1	4,2—6,3	Красная — желтая
γ-Динитрофенол	5,2	4,0—5,5	Бесцветная — желтая
Бромкрезоловый пурпурный	6,3	5,2—6,8	Желтая — пурпурная
Бромтимоловый голубой	7,0	6,0—7,6	Желтая — голубая
n-Нитрофенол	7,1	5,6—7,6	Бесцветная — желтая
Феноловый красный	7,9	6,8—8,4	Желтая — красная
Крезоловый красный	8,3	7,2—8,0	Желтая — красная
m-Нитрофенол	8,35	6,7—8,4	Бесцветная — желтая
Тимоловый голубой	8,9	8,0—9,6	Желтая — голубая
Фенолфталеин	9,4	8,3—10,0	Бесцветная — красная

77. Константы нестойкости комплексных соединений

Комплексная частица вида MA_n (заряды опущены) диссоциирует последовательно по уравнениям:



Константы равновесия ступеней диссоциации $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-1}, \beta_n$ называют ступенчатыми константами нестойкости. Общая константа нестойкости $K = \beta_1 \beta_2 \dots \beta_{n-1} \beta_n$.

Обратные величины констант $-\frac{1}{K}$ или $\frac{1}{\beta_i}$ называют константами устойчивости.

Пользуются также общими константами нестойкости любой ступени диссоциации $K_{1,2} = \beta_1 \beta_2, K_{1,3} = \beta_1 \beta_2 \beta_3$ и т. д. вплоть до $K_{1,n} = K$.

В таблице приведены значения $p\beta_i = -\lg \beta_i$ и соответствующие $pK = -\lg K$. Очевидно, $pK_{1,2} = p\beta_1 + p\beta_2$ и т. д.

Константы относятся к растворенным частицам в отсутствие твердых фаз.

Комплекс	Температура, °C	Ионная сила	pβ	pK
----------	-----------------	-------------	----	----

Аммиачные комплексы

$[Ag(NH_3)]^+$	25	0	3,37	3,37
$[Ag(NH_3)_2]^+$	25	0	3,84	7,21
$[Cd(NH_3)]^{2+}$	25	2,0	2,74	2,74
$[Cd(NH_3)_2]^{2+}$	25	2,0	2,18	4,92
$[Cd(NH_3)_3]^{2+}$	25	2,0	1,45	6,37
$[Cd(NH_3)_4]^{2+}$	25	2,0	1,00	7,37
$[Co(NH_3)]^{2+}$	30	0,5—5,0	2,11	2,11
$[Co(NH_3)_2]^{2+}$	30	0,5—5,0	1,63	3,74
$[Co(NH_3)_3]^{2+}$	30	0,5—5,0	1,05	4,79
$[Co(NH_3)_4]^{2+}$	30	0,5—5,0	0,76	5,55
$[Co(NH_3)_5]^{2+}$	30	0,5—5,0	0,18	5,73
$[Co(NH_3)_6]^{2+}$	30	0,5—5,0	—0,62	5,11
$[Cu(NH_3)]^{2+}$	25	1,0	4,27	4,27
$[Cu(NH_3)_2]^{2+}$	25	1,0	3,55	7,82
$[Cu(NH_3)_3]^{2+}$	25	1,0	2,90	10,72
$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$	25	1,0	2,18	12,90
$[Ni(NH_3)]^{2+}$	25	1,0	2,36	2,36
$[Ni(NH_3)_2]^{2+}$	25	1,0	1,90	4,26
$[Ni(NH_3)_3]^{2+}$	25	1,0	1,55	5,81
$[Ni(NH_3)_4]^{2+}$	25	1,0	1,23	7,04
$[Ni(NH_3)_5]^{2+}$	25	1,0	0,85	7,89
$[Ni(NH_3)_6]^{2+}$	25	1,0	0,42	8,31
$[Zn(NH_3)]^{2+}$	25	≈ 2,0	2,59	2,59
$[Zn(NH_3)_2]^{2+}$	25	≈ 2,0	2,32	4,91
$[Zn(NH_3)_3]^{2+}$	25	≈ 2,0	2,01	6,92
$[Zn(NH_3)_4]^{2+}$	25	≈ 2,0	1,70	8,62

Ацетатные комплексы $Ac^- = CH_3COO^-$

$[Ni(Ac)]^+$	25	0	1,8	1,8
$[Pb(Ac)]^+$	20	1,0	0,59	1,26
$[Pb(Ac)_2]$	25	1,0	2,05	2,05
$[Pb(Ac)_3]^-$	20	2,0	0,24	2,04
	20	2,0	—0,13	1,91

Комплексы	Температура, °C	Ионная сила	pВ	pK
[Pb(Ac) ₄] ²⁻	20	2,0	-0,50	1,41
[Zn(Ac) ₄] ²⁻	18	0,1	1,70	1,70

Бромидные комплексы

[Ag ₃ Br] ⁺	Комп.	—	—	9,70
AgBr	25	0,2	4,15	4,15
[AgBr ₂] ⁻	25	0,2	2,96	7,11
[AgBr ₄] ³⁻	25	0,2	1,79	8,90
[HgBr] ⁺	25	0,5	9,05	9,05
HgBr ₂	25	0,5	8,27	17,32
[HgBr ₃] ⁻	25	0,5	2,42	19,74
[HgBr ₄] ²⁻	25	0,5	1,26	21,00
[PbBr] ⁺	25	0	1,15	1,15
PbBr ₂	25	0	—	1,92
[PbBr ₄] ²⁻	25	0	—	3,0

Гидроксокомплексы

[CaOH] ⁺	25	0	1,30	1,30
[CdOH] ⁺	30	0,1	2,30	2,30
[CoOH] ⁺	25	0	4,4	4,4
[HgOH] ⁺	25	0,5	10,30	10,30
Hg(OH) ₂	25	0,5	11,40	21,70
[NiOH] ⁺	30	0,4	4,60	4,60
[PbOH] ⁺	18	0	6,22	6,22
[ZnOH] ⁺	25	0	4,4	4,4
[Zn(OH) ₃] ⁻	Комп.	—	—	14,37
[Zn(OH) ₄] ²⁻	25	Перем.	—	15,44

Иодидные комплексы

[Ag ₃ I] ²⁺	Комп.	Перем.	—	14,15
[AgI ₃] ²⁻	»	1,6	—	13,95
[AgI ₄] ³⁻	20	1,6	—	13,74
[Pb ₃ I] ³⁺	25	0,3—3,6	—	1,66
[PbI] ⁺	25	0,3—3,6	2,30	2,30
[PbI ₃] ⁻	25	0,3—3,6	—	4,65
[PbI ₄] ²⁻	25	0,3—3,6	-0,80	3,85

Хлоридные комплексы

[Ag ₃ Cl] ⁺	Комп.	—	—	6,70
AgCl	25	0	3,04	3,04
[AgCl ₂] ⁻	25	0	2,0	5,04
[AgCl ₃] ²⁻	25	0	0,0	5,04
[AgCl ₄] ³⁻	25	0	0,26	5,30
[HgCl] ⁺	25	0,5	6,74	6,74
HgCl ₂	25	0,5	6,48	13,22
[PbCl] ⁺	25	1,0	1,43	1,43
PbCl ₂	25	1,0	0,83	2,26
[PbCl ₃] ⁻	25	1,0	-0,18	2,08
[PbCl ₄] ²⁻	25	1,0	0,07	2,15

Комплексы	Температура, °C	Ионная сила	pВ	pK
-----------	-----------------	-------------	----	----

Цианидные комплексы

[Ag(CN) ₃] ⁻	18	0,3	—	21,1
[Ag(CN) ₅] ³⁻	25	0,0	0,7	21,8
[Ag(CN) ₆] ³⁻	25	0,0	-1,13	20,68
[Cd(CN) ₄] ²⁻	25	3,0	5,54	5,54
Cd(CN) ₂	25	3,0	5,06	10,60
[Cd(CN) ₃] ⁻	25	3,0	4,70	15,30
[Cd(CN) ₄] ²⁻	25	3,0	3,55	18,85
[Fe(CN) ₆] ⁴⁻	25	0	—	24
[Fe(CN) ₆] ³⁻	25	0	—	31
[Hg(CN) ₄] ²⁻	25	0,05—0,20	—	41,4
[Ni(CN) ₄] ²⁻	25	—	—	13,75
[Zn(CN) ₄] ²⁻	25	0	—	16,76

Комплексы с этилендиаминном
(En = H₂NCH₂CH₂NH₂)

[Ag(En)] ⁺	20	0,1	4,70	4,70
[Ag(En) ₂] ⁺	20	0,1	3,00	7,70
[Cd(En)] ²⁺	25	1,0	5,63	5,63
[Cd(En) ₂] ²⁺	25	1,0	4,59	10,22
[Cd(En) ₃] ²⁺	25	1,0	2,07	12,29
[Co(En)] ²⁺	25	1,0	5,93	5,93
[Co(En) ₂] ²⁺	25	1,0	4,73	10,66
[Co(En) ₃] ²⁺	25	1,0	3,30	13,96
[Cu(En)] ²⁺	25	0,5	10,76	10,76
[Cu(En) ₂] ²⁺	25	0,5	9,37	20,13
[Fe(En)] ²⁺	25	1,0	4,34	4,34
[Fe(En) ₂] ²⁺	25	1,0	3,31	7,65
[Fe(En) ₃] ²⁺	25	1,0	2,05	9,70
[Ni(En)] ²⁺	25	0,5	7,60	7,60
[Ni(En) ₂] ²⁺	25	0,5	6,48	14,08
[Ni(En) ₃] ²⁺	25	0,5	5,03	19,11
[Zn(En)] ²⁺	25	1,0	5,92	5,92
[Zn(En) ₂] ²⁺	25	1,0	5,15	11,07
[Zn(En) ₃] ²⁺	25	1,0	1,86	12,93

Комплексы с этилендиаминтетрауксусной
кислотой (EDTA)

[CdEDTA] ²⁻	20	0,1	16,48	16,48
[CoEDTA] ²⁻	20	0,1	16,10	16,10
[CoEDTA] ⁻	20	0,1	36	36
[CuEDTA] ²⁻	20	0,1	18,8	18,8
[FeEDTA] ²⁻	20	0,1	14,45	14,45
[FeEDTA] ⁻	20	0,1	25,1	25,1
[NiEDTA] ²⁻	20	0,1	18,45	18,45
[PbEDTA] ²⁻	20	0,1	18,2	18,2
[ZnEDTA] ²⁻	20	0,1	16,5	16,5

78. Производство растворимости при 25 °С

$$L = (v_+^{+} + v_-^{-}) v_{\pm}^{+} - m v_+^{+} v_-^{-}$$

где v_+ и v_- — число катионов и анионов; $v_{\pm}$ — средний ионный коэффициент активности; m — концентрация насыщенного раствора, моль/л.

Значения L вычислены из данных по электродным потенциалам (см. табл. 79) и термодинамическим функциям (см. табл. 44).

Твердая фаза	L , (моль/л) ^v	Твердая фаза	L , (моль/л) ^v
AgBr	$4,8 \cdot 10^{-13}$	CuI	$1,1 \cdot 10^{-12}$
AgBrO ₃	$6,1 \cdot 10^{-3}$	Fe(OH) ₂	$1,6 \cdot 10^{-15}$
AgCl	$1,73 \cdot 10^{-10}$	Hg ₂ Br ₂	$5,4 \cdot 10^{-24}$
AgCN	$1,6 \cdot 10^{-14}$	Hg ₂ Cl ₂	$1,2 \cdot 10^{-19}$
AgI	$8,1 \cdot 10^{-17}$	Hg ₂ I ₂	$4,4 \cdot 10^{-29}$
AgIO ₃	$3,0 \cdot 10^{-8}$	Hg ₂ SO ₄	$6,4 \cdot 10^{-7}$
Ag ₂ CrO ₄	$4,7 \cdot 10^{-12}$	Ni(OH) ₂	$1,2 \cdot 10^{-16}$
Ag ₂ SO ₄	$1,24 \cdot 10^{-5}$	PbBr ₂	$4,5 \cdot 10^{-5}$
Ag ₂ S	$4,23 \cdot 10^{-30}$	PbCl ₂	$1,6 \cdot 10^{-3}$
BaSO ₄	$1 \cdot 10^{-10}$	PbI ₂	$8,2 \cdot 10^{-9}$
CaCO ₃	$3,7 \cdot 10^{-9}$	Pb(OH) ₂	$5,1 \cdot 10^{-16}$
CaHPO ₄	$1,4 \cdot 10^{-6}$	PbSO ₄	$1,3 \cdot 10^{-8}$
Ca(OH) ₂	$6,1 \cdot 10^{-6}$	PbS	$6,2 \cdot 10^{-28}$
CaSO ₄	$1,7 \cdot 10^{-5}$	TlBr	$3,6 \cdot 10^{-3}$
CdCO ₃	$2,5 \cdot 10^{-14}$	TlCl	$1,8 \cdot 10^{-4}$
Cd(OH) ₂	$1,8 \cdot 10^{-14}$	TlI	$8,8 \cdot 10^{-8}$
Co(OH) ₂	$4,7 \cdot 10^{-16}$	Zn(OH) ₂	$4,9 \cdot 10^{-17}$
CuCl	$3,2 \cdot 10^{-7}$	ZnS	$1,9 \cdot 10^{-22}$

ТЕРМОДИНАМИКА И КИНЕТИКА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

79. Стандартные электродные потенциалы в водных растворах при 25 °С

УКАЗАТЕЛЬ

№ по порядку	№ по порядку
Азот 46, 47, 120, 143, 145	Платина 139
Алюминий 16, 62	Плутоний 36, 144
Барий 6, 59	Радий 5
Бериллий 14	Ртуть 32, 34, 81, 96, 99, 101, 104, 109
Бром 40	Рубидий 5
Ванадий 118	Свинец 28, 71, 83, 85, 87, 88, 91, 92, 152, 156
Висмут 86, 107	Селен 37
Водород 12, 41, 43, 140	Сера 38, 112, 113, 115, 119, 123, 126, 131, 132, 135, 160
Германий 95	Серебро 33, 82, 94, 97, 98, 103, 105, 106, 108, 110, 111
Железо 21, 29, 70, 73, 76, 129, 141	Стронций 7, 58
Золото 85	Сурьма 102
Индий 23	Таллий 24, 77, 84, 90, 150
Иод 39, 133, 147	Торий 13
Кадмий 22, 68, 75, 78	Углерод 42, 122
Калий 2	Уран 15, 61, 114, 121, 128, 137
Кальций 8, 57	Фосфор 117
Кислород 44, 45, 49, 50, 54, 55, 158, 161	Фтор 56
Кобальт 25, 79, 159	Хлор 48, 51, 52, 53, 127, 130, 138, 142, 146, 148, 155
Кремний 74	Хром 18, 20, 65, 116, 151
Лантан 10	Цезий 4
Литий 1	Церий 154
Магний 11, 60	Цинк 19, 66, 67, 69
Марганец 17, 63, 64, 136, 149, 153, 157	
Медь 30, 31, 72, 89, 93, 100, 125	
Мышьяк 134	
Натрий 9	
Никель 26, 80	
Олово 27, 124	

№ по пор.	Электрод	Реакция	E°, В
-----------	----------	---------	-------

Электроды, обратимые относительно катиона

1	Li ⁺ , Li	Li ⁺ + e → Li	-3,045
2	K ⁺ , K	K ⁺ + e → K	-2,925
3	Rb ⁺ , Rb	Rb ⁺ + e → Rb	-2,925
4	Cs ⁺ , Cs	Cs ⁺ + e → Cs	-2,923
5	Ra ²⁺ , Ra	Ra ²⁺ + 2e → Ra	-2,916
6	Ba ²⁺ , Ba	Ba ²⁺ + 2e → Ba	-2,906
7	Sr ²⁺ , Sr	Sr ²⁺ + 2e → Sr	-2,888
8	Ca ²⁺ , Ca	Ca ²⁺ + 2e → Ca	-2,866
9	Na ⁺ , Na	Na ⁺ + e → Na	-2,714
10	La ³⁺ , La	La ³⁺ + 3e → La	-2,522
11	Mg ²⁺ , Mg	Mg ²⁺ + 2e → Mg	-2,363
12	H ⁺ , H	H ⁺ + e → H	-2,106
13	Th ⁴⁺ , Th	Th ⁴⁺ + 4e → Th	-1,899
14	Be ²⁺ , Be	Be ²⁺ + 2e → Be	-1,847
15	U ³⁺ , U	U ³⁺ + 3e → U	-1,789
16	Al ³⁺ , Al	Al ³⁺ + 3e → Al	-1,662
17	Mn ²⁺ , Mn	Mn ²⁺ + 2e → Mn	-1,180
18	Cr ²⁺ , Cr	Cr ²⁺ + 2e → Cr	-0,913
19	Zn ²⁺ , Zn	Zn ²⁺ + 2e → Zn	-0,763
20	Cr ³⁺ , Cr	Cr ³⁺ + 3e → Cr	-0,744
21	Fe ²⁺ , Fe	Fe ²⁺ + 2e → Fe	-0,440
22	Cd ²⁺ , Cd	Cd ²⁺ + 2e → Cd	-0,403
23	In ³⁺ , In	In ³⁺ + 3e → In	-0,343
24	Tl ⁺ , Tl	Tl ⁺ + e → Tl	-0,336
25	Co ²⁺ , Co	Co ²⁺ + 2e → Co	-0,277

№ по пор.	Электрод	Реакция	E°, В
26	Ni ²⁺ , Ni	Ni ²⁺ + 2e → Ni	-0,250
27	Sn ²⁺ , Sn	Sn ²⁺ + 2e → Sn	-0,136
28	Pb ²⁺ , Pb	Pb ²⁺ + 2e → Pb	-0,126
29	Fe ²⁺ , Fe	Fe ²⁺ + 2e → Fe	-0,036
30	Cu ²⁺ , Cu	Cu ²⁺ + 2e → Cu	+0,337
31	Cu ⁺ , Cu	Cu ⁺ + e → Cu	+0,521
32	Hg ₂ ²⁺ , Hg	$\frac{1}{2}$ Hg ₂ ²⁺ + e → Hg	+0,798
33	Ag ⁺ , Ag	Ag ⁺ + e → Ag	+0,799
34	Hg ₂ ²⁺ , Hg	Hg ₂ ²⁺ + 2e → Hg	+0,854
35	Au ³⁺ , Au	Au ³⁺ + 3e → Au	+1,498
36	Pu ³⁺ , Pu	Pu ³⁺ + 3e → Pu	+2,03
Электроды, обратимые относительно аниона			
37	Se, Se ²⁻	Se + 2e → Se ²⁻	-0,92
38	S, S ²⁻	S + 2e → S ²⁻	-0,447
39	I ₂ (иср.), I ⁻	$\frac{1}{2}$ I ₂ + e → I ⁻	+0,536
40	Br ₂ (ж.), Br ⁻	$\frac{1}{2}$ Br ₂ + e → Br ⁻	+1,065
Газовые электроды			
41	H ₂ , OH ⁻	2H ₂ O + 2e → H ₂ + 2OH ⁻	-0,828
42	H ⁺ , HCOOH, CO ₂ (Pt)	CO ₂ + 2H ⁺ + 2e → HCOOH	-0,199
43	H ⁺ , H ₂	H ⁺ + e → $\frac{1}{2}$ H ₂	0,000
44	O ₂ , OH ⁻	$\frac{1}{2}$ O ₂ + H ₂ O + 2e → 2OH ⁻	+0,401
45	H ⁺ , H ₂ O ₂ , O ₂ (Pt)	O ₂ + 2H ⁺ + 2e → H ₂ O ₂	+0,682
46	H ⁺ , NO ₃ ⁻ , NO(Pt)	NO ₃ ⁻ + 4H ⁺ + 4e → NO + 2H ₂ O	+0,96
47	H ⁺ , HNO ₂ , NO(Pt)	HNO ₂ + H ⁺ + e → NO + H ₂ O	+1,00
48	ClO ₂ , ClO ₂ ⁻ (Pt)	ClO ₂ + e → ClO ₂ ⁻	+1,16
49	H ⁺ , O ₂ (Pt)	O ₂ + 4H ⁺ + 4e → 2H ₂ O	+1,229
50	O ₂ , O ₂ , OH ⁻ (Pt)	O ₂ + H ₂ O + 2e → OH ⁻	+1,24
51	H ⁺ , ClO ₂ , HClO ₂ (Pt)	ClO ₂ + H ⁺ + e → HClO ₂	+1,275
52	Cl ₂ , Cl ⁻	$\frac{1}{2}$ Cl ₂ + e → Cl ⁻	+1,360
53	H ⁺ , HClO, Cl ₂ (Pt)	HClO + H ⁺ + e → $\frac{1}{2}$ Cl ₂ + H ₂ O	+1,63
54	H ⁺ , O ₃ , O ₂ (Pt)	O ₃ + 2H ⁺ + 2e → O ₂ + H ₂ O	+2,07
55	H ⁺ , O(Pt)	O + 2H ⁺ + 2e → H ₂ O	+2,422
56	F ₂ , F ⁻	$\frac{1}{2}$ F ₂ + e → F ⁻	+2,87
Электроды второго рода			
57	Ca, Ca(OH) ₂ , OH ⁻	Ca(OH) ₂ + 2e → Ca + 2OH ⁻	-3,02
58	Sr, Sr(OH) ₂ , OH ⁻	Sr(OH) ₂ + 2e → Sr + 2OH ⁻	-2,88
59	Ba, Ba(OH) ₂ , OH ⁻	Ba(OH) ₂ + 2e → Ba + 2OH ⁻	-2,81
60	Mg, Mg(OH) ₂ , OH ⁻	Mg(OH) ₂ + 2e → Mg + 2OH ⁻	-2,69
61	U, UO ₂ , OH ⁻	UO ₂ + 2H ₂ O + 4e → U + 4OH ⁻	-2,39
62	Al, Al(OH) ₃ , OH ⁻	Al(OH) ₃ + 3e → Al + 3OH ⁻	-2,30

№ по пор.	Электрод	Реакция	E°, В
63	Mn, Mn(OH) ₂ , OH ⁻	Mn(OH) ₂ + 2e → Mn + 2OH ⁻	-1,55
64	Mn, MnCO ₃ , CO ₃ ²⁻	MnCO ₃ + 2e → Mn + CO ₃ ²⁻	-1,50
65	Cr, Cr(OH) ₃ , OH ⁻	Cr(OH) ₃ + 3e → Cr + 3OH ⁻	-1,48
66	Zn, ZnS, S ²⁻	ZnS + 2e → Zn + S ²⁻	-1,405
67	Zn, Zn(OH) ₂ , OH ⁻	Zn(OH) ₂ + 2e → Zn + 2OH ⁻	-1,245
68	Cd, CdS, S ²⁻	CdS + 2e → Cd + S ²⁻	-1,175
69	Zn, ZnCO ₃ , CO ₃ ²⁻	ZnCO ₃ + 2e → Zn + CO ₃ ²⁻	-1,06
70	Fe, FeS, S ²⁻	FeS + 2e → Fe + S ²⁻	-0,95
71	Pb, PbS, S ²⁻	PbS + 2e → Pb + S ²⁻	-0,93
72	Cu, Cu ₂ S, S ²⁻	Cu ₂ S + 2e → 2Cu + S ²⁻	-0,89
73	Fe, Fe(OH) ₂ , OH ⁻	Fe(OH) ₂ + 2e → Fe + 2OH ⁻	-0,877
74	Si, SiO ₂ , H ⁺	SiO ₂ + 4H ⁺ + 4e → Si + 2H ₂ O	-0,857
75	Cd, Cd(OH) ₂ , OH ⁻	Cd(OH) ₂ + 2e → Cd + 2OH ⁻	-0,809
76	Fe, FeCO ₃ , CO ₃ ²⁻	FeCO ₃ + 2e → Fe + CO ₃ ²⁻	-0,756
77	Tl, TlI, I ⁻	TlI + e → Tl + I ⁻	-0,753
78	Cd, CdCO ₃ , CO ₃ ²⁻	CdCO ₃ + 2e → Cd + CO ₃ ²⁻	(-0,74)
79	Co, Co(OH) ₂ , OH ⁻	Co(OH) ₂ + 2e → Co + 2OH ⁻	-0,73
80	Ni, Ni(OH) ₂ , OH ⁻	Ni(OH) ₂ + 2e → Ni + 2OH ⁻	-0,72
81	Hg, HgS, S ²⁻	HgS + 2e → Hg + S ²⁻	-0,69
82	Ag, Ag ₂ S (α), S ²⁻	Ag ₂ S (α) + 2e → 2Ag + S ²⁻	-0,66
83	Pb, PbO, OH ⁻	PbO + H ₂ O + 2e → Pb + 2OH ⁻	-0,578
84	Tl, TlCl, Cl ⁻	TlCl + e → Tl + Cl ⁻	-0,557
85	Pb, PbCO ₃ , CO ₃ ²⁻	PbCO ₃ + 2e → Pb + CO ₃ ²⁻	-0,506
86	Bi, Bi ₂ O ₃ , OH ⁻	Bi ₂ O ₃ + 3H ₂ O + 3e → 2Bi + 6OH ⁻	-0,46
87	Pb, PbI ₂ , I ⁻	PbI ₂ + 2e → Pb + 2I ⁻	-0,265
88	Pb, PbSO ₄ , SO ₄ ²⁻	PbSO ₄ + 2e → Pb + SO ₄ ²⁻	-0,359
89	Cu, Cu ₂ O, OH ⁻	Cu ₂ O + H ₂ O + 2e → 2Cu + 2OH ⁻	-0,358
90	Tl, TlOH, OH ⁻	TlOH + e → Tl + OH ⁻	-0,345
91	Pb, PbBr ₂ , Br ⁻	PbBr ₂ + 2e → Pb + 2Br ⁻	-0,284
92	Pb, PbCl ₂ , Cl ⁻	PbCl ₂ + 2e → Pb + 2Cl ⁻	-0,268
93	Cu, CuI, I ⁻	CuI + e → Cu + I ⁻	-0,185
94	Ag, AgI, I ⁻	AgI + e → Ag + I ⁻	-0,152
95	Ge, GeO ₂ , H ⁺	GeO ₂ + 4H ⁺ + 4e → Ge + 2H ₂ O	-0,15
96	Hg, Hg ₂ I ₂ , I ⁻	$\frac{1}{2}$ Hg ₂ I ₂ + e → Hg + I ⁻	-0,040
97	Ag, AgCN, CN ⁻	AgCN + e → Ag + CN ⁻	-0,017
98	Ag, AgBr, Br ⁻	AgBr + e → Ag + Br ⁻	+0,071
99	Hg, HgO, OH ⁻	HgO + H ₂ O + 2e → Hg + 2OH ⁻	+0,098
100	Cu, CuCl, Cl ⁻	CuCl + e → Cu + Cl ⁻	+0,137
101	Hg, Hg ₂ Br ₂ , Br ⁻	$\frac{1}{2}$ Hg ₂ Br ₂ + e → Hg + Br ⁻	+0,140
102	Sb, Sb ₂ O ₃ , H ⁺	Sb ₂ O ₃ + 6H ⁺ + 6e → 2Sb + 3H ₂ O	+0,152
103	Ag, AgCl, Cl ⁻	AgCl + e → Ag + Cl ⁻	+0,222
104	Hg, Hg ₂ Cl ₂ , Cl ⁻	$\frac{1}{2}$ Hg ₂ Cl ₂ + e → Hg + Cl ⁻	+0,268*
105	Ag, Ag ₂ O, OH ⁻	Ag ₂ O + H ₂ O + 2e → 2Ag + 2OH ⁻	+0,345
106	Ag, AgIO ₃ , IO ₃ ⁻	AgIO ₃ + e → Ag + IO ₃ ⁻	+0,354
107	Bi, Bi ₂ O ₃ , H ⁺	Bi ₂ O ₃ + 6H ⁺ + 6e → 2Bi + 3H ₂ O	+0,371
108	Ag, Ag ₂ CrO ₄ , CrO ₄ ²⁻	Ag ₂ CrO ₄ + 2e → 2Ag + CrO ₄ ²⁻	+0,464

Потенциалы каломельных электродов E, В

Hg, Hg₂Cl₂, KCl, насыщ. +0,2415Hg, Hg₂Cl₂, KCl, 1,0 M +0,2812Hg, Hg₂Cl₂, KCl, 0,1 M +0,3341

№ по пор.	Электрод	Реакция	E°, В
109	Hg, Hg ₂ SO ₄ , SO ₄ ²⁻	Hg ₂ SO ₄ + 2e → 2Hg + SO ₄ ²⁻	+0,615
110	Ag, Ag ₂ C ₂ H ₃ O ₂ , C ₂ H ₃ O ₂ ⁻	Ag ₂ C ₂ H ₃ O ₂ + e → Ag + C ₂ H ₃ O ₂ ⁻	+0,643
111	Ag, Ag ₂ SO ₄ , SO ₄ ²⁻	Ag ₂ SO ₄ + 2e → 2Ag + SO ₄ ²⁻	+0,654
Окислительно-восстановительные электроды			
112	SO ₃ ²⁻ , S ₂ O ₃ ²⁻ , OH ⁻ (Pt)	2SO ₃ ²⁻ + 2H ₂ O + 2e → S ₂ O ₃ ²⁻ + 4OH ⁻	-1,12
113	SO ₄ ²⁻ , SO ₃ ²⁻ , OH ⁻ (Pt)	SO ₄ ²⁻ + H ₂ O + 2e → SO ₃ ²⁻ + 2OH ⁻	-0,93
114	U ⁴⁺ , U ³⁺ (Pt)	U ⁴⁺ + e → U ³⁺	-0,607
115	SO ₃ ²⁻ , S ₂ O ₃ ²⁻ , OH ⁻ (Pt)	2SO ₃ ²⁻ + 3H ₂ O + 4e → S ₂ O ₃ ²⁻ + 6OH ⁻	-0,58
116	Cr ³⁺ , Cr ²⁺ (Pt)	Cr ³⁺ + e → Cr ²⁺	-0,408
117	H ⁺ , H ₃ PO ₄ , H ₃ PO ₃ (Pt)	H ₃ PO ₄ + 2H ⁺ + 2e → H ₃ PO ₃ + H ₂ O	-0,276
118	V ³⁺ , V ²⁺ (Pt)	V ³⁺ + e → V ²⁺	-0,255
119	H ⁺ , SO ₄ ²⁻ , S ₂ O ₃ ²⁻ (Pt)	2SO ₄ ²⁻ + 4H ⁺ + 2e → S ₂ O ₃ ²⁻ + 2H ₂ O	-0,22
120	NO ₂ ⁻ , NO ₂ ⁻ , OH ⁻ (Pt)	NO ₂ ⁻ + H ₂ O + 2e → NO ₂ ⁻ + 2OH ⁻	+0,01
121	UO ₂ ²⁺ , UO ₂ ²⁺ (Pt)	UO ₂ ²⁺ + e → UO ₂ ²⁺	+0,05
122	H ⁺ , HCOOH, HCON(Pt)	HCOOH + 2H ⁺ + 2e → HCON + H ₂ O	+0,056
123	S ₄ O ₆ ²⁻ , S ₂ O ₃ ²⁻ (Pt)	S ₄ O ₆ ²⁻ + 2e → 2S ₂ O ₃ ²⁻	+0,08
124	Sn ⁴⁺ , Sn ²⁺ (Pt)	Sn ⁴⁺ + 2e → Sn ²⁺	+0,15
125	Cu ²⁺ , Cu ⁺ (Pt)	Cu ²⁺ + e → Cu ⁺	+0,153
126	H ⁺ , H ₂ SO ₄ , SO ₄ ²⁻ (Pt)	4H ⁺ + SO ₄ ²⁻ + 2e → H ₂ SO ₃ + H ₂ O	+0,172
127	ClO ₃ ⁻ , ClO ₂ ⁻ , OH ⁻ (Pt)	ClO ₃ ⁻ + H ₂ O + e → ClO ₂ ⁻ + 2OH ⁻	+0,33
128	H ⁺ , UO ₂ ²⁺ , U ⁴⁺ (Pt)	UO ₂ ²⁺ + 4H ⁺ + 2e → U ⁴⁺ + 2H ₂ O	+0,33
129	Fe(CN) ₆ ³⁻ , Fe(CN) ₆ ⁴⁻ (Pt)	Fe(CN) ₆ ³⁻ + e → Fe(CN) ₆ ⁴⁻	+0,36
130	ClO ₄ ⁻ , ClO ₃ ⁻ , OH ⁻ (Pt)	ClO ₄ ⁻ + H ₂ O + 2e → ClO ₃ ⁻ + 2OH ⁻	+0,36
131	H ⁺ , S ₂ O ₃ ²⁻ , H ₂ SO ₃ (Pt)	2H ₂ SO ₃ + 2H ⁺ + 4e → S ₂ O ₃ ²⁻ + 3H ₂ O	+0,400
132	H ⁺ , S ₄ O ₆ ²⁻ , H ₂ SO ₃ (Pt)	4H ₂ SO ₃ + 4H ⁺ + 6e → S ₄ O ₆ ²⁻ + 6H ₂ O	+0,51
133	I ₃ ⁻ , I ⁻ (Pt)	I ₃ ⁻ + 2e → 3I ⁻	+0,536
134	H ⁺ , H ₃ AsO ₄ , HAsO ₂ (Pt)	H ₃ AsO ₄ + 2H ⁺ + 2e → HAsO ₂ + 2H ₂ O	+0,560
135	H ⁺ , S ₂ O ₃ ²⁻ , H ₂ SO ₃ (Pt)	S ₂ O ₃ ²⁻ + 4H ⁺ + 2e → 2H ₂ SO ₃	+0,57
136	MnO ₄ ⁻ , OH ⁻ , MnO ₂ (Pt)	MnO ₄ ⁻ + 2H ₂ O + 3e → MnO ₂ + 4OH ⁻	+0,588
137	H ⁺ , UO ₂ ²⁺ , U ⁴⁺ (Pt)	UO ₂ ²⁺ + 4H ⁺ + e → U ⁴⁺ + 2H ₂ O	+0,62
138	ClO ₂ ⁻ , ClO ₂ ⁻ , OH ⁻ (Pt)	ClO ₂ ⁻ + H ₂ O + 2e → ClO ₂ ⁻ + 2OH ⁻	+0,66
139	PtCl ₂ ²⁻ , PtCl ₂ ²⁻ , Cl ⁻ (Pt)	PtCl ₂ ²⁻ + 2e → PtCl ₂ ²⁻ + 2Cl ⁻	+0,68
140	H ⁺ , C ₆ H ₄ O ₂ , C ₆ H ₄ (OH) ₂ (Pt)	C ₆ H ₄ O ₂ + 2H ⁺ + 2e → C ₆ H ₄ (OH) ₂	+0,699
141	Fe ³⁺ , Fe ²⁺ (Pt)	Fe ³⁺ + e → Fe ²⁺	+0,771
142	ClO ₂ ⁻ , Cl ⁻ , OH ⁻ (Pt)	ClO ₂ ⁻ + H ₂ O + 2e → Cl ⁻ + 2OH ⁻	+0,89
143	H ⁺ , NO ₃ ⁻ , HNO ₂ (Pt)	NO ₃ ⁻ + 3H ⁺ + 2e → HNO ₂ + H ₂ O	+0,94
144	Pu ⁴⁺ , Pu ³⁺ (Pt)	Pu ⁴⁺ + e → Pu ³⁺	+0,97
145	H ⁺ , N ₂ O ₄ , HNO ₂ (Pt)	N ₂ O ₄ + 2H ⁺ + 2e → 2HNO ₂	+1,07
146	H ⁺ , ClO ₄ ⁻ , ClO ₃ ⁻ (Pt)	ClO ₄ ⁻ + 2H ⁺ + 2e → ClO ₃ ⁻ + H ₂ O	+1,19
147	H ⁺ , IO ₃ ⁻ , I ₂ (Pt)	IO ₃ ⁻ + 6H ⁺ + 5e → $\frac{1}{2}$ I ₂ + 3H ₂ O	+1,195
148	H ⁺ , ClO ₃ ⁻ , HClO ₂ (Pt)	ClO ₃ ⁻ + 3H ⁺ + 2e → HClO ₂ + H ₂ O	+1,21
149	H ⁺ , Mn ²⁺ , MnO ₂ (Pt)	MnO ₂ + 4H ⁺ + 2e → Mn ²⁺ + 2H ₂ O	+1,23

№ по пор.	Электрод	Реакция	E°, В
150	Tl ³⁺ , Tl ⁺ (Pt)	Tl ³⁺ + 2e → Tl ⁺	+1,25
151	H ⁺ , Cr ₂ O ₇ ²⁻ , Cr ³⁺ (Pt)	Cr ₂ O ₇ ²⁻ + 14H ⁺ + 6e → 2Cr ³⁺ + 7H ₂ O	+1,33
152	H ⁺ , PbO ₂ , Pb ²⁺ (Pt)	PbO ₂ + 4H ⁺ + 2e → Pb ²⁺ + 2H ₂ O	+1,455
153	H ⁺ , MnO ₄ ⁻ , Mn ²⁺ (Pt)	MnO ₄ ⁻ + 8H ⁺ + 5e → Mn ²⁺ + 4H ₂ O	+1,51
154	Ce ⁴⁺ , Ce ³⁺ (Pt)	Ce ⁴⁺ + e → Ce ³⁺	+1,61
155	H ⁺ , HClO ₂ , HClO(Pt)	HClO ₂ + H ⁺ + 2e → HClO + H ₂ O	+1,64
156	PbO ₂ , H ⁺ , SO ₄ ²⁻ , PbSO ₄ (Pt)	PbO ₂ + 4H ⁺ + SO ₄ ²⁻ + 2e → PbSO ₄ + 2H ₂ O	+1,685
157	H ⁺ , MnO ₄ ⁻ , MnO ₂ (Pt)	MnO ₄ ⁻ + 4H ⁺ + 3e → MnO ₂ + 2H ₂ O	+1,695
158	H ⁺ , H ₂ O ₂ (Pt)	H ₂ O ₂ + 2H ⁺ + 2e → 2H ₂ O	+1,776
159	Co ³⁺ , Co ²⁺ (Pt)	Co ³⁺ + e → Co ²⁺	+1,81
160	S ₂ O ₈ ²⁻ , SO ₄ ²⁻ (Pt)	S ₂ O ₈ ²⁻ + 2e → 2SO ₄ ²⁻	+2,010
161	OH ⁻ , OH ⁻ (Pt)	OH ⁻ + e → OH ⁻	+2,02

80. Потенциалы металлов в жидком аммиаке


Реакция	E°, В	Реакция	E°, В	Реакция	E°, В
Li ⁺ + e → Li	-2,34	Ca ²⁺ + 2e → Ca	-2,11	K ⁺ + e → K	-2,04
Sr ²⁺ + 2e → Sr	-2,3	→ Cs	-2,08	Na ⁺ + e → Na	-1,85
→ Ba	-2,2	Rb ⁺ + e → Rb	-2,06	Mg ²⁺ + 2e → Mg	-1,74

81. Температурные коэффициенты электродвижущей силы

Гальванический элемент	t, °C	E, В	(dE/dT) · 10 ⁴ , В/К
Zn ZnCl ₂ (0,555m) AgCl Ag	0	1,015	-4,02
Pb PbI ₂ KI (a = 1,0) AgI Ag	25	0,21069	-1,38
Cd CdCl ₂ · 2,5H ₂ O CdCl ₂ насыщ. PbCl ₂ Pb	25	0,18801	-4,8
Pb Pb(C ₂ H ₃ O ₂) ₂ (0,555m) Cu(C ₂ H ₃ O ₂) ₂ насыщ. Cu	25	0,4764	+3,85
Ag AgCl KCl (a = 1,0) Hg ₂ Cl ₂ Hg	5—38 38—70	0,2680—0,2647 0,2647—0,2477	-2,39 -2,37

82. Диффузионные потенциалы в водных растворах при 25 °C

Диффузионные потенциалы E_D измерены в гальванических элементах типа:



где E_D — единственная разность потенциалов; $E_D = \frac{RT}{F} \ln \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$, где λ_i — молярная электрическая проводимость соответствующего раствора.

Диффузионные потенциалы на поверхности раздела равных электролитов при одинаковой концентрации

Граница	$c_1 = c_2$	$E_{D\text{набл.}}$ мВ	$E_{D\text{выч.}}$ мВ
HCl/KCl	0,1	26,8	28,5
	0,01	25,7	27,5
HCl/NaCl	0,1	33,1	33,4
	0,01	33,1	32,0
HCl/LiCl	0,1	34,9	36,1
	0,01	33,8	34,6
KCl/LiCl	0,1	8,8	7,6
	0,01	8,2	7,1
NaCl/LiCl	0,1	2,6	2,8
	0,01	2,6	2,5

Диффузионные потенциалы на поверхности раздела одного и того же электролита различной концентрации

Электролит	c_1	c_2	E_D , мВ
HCl	0,005	0,01	+11,1
	0,005	0,04	+33,3
NaCl	0,005	0,01	-3,7
	0,005	0,04	-11,1
KCl	0,005	0,01	-0,3
	0,005	0,04	-1,0

83. Влияние поверхностно-активного вещества на межфазный скачок потенциала

Представлены значения скачка потенциала на поверхности раздела раствор 0,01 М HCl, покрытый пленкой миристиновой кислоты, — воздух (по Фрумкин).

Адсорбция $\Gamma \cdot 10^{14}$, число молекул на 1 см²

E , мВ

84. Значения множителя $2,303 RT/F$ в интервале 0—100 °C

t , °C	$2,303 RT/F$, В	t , °C	$2,303 RT/F$, В	t , °C	$2,303 RT/F$, В
0	0,0542	22	0,0586	45	0,0631
5	0,0552	23	0,0588	50	0,0641
10	0,0562	24	0,0590	60	0,0661
15	0,0572	25	0,0592	70	0,0681
18	0,0578	30	0,0601	80	0,0701
19	0,0580	35	0,0611	90	0,0721
20	0,0582	40	0,0621	100	0,0740
21	0,0584				

85. Работа выхода электронов

Вещество	$W \cdot 10^{-5}$, Дж/моль	W , эВ	Вещество	$W \cdot 10^{-5}$, Дж/моль	W , эВ
Ag	4,15	4,3	Mo	4,15	4,3
Al	4,15	4,3	Na	2,22	2,3
Bi	4,34	4,5	Ni	4,34	4,5
C (графит)	4,53	4,7	Pb	3,86	4,0
Cd	3,86	4,0	Pt	4,73	4,9
Co	4,25	4,4	Sb	4,44	4,6
Cr	4,44	4,6	Sn	4,15	4,3
Cu	4,34	4,5	Ti	3,86	4,0
Fe	4,53 (4,20)	4,7 (4,35)	Tl	3,76	3,9
Ga	3,96	4,1	V	3,96	4,1
Hg	4,34	4,5	W	4,34	4,5
K	2,12	2,2	Zn	4,05	4,2
Mg	3,47	3,6	Zr	3,76	3,9
Mn	3,67	3,8			

86. Потенциалы нулевого заряда

Потенциалы нулевого заряда измерены по минимуму дифференциальной емкости диффузного слоя. [110] и т. д. — грань монокристалла

Металл	Среда (с, моль/л.)	$E_{в. з'}$ В	Металл	Среда (с, моль/л.)	$E_{н. з'}$ В
Ag [110]	NaF (0,01)	$-0,77 \pm 0,02$	Co	—	$-0,40$
Ag [100]	Na ₂ SO ₄ (0,0025)	$-0,65 \pm 0,02$	Bi	KF (0,002)	$-0,39 \pm 0,02$
Ag [111]	KF (0,001)	$-0,46 \pm 0,02$	Fe	—	$-0,35$
Ag поликристалл	Na ₂ SO ₄ (0,0025)	$-0,67 \pm 0,03$	Mo	—	$-0,30$
Cd	NaF (0,001)	$-0,75 \pm 0,02$	Ni	—	$-0,25$
Tl	NaF (0,001)	$-0,71 \pm 0,04$	W	—	$-0,25$
Ta	—	$-0,70$	Re	—	$-0,20$
Ti	—	$-0,70$	Hg	NaF (0,001)	$-0,19 \pm 0,01$
Ga (ж.)	—	$-0,65$	Sb	KClO ₄ (0,002)	$-0,15 \pm 0,02$
In	NaF (0,003)	$-0,65 \pm 0,02$	Rh	—	0,00
Nb	—	$-0,60$	Ir	—	0,05
Zn	—	$-0,60$	Cu	NaF (0,01)	$0,09 \pm 0,02$
Pb	NaF (0,001)	$-0,56$	Pd	—	0,10
Cr	—	$-0,45$	Pt	—	0,15
Sn	Na ₂ SO ₄ (0,00125)	$-0,43 \pm 0,02$	Au	—	0,20

87. Токи обмена

i_0 — ток обмена при равновесном потенциале; i_0^* — при стандартном потенциале; τ — число электронов.

Система	Электрод	Среда	i_0 , А/см ²	i_0^* , А/см ²	Коэффициент обмена β
Ag ⁺ , Ag	Ag	10 г AgNO ₃ в 100 мл H ₂ O Ag(CN) ₂ ⁻	Комн. 25	$1,1 \cdot 10^{-2}$	$2,8 \cdot 10^{-3}$ —
Cd ²⁺ , Cd	Cd	15 г CdSO ₄ в 100 мл H ₂ O CdSO ₄	Комн. 25	$1,4 \cdot 10^{-2}$	— $2 \cdot 10^{-2}$
Co ²⁺ , Co	Co	0,1—2,0 н. CoCl ₂ CoSO ₄	Комн. 25	$8 \cdot 10^{-7}$	$1,3 \cdot 10^{-5}$ 0,5 0,3
Cu ²⁺ , Cu	Cu	2,0 н. CuSO ₄ 1 м CuSO ₄ 0,001 м Cu(NO ₃) ₂ 0,01 м Cu(NO ₃) ₂ 0,1 м Cu(NO ₃) ₂ CuSO ₄	Комн. 20 20 20 25	$2 \cdot 10^{-5}$ $2 \cdot 10^{-6}$ 10^{-8} 10^{-11} 10^{-10} —	— — — — — $5 \cdot 10^{-2}$ $\beta_z = 0,5$ $\beta_z = 0,22$ $\beta_z = 0,55$ $\beta_z = 0,76$ 0,25
Fe ²⁺ , Fe	Fe	2,0 н. FeSO ₄ 1,0 м FeSO ₄ FeSO ₄	Комн. 25	10^{-8} 10^{-8} —	— — $5 \cdot 10^{-5}$ — 0,5 0,5
Hg ₂ ²⁺ , Hg	Hg	$2 \cdot 10^{-3}$ н. Hg ₂ (NO ₃) ₂ в 2,0 н. HClO ₄ 2,0 н. Hg ₂ (ClO ₄) ₂	Комн. 25	$5 \cdot 10^{-4}$	— 15 — 0,3

Система	Электрод	Среда	t , °C	i_0 , А/см ²	i_0^* , А/см ²	Коэффициент обмена в
Ni^{2+} , Ni	Ni	0,1 н. NiSO_4 в 2,0 н. H_2SO_4 (рН = 0,0) 0,5 м NiSO_4 в ацетатном буферном растворе (рН = 6,7) 1,0 м NiSO_4	Комн. 20	$8,3 \cdot 10^{-10}$ 10^{-9}	—	$0,35-0,40$ $\beta z = 0,36$
Pb^{2+} , Pb	Pb	$2 \cdot 10^{-3}$ н. $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ в 1,0 н. KNO_3	Комн.	10^{-4}	—	—
Zn^{2+} , Zn	Zn	$2 \cdot 10^{-3}$ н. $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$ в 1,0 н. KNO_3 1 м ZnSO_4 2 н. ZnSO_4 ZnSO_4	Комн. » » 25	$7 \cdot 10^{-4}$ $2 \cdot 10^{-5}$ $2 \cdot 10^{-5}$ —	— — — $7 \cdot 10^{-1}$	— — — 0,35
Ce^{4+} , Ce^{3+}	Pt	H_2SO_4	25	—	$4 \cdot 10^{-5}$	—
Cr^{3+} , Cr^{2+}	Hg	KCl	25	—	$1 \cdot 10^{-6}$	—
Fe^{3+} , Fe^{2+}	Ir Pd Pt Rh	H_2SO_4 H_2SO_4 H_2SO_4 H_2SO_4	25 25 25 25	— — — —	$1,58 \cdot 10^{-3}$ $6,3 \cdot 10^{-3}$ $2,5 \cdot 10^{-3}$ $1,74 \cdot 10^{-3}$	— — — —
$\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}$, $\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}$	C (графит)	H_2SO_4	20	$5,8 \cdot 10^{-1}$	—	0,5
H^+ , H_2	Au Cu Cu Hg Hg Ni Pb Pt Pt W	H_2SO_4 0,1 н. H_2SO_4 0,1 н. H_2SO_4 0,1 н. H_2SO_4 1,0 н. H_2SO_4 H_2SO_4 H_2SO_4 H_2SO_4 0,2 н. H_2SO_4 H_2SO_4	25 25 25 25 Комн. 25 25 25 Комн. 25	— — — — $5 \cdot 10^{-13}$ — — — $5 \cdot 10^{-3}$ —	$2,5 \cdot 10^{-4}$ $8 \cdot 10^{-2}$ $2,4 \cdot 10^{-2}$ $7,95 \cdot 10^{-13}$ — $6,3 \cdot 10^{-6}$ $5 \cdot 10^{-12}$ $7,95 \cdot 10^{-4}$ — $1,26 \cdot 10^{-6}$	— 0,5 0,5 — — — — — — —

88. Перенапряжение при выделении водорода

Приведены константы a и b уравнения Табеля $\eta = a + b \lg i$ в области плотностей тока $i = 10^{-2} \div 10^{-4}$ А/см² при 20 °C.

Металл	Электродит	Опытные данные		Принятые значения a	
		a , В	b , В	Кислые среды	Щелочные среды
Ag	1 н. HCl 1 н.—2 н. H_2SO_4	0,81—0,95 0,60—0,95	0,11—0,12 0,11—0,12	0,95 0,65	—
Al	—	—	—	—	0,73 0,64 ($b = 0,14$)
Au	1 н.—2 н. H_2SO_4	0,62 0,61	0,11—0,12 0,11	— 0,62	—
Bi	0,9 н.—1 н. HCl 0,9 н. H_2SO_4 0,9 н. HClO_4	1,0—1,11 1,05 1,04	0,11—0,12 0,10 0,10	— 1,05	—
Cd	0,5 н.—1,3 н. H_2SO_4	1,45	0,12—0,13	1,45	—
Cr	1,3 н. HCl; 2 н. H_2SO_4	0,80 0,77—0,87	0,13—0,11 0,10—0,13	—	1,05 ($b = 0,16$)
Cu	1 н.—2 н. H_2SO_4	0,78	0,12	0,80	—
Fe	0,005 н.—0,15 н. NaOH 1 н.—2 н. H_2SO_4 0,5 н.—1 н. HCl	0,69—0,89 0,60—0,80 0,66—0,70	0,14—0,12 0,12 0,13—0,12	— 0,70	0,73
Hg	0,01 н.—0,1 н. NaOH 4,8 н.—10,5 н. KOH 1 н.—2 н. H_2SO_4 1 н. HCl	0,73—0,78 0,35—0,34 1,35—1,41 1,36—1,40	0,12 0,07 0,11—0,12 0,11—0,12	— — 1,40	—
	0,1 н.—0,2 н. LiOH 0,1 н.—0,2 н. NaOH 0,002 н.—0,1 н. KOH 0,01 н.—0,02 н. $\text{Ba}(\text{OH})_2$	1,60—1,54 1,46—1,40 1,68—1,43 1,17—1,22	0,10 0,10 0,09 0,04—0,06	— — —	1,50 1,20

Металл	Электролит	Опытные данные		Принятое значение α	
		$\alpha, \text{В}$	$b, \text{В}$	Кислые среды	Щелочные среды
Ni	1 н. — 2 н. H_2SO_4 1 н. HCl 1 н. HClO_4	0,49—0,65 0,71 0,71	0,09—0,12 0,12 0,12	0,62	—
Pb	0,001 н. — 0,1 н. NaOH 0,1 н. — 20 н. H_2SO_4 0,1 н. — 10 н. HCl 1 н. — 8,5 н. HBr 1 н. — 11,6 н. HClO_4	0,72—0,65 1,53—1,41 1,57—1,19 1,47—1,28 1,54—1,45	0,12—0,14 0,12 0,12—0,14 0,12—0,13	1,50 —	0,65 1,36 ($b = 0,25$) 1,36 ($b = 0,25$)
Pd	1 н. HCl ; 2 н. H_2SO_4	0,38	0,11—0,12	0,38	0,53
Pt	1 н. — 2 н. H_2SO_4 0,5 н. HCl	0,1—0,46 0,07	0,10—0,13 0,03	0,23 0,10	—
Sn	2 н. H_2SO_4	0,93—1,24	0,10—0,13	1,22	0,31
Sb	2 н. H_2SO_4	0,90—0,93	0,10	0,93	1,28 ($b = 0,23$)
Ta	1 н. H_2SO_4 1 н. HCl	0,84—1,17 0,98	0,12—0,13 0,14	1,00	—
Ti	2 н. H_2SO_4	0,91—0,97	0,12—0,13	0,97	0,83
Tl	1,6 н. H_2SO_4 1 н. HCl	1,55 1,28	0,14 0,13	1,45	—
W	0,5 н. — 2 н. H_2SO_4 0,5 н. — 1 н. HCl	0,68—0,46 0,68—0,54	0,10—0,12 0,10—0,09	0,60	—
Zn	2 н. H_2SO_4 1 н. HCl	1,24—1,37 1,20	0,12 0,12	1,28	—

89. Свойства гидратированного электрона

Реакция гидратации электрона $e + aq \rightarrow e \cdot aq$.

$$\Delta H_{\text{гидр}}^\circ = -163,59 \text{ кДж/моль}; \Delta S_{\text{гидр}}^\circ = -7,95 \text{ Дж/(моль} \cdot \text{К)}$$


$$\Delta G_{\text{гидр}}^\circ = -156,9 \text{ кДж/моль}$$

Термодинамические функции гидратированного электрона:

$$\Delta H_f^\circ = -153,13 \text{ кДж/моль}; S^\circ = 12,97 \text{ Дж/(моль} \cdot \text{К)}; \Delta G_f^\circ = -156,9 \text{ кДж/моль}$$

Максимум оптического поглощения $\lambda = 720 \text{ нм}$. Коэффициент молярного поглощения $\epsilon = 15\,800 \text{ л/(моль} \cdot \text{см)}$ при $\lambda = 720 \text{ нм}$.

Продолжительность жизни:



$$\geq 300 \text{ мкс в воде при pH} = 7$$

Коэффициент диффузии $D = 4,5 \cdot 10^{-5} \text{ м}^2/\text{с}$ ($\pm 15\%$). Молярная электрическая проводимость $177 \text{ См} \cdot \text{см}^2/\text{моль}$.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И КВАНТОВО-МЕХАНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕЩЕСТВА

90. Парахоры атомов и связей (по Квейлу)

$$P = M\sigma^{1/4}/(\rho_{\text{ж}} - \rho_{\text{п}})$$

где M — молярная масса, кг/моль; σ — поверхностное натяжение жидкости, Н/м; $\rho_{\text{ж}}$ и $\rho_{\text{п}}$ — плотности жидкости и пара, кг/м³. Кроме системы составляющих P Квейла существует система Сегдена.

Атом, группа	$P \cdot 10^7$	Атом, группа	$P \cdot 10^7$
	Дж ^{1/4} · м ^{5/2} /моль		Дж ^{1/4} · м ^{5/2} /моль
Азот	31,11	Мышьяк	96,01
Бор	38,23	Олово	114,68
Бром	120,90	Ртуть	122,68
Водород		Селен	112,00
при атоме N	22,22	Сера	87,30
» » O	17,78	Сурьма	120,90
» » C	27,56	Углерод	16,00
Иод	160,55	группа CH_3	71,12
Кислород	35,20	Фосфор	72,01
в перекисях	37,87	Фтор	46,40
Кремний	55,11	Хлор	98,15

Инкременты связей и циклов

Связь	$P \cdot 10^7$	Цикл	$P \cdot 10^7$	Цикл	$P \cdot 10^7$
	Дж ^{1/4} · м ^{5/2} /моль		Дж ^{1/4} · м ^{5/2} /моль		Дж ^{1/4} · м ^{5/2} /моль
Двойная	33,78	Трехчленный	22,22	Шестичленный	1,42
Тройная	67,56	Четырехчленный	10,67	Семичленный	-7,11
Ионная	-2,84	Пятичленный	5,33		

91. Атомные рефракции (по Эйзенлору)

Атом, группа	$R_D \cdot 10^6$, м³/моль	Атом, группа	$R_D \cdot 10^6$, м³/моль
Азот		Кислород	
в алифатических аминах		в гидроксиде	1,525
первичных	2,322	в карбониле	2,211
вторичных	2,502	в эфире	1,643
третичных	2,840	в перекисях **	2,19
в ароматических аминах		Металлы	
первичных	3,213	в алкильных производных	
в аммиаке	2,48	олово	13,84
в имидах — третичных и	3,776 *	ртуть	12,84
		свинец	18,33
$\begin{array}{c} \text{C} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{N} = \text{C} \end{array}$		Мышьяк	11,55
в нитрилах ($\text{N} \equiv \text{C}$)	3,118 *	в триалкиларсинах	
в уретанах (NCOOR)	2,32	Сера	
в нитрогруппах алифатических соединений		в тиоспиртах	7,81
первичных нитроалканах	6,718	в группе SO_3 сульфитов	11,13
вторичных нитроалканах	6,618	в группе SO_4 сульфатов	11,18
в нитрогруппах ароматических соединений	7,30	в группе SO_3Cl хлорсульфонатов	16,37
Бром	8,865	Фосфор	
Водород	1,100	в диалкиларилфосфатах	9,8—10,4
Иод	13,900	в триалкилфосфатах	9,14
		Хлор	5,967

* С включением инкрементов двойной или тройной связи.

** Только для одного атома кислорода пероксида; второму приписывают значение R_D гидроксильного кислорода в гидропероксидах или эфирного в диалкилпероксидах.

Инкременты связей и циклов

Связь	$R_D \cdot 10^6$, м³/моль	Циклы	$R_D \cdot 10^6$, м³/моль	Циклы	$R_D \cdot 10^6$, м³/моль
Двойная	1,733	Трехчленный	0,71	C_6-C_{15}	—0,55
Тройная	2,398	Четырехчленный	0,48		

92. Поляризуемость молекул

Данные (в расчете на 1 молекулу) приведены для света с бесконечной длиной волны.

Вещество	$\alpha \cdot 10^{20}$, м³	Вещество	$\alpha \cdot 10^{20}$, м³	Вещество	$\alpha \cdot 10^{20}$, м³
Ar	1,626	HCl	2,561	N ₂ O	2,921
Br ₂	6,430	HI	5,199	O ₂	1,561
CCl ₄	10,14—10,04	H ₂ O	1,444	O ₃	2,845
CO	1,926	H ₂ S	3,642	SO ₂	3,774
CO ₂	2,594	He	0,203	SiCl ₄	10,47
Cl ₂	4,500	N ₂	1,734	SnCl ₄	13,04
H ₂	0,802	NH ₃	2,145	Xe	3,999
NB	3,492	NO	1,695		

93. Парциальные молярные рефракции водных растворов солей




Приведены значения $R_a \cdot 10^6$ (в м³/моль) по Гейдвеллеру для света с бесконечной длиной волны. В скобках даны значения R_D (в м³/моль) кристаллов.

Ионы	F ⁻	Cl ⁻	Br ⁻	I ⁻	OH ⁻	NO ₃ ⁻
H ⁺	—	8,22	11,56	17,61	—	—
Li ⁺	—	8,42	11,73	17,66	4,60	10,27
Na ⁺	(2,34)	(7,59)	(10,56)	(15,98)	—	—
K ⁺	—	8,88	12,33	18,24	5,23	10,84
Rb ⁺	(3,02)	(8,52)	(11,56)	(17,07)	—	—
Cs ⁺	4,88	10,93	14,40	20,32	7,25	12,84
	(5,16)	(10,85)	(13,98)	(19,75)	—	—
	6,33	12,40	15,71	21,58	8,49	14,40
	(6,74)	(12,55)	(15,78)	(21,71)	—	—
	—	14,92	18,35	—	—	16,91
	(9,51)	(15,25)	(18,46)	(24,27)	—	—

94. Ионные рефракции

Приведены значения $R_a \cdot 10^6$ (в м³/моль) по Гейдвеллеру (Г), Полингу (П), Фаянсу (Ф) и Ергенсену (Е) для света с бесконечной длиной волны.

Ион	Г	П	Ф	Е
H ⁺	—0,09	0	—0,61	—
Li ⁺	+0,12	0,074	—0,32	0,1
Na ⁺	0,65	0,457	+0,20	1,1
K ⁺	2,71	2,12	2,25	3,0
Rb ⁺	4,10	3,57	3,79	4,8
Cs ⁺	6,71	6,15	6,53	7,3
NH ₄ ⁺	4,65	—	4,31	—
Ag ⁺	4,87	4,33	—	—
Be ²⁺	—0,62	0,20	—	0
Mg ²⁺	—0,60	0,238	—	0,5
Ca ²⁺	+1,60	1,19	0,71	2,3
Ba ²⁺	5,00	3,94	4,37	6,0
Zn ²⁺	1,24	0,72	0,61	2,3
Cd ²⁺	3,26	2,74	8,32	—
Hg ²⁺	3,66	3,14	5,60	—
F ⁻	2,17	2,65	2,60	1,8
Cl ⁻	8,22	9,30	9,05	8,1
Br ⁻	11,60	12,12	12,66	11,6
I ⁻	17,53	18,07	19,22	17,9
OH ⁻	4,42	—	5,15	—
ClO ₃ ⁻	12,16	—	—	—
NO ₃ ⁻	10,10	—	11,01	—

Вещество	Эмпирическая формула	Структурная формула	Растворитель	t, °C	$ \alpha _D^t$
α -D-Манноза	$C_6H_{12}O_6$		Вода	20	14,2 *
d-Никотин	$C_{10}H_{11}N_2$	$CH_3N(CH_2)_3CHC_3H_4N$	Вода	20	77
l-Никотин			Индивидуалы.	20	-79,4
d-Никотин				20	163,17
l-Никотин					-169,3
Сахароза	$C_{12}H_{22}O_{11}$		Вода	20	66,5
β -D-Фруктоза	$C_6H_{12}O_6$		Вода	20	-92 *

97. Энергия (потенциал) ионизации и сродство атомов к электрону. Электроотрицательность атомов по Полингу

Z — номер элемента в Периодической таблице; I, II, ... — ступень ионизации; I — энергия (потенциал) ионизации; E — сродство к электрону; I, E представляют собой теплоту процесса ΔH ; X — электроотрицательность, мера электроакцепторной способности атома по отношению к принятой за единицу акцепторной способности Li.

Z	Элемент	I		II		III		X
		$I \cdot 10^{-2}$, кДж/моль	I , эВ на 1 атом	$I \cdot 10^{-2}$, кДж/моль	I , эВ на 1 атом	$I \cdot 10^{-2}$, кДж/моль	I , эВ на 1 атом	
1	H	13,12	13,60	—	—	—	—	2,15
2	He	23,73	24,59	52,51	54,42	—	—	—
3	Li	5,20	5,39	72,99	75,64	117,7	122	1
5	B	8,01	8,30	24,27	25,16	36,7	38	2,0
6	C	10,86	11,26	23,53	24,38	46,3	48	2,6
7	N	14,02	14,53	28,57	29,60	45,3	47	3,0
8	O	13,14	13,62	33,89	35,12	53,1	55	3,5
9	F	16,81	17,42	33,76	34,98	60,8	63	3,9
11	Na	4,95	5,14	45,65	47,30	69,5	72	0,9
12	Mg	7,38	7,65	14,51	15,04	101,3	105	1,2
13	Al	5,78	5,99	18,17	18,83	27,0	28	1,5
14	Si	7,87	8,15	15,77	16,34	31,8	33	1,9
15	P	10,12	10,49	19,04	19,73	28,9	30	2,1
16	S	10,00	10,36	22,53	23,35	33,8	35	2,6
17	Cl	12,51	12,97	22,97	23,80	38,6	40	3,0
20	Ca	5,90	6,11	11,45	11,87	49,2	51	1,0
32	Ge	7,62	7,90	15,38	15,94	32,8	34	2,0
33	As	9,47	9,82	17,97	18,62	27,0	28	2,0
34	Se	9,41	9,75	20,45	21,19	32,8	34	2,4
35	Br	11,42	11,84	21,04	21,80	34,7	36	2,9
37	Rb	4,03	4,18	23,52	24,37	38,6	40	0,8
38	Sr	5,49	5,69	10,64	11,03	(41,5)	(43)	1,0
50	Sn	7,09	7,34	14,12	14,63	28,9	30	1,8
52	Te	8,69	9,01	17,95	18,6	28,9	30	2,1
53	I	10,08	10,45	18,43	19,10	(29,9)	(31)	2,6
56	Ba	5,03	5,21	96,54	10,00	(35,7)	(37)	0,9

93. Энергия (потенциал) ионизации и средство к электрону молекул и радикалов

I — энергия (потенциал) ионизации; E — средство к электрону; I , E — в кДж/моль; ΔH — в кДж/моль.

Молекула или радикал	$I \cdot 10^{-2}$, кДж/моль	E , кДж/моль	Молекула или радикал	$I \cdot 10^{-2}$, кДж/моль	E , кДж/моль	Молекула или радикал	$I \cdot 10^{-2}$, кДж/моль	E , кДж/моль
CH	$\approx 10,1$	2,51	Адамantan (трициклодекан)	8,93	—	NO	8,94	0,02
CH ₂	10,03	—0,92	H ₂	14,89	—3,45	NO ₂	9,44	2,99
CH ₃	9,50	1,01	H ₂ O	12,17	—4,82	O ₂	11,65	0,42
CH ₄	12,27	—	HF	15,22	—	OH	12,72	1,77
CD ₄	12,42	—	HCl	12,30	—	Si ₃	7,14	—
CH ₂ =CH ₂	10,14	—1,75	HBr	11,21	—	SiO	10,14	—
C ₂ H ₂	8,09	0,87	HI	10,02	—	SiO ₂	11,29	—
CH ₂ =C=CH ₂	9,7	$\approx 2,1$	BO	13,03	2,99	SiH ₄	11,00	—
CH ₃ CH=CH ₂	9,39	—	B ₃ H ₆	11,01	—	P ₂	≈ 10	—
CH ₃ CH ₂ CH ₃	7,82	0,67	C ₂	11,48	3,18	PH	10,23	0,90
CH ₃ -C $\equiv$ -CH ₃	9,26	—	CO	13,52	—	PH ₃	9,77	—
C ₆ H ₁₁	8,20	—	CO ₂	13,31	< 0	S ₂	9,03	$> 1,93$
C ₆ H ₁₂	10,13	1,33	CF	8,60	$> 3,18$	SH	10,13	2,24
C ₆ H ₅	7,82	2,12	CF ₂	11,29	2,56	SO	11,68	1,05
C ₆ H ₅ O	8,49	1,16	CCl	12,45	—	SO ₂	11,91	1,16
C ₆ H ₅ OH	8,20	—1,17	N ₂	15,03	—2,70	Br ₂	10,16	2,42
C ₆ H ₅ CH ₃	8,51	$> 1,25$	NH	12,64	0,21	F ₂	15,15	2,97
C ₆ H ₆	8,92	—1,06	NH ₂	11,00	$\approx 0,9$	Cl ₂	11,08	2,30
C ₆ H ₅ CHO	9,18	0,41	NH ₃	9,79	—	ClO ₂	11,29	2,73
C ₁₀ H ₈	7,84	0,14	ND ₃	≈ 10	—	As ₂	10,62	—
						AsH ₃	9,71	—

99. Нормированные волновые функции водородоподобных атомов

ψ — волновая функция; Z — атомный номер; $\rho = \frac{Zr}{a_0}$, где r — расстояние от ядра; $a_0 = \frac{\hbar^2 \cdot 4\pi\epsilon_0}{m_e e^2} = 0,053$ нм — первый радиус Бора (см табл. 2)

n	l	m	ψ
1	0	0	$\psi_{1s} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} e^{-\rho}$
2	0	0	$\psi_{2s} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} (2 - \rho) e^{-\rho/2}$
2	1	0	$\psi_{2p_z} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} \rho e^{-\rho/2} \cos \theta$
2	1	± 1	$\psi_{2p_x} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} \rho e^{-\rho/2} \sin \theta \cos \varphi$ $\psi_{2p_y} = \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} \rho e^{-\rho/2} \sin \theta \sin \varphi$
3	0	0	$\psi_{3s} = \frac{2}{81\sqrt{3\pi}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} (27 - 18\rho + 2\rho^2) e^{-\rho/3}$

100. Квантовые числа и термы атомов

Спектральное (и, соответственно, энергетическое) состояние атомов описывают термами. l_i и s_i — орбитальное и спиновое квантовые числа, УМ — угловой момент или механический момент количества движения. Взаимодействие УМ незаполненных орбиталей создает спектральные мультиплеты M (дублеты, триплеты и т. д. и — для общности — синглеты). Проекция всех УМ на ось магнитного поля принимают квантованные значения. Посредством векторного сложения находят $L = \sum l_i$, $S = \sum s_i$ и набор полных (внутренних) квантовых чисел $J = L + S$, $L + S - 1$, ..., $L - S$ ($L > S$), что определяет возможные энергии атома. Из полных значений механических УМ получают магнитный момент атома. Мультиплетность спектрального состояния $M = 2S + 1$.

В атоме водорода или водородоподобном атоме с одним электроном каждому значению $l = 0, 1, 2, 3$... сопоставляют буквенное обозначение s, p, d, f ... В много-

электронных атомах каждому $L = 0, 1, 2, 3 \dots$ сопоставляют обозначения $S, P, D, F \dots$

Терм записывают в виде $M \square_J$ или (что то же) $2S + 1 \square_J$. Рамкой обозначен буквенный символ для L . У многоэлектронных атомов в случае единственного электрона вне заполненных оболочек термы получают вид термов атома водорода.

Конфигурация электронов натрия приводит к терму S , а хлора — к терму P .

Существуют единственное основное (стабильное) состояние и множество возбужденных (нестабильных) состояний электронной оболочки атома.

Терм основного состояния определяют на основании правил Хунда: а) электроны заполняют наибольшее число имеющихся уровней, б) из всех возможных термов терм основного состояния обладает максимальной мультиплетностью; в) при одинаковой мультиплетности основным является терм с наибольшим L .

В конфигурациях с менее чем наполовину заполненными оболочками стабилен атом с наименьшим J и с более чем наполовину — с наибольшим J .

Различают эквивалентные и неэквивалентные электроны. У первых n и l равны ($2s^2$ и $2p^2$), у вторых различны ($2s$ и $2p^2$), как это может быть в атоме углерода.

Возможные мультиплетные термы атомов с 1, 2, 3, 4 и 5 электронами на незаполненной оболочке p

m_l — магнитное квантовое число.

Число электронов	Варианты	m_l			L	S	M	T	Терм основного состояния
		+1	0	-1					
1	a		—	—	1	$1/2$	2	2P	2P
	b	—		—	0	$1/2$	2	2S	
2	a		—	—	2	0	1	1D	
	b	↑	↑	—	1	1	3	3P	3P
3	a	—		—	0	0	1	1S	
	b			—	2	$1/2$	2	2D	
4	a	↑	↑	↑	0	$3/2$	4	4S	4S
	b			—	1	$1/2$	2	2P	
5	a			—	2	0	1	1D	
	b		↑	↑	1	1	3	3P	3P
6	a	↑		↑	0	1	3	3S	
	b				1	$1/2$	2	2P	2P
7	a				0	$1/2$	2	2S	
	b			—	2	0	1	1D	

101. Термы двухатомных молекул

При объединении атомов в молекулу возникают взаимодействия электронов с ядрами, вследствие чего образуются связывающие, разрыхляющие (обозначаются звездочкой) и несвязывающие уровни энергии. Заселение энергетических уровней, образованных атомами первых рядов Периодической системы, зависит от взаимодействия орбиталей $\sigma_s - \sigma_z$. При отсутствии взаимодействия заселение происходит в следующем порядке:

$$\sigma(1s)^2 < \sigma^*(1s)^2 < \sigma(2s)^2 < \sigma^*(2s)^2 < \sigma(2p_z)^2 < \pi(2p_x)^2 = \pi(2p_y)^2 < \pi^*(2p_x)^2 = \pi^*(2p_y)^2 < \sigma^*(2p_z)^2 \dots$$

При заметном взаимодействии $\sigma(2p_z)^2$ занимает более высокий уровень, чем $\pi(2p_x)^2 = \pi(2p_y)^2$.

Обозначения квантовых чисел МО линейных молекул:

АО	МО	АО	МО	АО	МО
s, p_z, d_z^2	σ	p_x, p_y, d_{xz}, d_{yz}	π	$d_{xy}, d_{x^2-y^2}$	δ

Обычно, но не всегда связь осуществляется парой электронов с антипараллельными спинами. Но, например, в молекуле H_2^+ — только один связывающий электрон, в молекуле O_2 кроме электронов с антипараллельными спинами существует и пара с параллельными на МО $\pi^*(2p_x) = \pi^*(2p_y)$, создающими парамагнетизм молекулы. Сложение орбитальных квантовых чисел электронов дает проекцию Λ на межъядерную ось. Состояния $\Lambda = 0, 1, 2, 3, \dots$ обозначают буквами $\Sigma, \Pi, \Delta, \Phi$.

Полное квантовое число молекулы $\Omega = |\Lambda + \Sigma|$ (сложение алгебраическое, тогда как Λ и Σ по отдельности получены векторным сложением). Мультиплетность терма молекулы $M = 2S + 1$.

Вращение молекулы создает ядерный УМ, который сочетается с орбитальным и спиновым УМ (см. табл. 100). Ядерный УМ зависит от симметрии молекулы. Поэтому в терм молекулы вводят дополнительные индексы. Если сумма всех l_i — четная, то справа приписывают индекс g (нем. gerade — четный), при нечетной сумме l_i — индекс u (ungerade — нечетный). Кроме того, волновая функция при отражении в плоскости, перпендикулярной оси молекулы, может не менять или менять свой знак. Первое обозначают справа надстрочным знаком $+$, второе — знаком $-$. Каждая пара атомных термов дает группу молекулярных термов, например в случае гетероядерных или состоящих из разных изотопов молекул.

Если молекулы состоят из одинаковых атомов и ионов этих молекул, то в тех случаях, когда исходные атомные состояния были различными, число термов удваивается.

Связывающие орбитали σ являются g -орбиталями, несвязывающие — u -орбиталями. Несвязывающие π -орбитали, обладающие симметрией инверсии, являются g -орбиталями, а связывающие — u -орбиталями.

Возбуждение электрона в молекуле приводит к изменению его квантового числа. Связывающий электрон может стать несвязывающим или разрыхляющим, несвязывающий — разрыхляющим (возможно и превращение несвязывающего и разрыхляющего электрона в связывающий). Переходы состояний молекул разрешены правилами отбора: $+\rightarrow +, -\rightarrow -, \Delta\Lambda = \pm 1$ или 0, $\Delta\Sigma = 0$, $\Delta\Omega = \pm 1$ или 0, $g \rightarrow u$ и $u \rightarrow g$. У гомоядерных молекул переход без изменения квантового вращательного числа молекулы запрещен. Если электрон, не участвующий в химической связи, переходит на более высокий уровень ($p\sigma$ становится $p\pi$ электроном), то такой переход обозначают $p\pi$; если электрон участвует в связи, то такой переход обозначают pl^* .

Вид терма например молекулы водорода $^1\Sigma_g^+$ дает следующую информацию: полный орбитальный момент относительно оси молекулы равен нулю; спины электронов антипараллельны; сумма всех l_i равна нулю.

Термы газообразных двухатомных молекул
в основном электронном состоянии

См. также табл. 107.

Молекула	Терм	Молекула	Терм	Молекула	Терм
$^{107}\text{Ag}^{89}\text{Cl}$	$^1\Sigma^+$	CoCl	$^3\Sigma$	MgCl	$^2\Sigma$
$^{107}\text{Ag}^{127}\text{I}$	$^1\Sigma^+$	CrH	$^6\Sigma^+$	MgO	$^1\Sigma^+$
AgO	$^2\Pi$	CrO	$^5\Pi$	NF	$^3\Sigma^-$
Al^{35}Cl	$^1\Sigma^+$	Cu_2	$^1\Sigma_g^+$	NH	$^3\Sigma^-$
AsO	$^2\Pi_{1/2}$	$^{63}\text{Cu}^{35}\text{Cl}$	$^1\Sigma^+$	NaO	$^2\Pi$
$^{11}\text{B}_2$	$^3\Sigma_g^-$	$^{63}\text{Cu}^{127}\text{I}$	$^1\Sigma^+$	NiH	$^2\Delta_{5/2}$
$^{11}\text{B}^{79}\text{Br}$	$^1\Sigma^+$	Cu^{16}O	$^2\Pi_{3/2}$	PdH	$^2\Sigma^+$
^{11}BH	$^1\Sigma$	F_2^+	$^2\Pi_g$	PtO	$^1\Sigma$
BS	$^2\Sigma^+$	F^{35}Cl	$^1\Sigma^+$	$^{32}\text{S}_2$	$^3\Sigma_g^-$
$^9\text{Be}^{35}\text{Cl}$	$^2\Sigma$	F^{16}O	$^2\Pi$	S_2^+	$^2\Pi_g$
$^9\text{BeH}^+$	$^1\Sigma^+$	FeCl	$^6\Sigma$	SeO	$^3\Sigma^-$
^9BeO	$^1\Sigma^+$	He_2^+	$^2\Sigma_g^+$	Si_2	$^8\Sigma_g^-$
BrO	$^2\Pi_{3/2}$	Hg_2	$^1\Sigma_g^+$	SiCl	$^2\Pi_{1/2}$
CCl	$^2\Pi_{1/2}$	^{39}KBr	$^1\Sigma^+$	SiH	$^2\Pi$
CH	$^2\Pi$	K^{35}Cl	$^1\Sigma^+$	SiO	$^1\Sigma^+$
CS	$^1\Sigma^+$	KF	$^1\Sigma^+$	SiS	$^1\Sigma^+$
$^{40}\text{Ca}_2$	$^1\Sigma_g^+$	Li_2	$^1\Sigma_g^+$	TiN	$^2\Sigma$
^{40}CaH	$^2\Sigma$	$^6\text{Li}^{35}\text{Cl}$	$^1\Sigma$	TiO	$^3\Delta$
CaO	$^1\Sigma^+$	^7LiH	$^1\Sigma^+$	ZnF	$^2\Sigma$
^{35}ClO	$^2\Pi$	Mg_2	$^2\Sigma^+$	ZnH	$^2\Sigma^+$

102. Молекулярные диаграммы по Хюккелю (ЛКАО—МОХ)

Электроны в состоянии p_z образуют в молекулах органических веществ с сопряженными связями π -систему с общей узловой плоскостью. ЛКАО (линейная комбинация атомных орбиталей) описывает систему набором атомных волновых функций $\Psi_{\text{мол}} \equiv \sum c_i \psi_{\text{ат}}$, где c_i определяют вклады атомных орбиталей в молекулярную. Прочность каждой связи определяет сумму энергий: 1) кулоновской — α (взаимодействие электронов с ядерным остовом, или энергия локализации), 2) обменной — β (взаимодействие электронных облаков, или энергия делокализации), 3) перекрывание электронных облаков — s .

Постулаты теории МОХ (молекулярные орбитали по Хюккелю); между собой порознь равны все α и все β , все s равны нулю, энергия связи $\epsilon_i = \alpha - x\beta$.

Обозначения на молекулярных диаграммах: 1) полный порядок связи $P_{ij} = n_{\text{С-Н}} + \sum \nu p_{ij}$, где n — число σ -связей; $\nu = 0, 1, 2$ — число образующих π -связи электронов на данной МО (Ψ_i); $p_{ij} = c_i c_j$ — парциальный порядок связи — мера взаимодействия электронных облаков соседних атомов i и j , причем меньшие порядки связи соответствуют большему межатомным расстояниям; 2) индекс свободной валентности $F = 4,732 - P_{ij}$ (изображен стрелкой с числом над символом углерода); 3) электронная плотность на атоме углерода $\sum c_i^2$ (число около символа углерода).

В качестве примера на рис. 102.1 показаны уровни энергии, отвечающие связывающим и разрыхляющим МО бутадиена по Хюккелю; на рис. 102.2 схематически изображена симметрия электронных облаков и узлы возможных МО бутадиена.

Рис. 102.1. Уровни π -орбиталей бутадиена и их заселение:
I — основное, II — возбужденное состояние.







Рис. 102.2. Распределение электронной плотности и узловые линии орбиталей бутадиена. Узлы отмечены точками, знаки + и — обозначают фазовые состояния электронной плотности. Рост энергии системы соответствует увеличению числа узлов.

Молекулярная диаграмма бутадиена:
в основном состоянии



в возбужденном состоянии



В возбужденном состоянии концевые атомы углерода более активны, чем в основном. Электронная плотность на атомах углерода равна 1 (здесь не указана).

Молекулярные диаграммы различных соединений изображены на рис. 102.3—102.15.

103. Симметрия молекул

В предположении, что все атомы в молекуле занимают неизменные положения, молекулу можно изобразить в виде полиэдра (многогранника) с атомами в вершине.

В системе декартовых координат центр масс помещают в начале координат, координаты z и y находятся в плоскости чертежа, координата x направлена из плоскости чертежа. Главную ось вращения (ось высшего порядка n , проходящую через наибольшее число атомов, совмещают с осью z :



Симметрию полиэдра характеризует совокупность его поворотов вокруг воображаемых осей, проходящих через центр масс полиэдра, и отражений атомов в воображаемых плоскостях, проходящих через оси вращения или перпендикулярных к ним. При вращениях центр масс (точка) не меняет положения, поэтому симметрию называют точечной. Повороты и отражения, приводящие к неотличимым от начальных ориентаций атомов в выбранной системе координат, называют преобразованиями или операциями симметрии, а ось и плоскости — элементами симметрии. Существование элементов симметрии обнаруживается лишь посредством операций симметрии.

Совокупность всех элементов симметрии, или набор всех операций симметрии, которые можно провести над молекулой, образует точечную группу.

Элементы и операции симметрии

Элемент симметрии	Обозначение элемента симметрии	Операция симметрии
Центр симметрии или центр инверсии	C_i или i	Прямолинейный переход от любого атома через центр симметрии на равное расстояние по другую сторону от центра к такому же атому. Иначе, инверсия, при которой половина молекулы получается из другой половины
Ось собственного вращения	C_n	Поворот полиэдра по часовой стрелке вокруг оси C_n на угол $2\pi/n$ (или $360^\circ/n$)
Горизонтальная плоскость зеркального отражения (зеркальная плоскость), перпендикулярная оси C_n (с наибольшим n)	σ_h	Отражение в плоскости симметрии
Вертикальная зеркальная плоскость, содержащая ось C_n	σ_v	То же
Диагональная зеркальная плоскость, содержащая ось C_n ; плоскость делит пополам угол между двумя горизонтальными осями C_2 , перпендикулярными оси C_n	σ_d	»
Ось несобственного вращения или зеркально-поворотная ось	S_n	Поворот по часовой стрелке вокруг оси S_n на угол $2\pi/n$ и последующее отражение в плоскости, перпендикулярной этой оси. Иначе, вращение C_n с отражением в плоскости σ_h (несобственное вращение, а также альтернантность)
Тождественность	$E \equiv C_1$	Операция C_1 , т. е. вращение на угол $2\pi/1$



102.3. Бензол. Рис. 102.4. Нафталин.





Рис. 102.5. Антрацен.




Рис. 102.6. Дифенил.




Рис. 102.7. Бензил.




Рис. 102.8. Анилин.




Рис. 102.9. Пиразин.




Рис. 102.10. Нитробензол.




Рис. 102.11. Тиазол.




Рис. 102.12. α -Нафтиламин.




Рис. 102.13. Тролопон.
 $\mu = 14,7 \cdot 10^{-30}$ Кл·м (4,4 Д).




Рис. 102.14. p -Бензохинон.





Рис. 102.15. Пиридин.

Молекулы изображены схематически.

Символ по Шенфлису	Элементы симметрии группы	Примеры	Символ по Шенфлису	Элементы симметрии группы	Примеры
C_1	E		D_{2h}	$E, C_2, 2C_2, \sigma_h, 2\sigma_v, i$	
C_2	E, C_2		D_{3h}	$E, C_3 (S_6), 3C_2, \sigma_h, 3\sigma_v$	
C_2	E, σ		D_{4h}	$E, C_4 (C_2, S_8), 4C_2, 2\sigma_v, 2\sigma_d, i$	
C_i	E, i		D_{6h}	$E, C_6 (S_6), 5C_2, \sigma_h, 5\sigma_v$	

C_{2v}	$E, C_2, 2\sigma_v$		$D_{\infty h}$	$E, C_{\infty} (S_{\infty}), \infty C_2, \sigma_h, \infty \sigma_v, i$	$H-C \equiv C-H$
C_{3v}	$E, C_3, 3\sigma_v$		D_{3d}	$E, C_2 (S_6), 2C_2, 2\sigma_d$	
C_{4v}	$E, C_4 (C_2), 4\sigma_v$		D_{3d}	$E, C_3 (S_6), 3C_2, 3\sigma_d, i$	
$C_{\infty v}$	$E, C_{\infty}, \infty \sigma_v$	$H-Cl \quad C_{\infty v}O$	D_{6d}	$E, C_6 (S_{12}), 5S_6, 5\sigma_d, i$	
C_{2h}	E, C_2, σ_h, i		T_d	$E, 3C_2 (взаимноперпендикулярные), 4C_3, 6\sigma_d, 3S_6 (содержащие ось C_2)$	
C_{3h}	$E, C_3 (S_6), \sigma_h$		O_h	$E, 3C_4 (3C_2, 3S_4), 4C_2 (4S_6), 3\sigma_h, 6C_2, 6\sigma_d, i$	

Отнесение производят по схеме:



Специальные группы: точечные группы $C_{\infty v}$, $D_{\infty h}$, T_d и T_h (тетраэдрические), O_h (октаэдрические), I_h (правильные додекаэдрические, т. е. двенадцатигранные, и икосаэдрические, т. е. двадцатигранные).

104. Гибридизация и симметрия молекул

AX_mE_n — символ молекулы, где А — центральный (координируемый) атом; X — координируемые частицы; E — неподеленные электронные пары (по Гиллеспи), участвующие в образовании пространственной формы молекулы; индексы m и n — числа связывающих и неподеленных пар. К. ч. — координационное число; АО — атомные орбитали, участвующие в гибридизации; Et — этил.

У молекулы воды два облака двух электронов E и два облака O—H образуют гибридизованный тетраэдр. У линейных несимметричных молекул точечная группа $C_{\infty v}$ у симметричных — $D_{\infty h}$.

Распространенные углы между связями:

К. ч.

Форма молекулы

4

Тетраэдр

4

Плоская квадратная

3

Плоская треугольная

2

Изогнутая

2

Линейная

180

Угол, градусы

60—180

90

109° 28'

0

Форма молекулы

0

Линейная AX_2

2

Изогнутая AX_2E_2

3

Треугольная AX_3

1

Треугольная пирамида AX_3E

0

Тетраэдр AX_4E

2

Плоская квадратная AX_4E_2

0

Тригональная бипирамида AX_5

0

Тригональная призма AX_6

0

Октаэдр AX_6

2

Форма молекулы

2

Линейная AX_2

2

Изогнутая AX_2E_2

3

Треугольная AX_3

3

Треугольная пирамида AX_3E

4

Тетраэдр AX_4E

4

Плоская квадратная AX_4E_2

5

Тригональная бипирамида AX_5

5

Тригональная призма AX_6

6

Октаэдр AX_6

6

Форма молекулы

6

Линейная AX_2

2

Изогнутая AX_2E_2

3

Треугольная AX_3

3

Треугольная пирамида AX_3E

4

Тетраэдр AX_4E

4

Плоская квадратная AX_4E_2

5

Тригональная бипирамида AX_5

5

Тригональная призма AX_6

6

Октаэдр AX_6

6

Форма молекулы

6

Линейная AX_2

2

Изогнутая AX_2E_2

3

Треугольная AX_3

3

Треугольная пирамида AX_3E

4

Тетраэдр AX_4E

4

Плоская квадратная AX_4E_2

5

Тригональная бипирамида AX_5

5

Тригональная призма AX_6

6

Октаэдр AX_6

6

Форма молекулы

6

Линейная AX_2

2

Изогнутая AX_2E_2

3

Треугольная AX_3

3

Треугольная пирамида AX_3E

4

Тетраэдр AX_4E

4

Плоская квадратная AX_4E_2

5

Тригональная бипирамида AX_5

5

Тригональная призма AX_6

6

Октаэдр AX_6

6

Форма молекулы

6

Линейная AX_2

2

Изогнутая AX_2E_2

3

Треугольная AX_3

3

Треугольная пирамида AX_3E

4

Тетраэдр AX_4E

4

Плоская квадратная AX_4E_2

5

Тригональная бипирамида AX_5

5

Тригональная призма AX_6

6

Октаэдр AX_6

6

Форма молекулы

6

Линейная AX_2

2

Изогнутая AX_2E_2

3

Треугольная AX_3

3

Треугольная пирамида AX_3E

4

Тетраэдр AX_4E

4

Плоская квадратная AX_4E_2

5

Тригональная бипирамида AX_5

5

Тригональная призма AX_6

6

Октаэдр AX_6

6

Форма молекулы

6

Линейная AX_2

2

Изогнутая AX_2E_2

3

Треугольная AX_3

3

Треугольная пирамида AX_3E

4

Тетраэдр AX_4E

4

Плоская квадратная AX_4E_2

5

Тригональная бипирамида AX_5

5

Тригональная призма AX_6

6

Октаэдр AX_6

6

Форма молекулы

6

Линейная AX_2

2

Изогнутая AX_2E_2

3

Треугольная AX_3

3

Треугольная пирамида AX_3E

4

Тетраэдр AX_4E

4

Плоская квадратная AX_4E_2

5

Тригональная бипирамида AX_5

5

Тригональная призма AX_6

6

Октаэдр AX_6

6

Форма молекулы

6

Линейная AX_2

2

Изогнутая AX_2E_2

3

Треугольная AX_3

3

Треугольная пирамида AX_3E

4

Тетраэдр AX_4E

4

Плоская квадратная AX_4E_2

5

Тригональная бипирамида AX_5

5

Тригональная призма AX_6

6

Октаэдр AX_6

6

Форма молекулы

6

Линейная AX_2

2

Изогнутая AX_2E_2

3

Треугольная AX_3

3

Треугольная пирамида AX_3E

4

Тетраэдр AX_4E

4

Плоская квадратная AX_4E_2

5

Тригональная бипирамида AX_5

5

Тригональная призма AX_6

6

Октаэдр AX_6

6

Форма молекулы

6

Линейная AX_2

2

Изогнутая AX_2E_2

3

Треугольная AX_3

3

Треугольная пирамида AX_3E

4

Тетраэдр AX_4E

4

Плоская квадратная AX_4E_2

5

Тригональная бипирамида AX_5

5

Тригональная призма AX_6

6

Октаэдр AX_6

6

Форма молекулы

6

Линейная AX_2

2

Изогнутая AX_2E_2

3

Треугольная AX_3

3

Треугольная пирамида AX_3E

4

Тетраэдр AX_4E

4

Плоская квадратная AX_4E_2

5

Тригональная бипирамида AX_5

5

Тригональная призма AX_6

6

Октаэдр AX_6

6

Форма молекулы

6

Линейная AX_2

2

Изогнутая AX_2E_2

3

Треугольная AX_3

3

Треугольная пирамида AX_3E

4

Тетраэдр AX_4E

4

Плоская квадратная AX_4E_2

5

Тригональная бипирамида AX_5

5

Тригональная призма AX_6

6

Октаэдр AX_6

6

Форма молекулы

6

Линейная AX_2

2

Изогнутая AX_2E_2

3

Треугольная AX_3

3

Треугольная пирамида AX_3E

4

Тетраэдр AX_4E

105. Чисто вращательные спектры

Молекула, являющаяся постоянным диполем (группы симметрии C_n , C_s и C_{2v}), дает чисто вращательный спектр. У таких молекул разрешены переходы $\Delta J = \pm 1$ ($\Delta J = +1$ при поглощении и $\Delta J = -1$ при испускании света).

Волновое число уровня, на который переходит молекула, $\omega = 2B_e J$, где B_e — вращательная постоянная (см. табл. 107). В длинноволновой, инфракрасной и микроволновой областях спектра появляются группы равноотстоящих друг от друга линий. Вследствие заметного различия моментов инерции изотопных молекул в спектре обнаруживаются группы линий, отвечающих разным изотопам.

Волновые числа вращательных спектров некоторых молекул $\omega \cdot 10^{-2}$ в м^{-1}

J — вращательное квантовое число нижнего энергетического уровня.

J	CO	HCl	HF	$\text{H}^{12}\text{C}^{14}\text{N}$	$^{14}\text{N}^{16}\text{O}$
0	3,845	20,8	41,08	2,956	0,838
1	7,690	41,6	82,19	5,913	1,676
2	11,534	62,5	123,15	8,869	2,514
3	15,379	83,1	164,00	11,825	3,352
4	19,222	103,7	204,62	14,781	4,190
5	23,065	124,30	244,93	17,736	5,028
6	26,907	145,03	285,01	20,691	5,866
7	30,748	165,51	324,65	23,646	6,704
8	34,588	185,86	363,93	26,599	7,542
9	38,426	206,38	402,82	29,533	8,380
10	42,263	226,50	441,13	32,505	9,217
11	46,098	—	—	35,457	10,055
12	49,932	—	—	38,408	10,893
13	53,763	—	—	41,358	11,730
14	57,593	—	—	44,307	12,568
15	61,420	—	—	47,255	13,405

Частоты микроволнового спектра карбонилсульфида
 $\nu \cdot 10^9$, в Гц

Переход $J \rightarrow J+1$	$^{16}\text{O}^{32}\text{S}$	$^{16}\text{O}^{34}\text{S}$
1 $\rightarrow$ 2	24,3259	23,7323
2 $\rightarrow$ 3	36,4888	—
3 $\rightarrow$ 4	48,6516	47,4624
4 $\rightarrow$ 5	60,8141	—

106. Колебательно-вращательные спектры некоторых молекул

Колебательно-вращательные полосы HCl

$v - v'$	λ , мкм	$\omega \cdot 10^{-3}$, м^{-1}
0—1	3,46	2 885,9
0—2	1,76	5 668,0
0—3	1,190	8 347
0—4	0,916	10 922




Рис. 106.1. Основная полоса колебательно-вращательного спектра HCl (природная смесь изотопов хлора).




Рис. 106.2. Первый обертоп колебательно-вращательного спектра HCl (природная смесь изотопов хлора).

Волновые числа тонкой структуры
колебательно-вращательных полос HCl

См. рис. 106.1 и 106.2.

J	$\omega \cdot 10^{-2}, \text{ м}^{-1}, \text{ H}^{35}\text{Cl}$				$\omega \cdot 10^{-2}, \text{ м}^{-1}, \text{ H}^{37}\text{Cl}$			
	$\lambda = 3.46 \text{ мкм}$		$\lambda = 1.76 \text{ мкм}$		$\lambda = 3.46 \text{ мкм}$		$\lambda = 1.76 \text{ мкм}$	
	P (J)	R (J)	P (J)	R (J)	P (J)	R (J)	P (J)	R (J)
0	—	2906,25	—	5687,81	—	2904,16	—	5683,91
1	2865,09	2925,78	5647,03	5706,21	2862,99	2923,69	5643,10	5702,01
2	2843,56	2944,81	5624,81	5723,29	2841,59	2942,71	5620,92	5719,42
3	2821,49	2963,24	5602,05	5739,29	2819,51	2961,08	5597,98	5735,26
4	2798,78	2980,90	5577,25	5753,88	2796,88	2978,68	5573,40	5749,69
5	2775,79	2997,78	5551,68	5767,50	2773,77	2995,66	5547,74	5763,28
6	2752,03	3014,29	5525,04	5779,54	2750,31	3012,16	5521,23	5775,40
7	2727,75	3039,96	5496,97	5790,54	2726,01	3027,69	5493,12	5786,28
8	2703,06	3044,88	5468,55	5799,94	2701,29	3042,62	5464,67	5796,04
9	2677,73	3059,07	—	—	2675,90	3056,84	—	—
10	2651,97	3072,76	—	—	2650,36	3070,51	—	—
11	2625,74	3085,62	—	—	2624,03	3083,28	—	—
12	2599,00	3098,40	—	—	2597,43	—	—	—




Рис. 106.3. Основная полоса колебательно-вращательного спектра HCl.




Рис. 106.4. Перпендикулярная полоса колебательно-вращательного спектра CH₂Cl₂.

107. Константы двухатомных молекул

Внутренняя энергия молекул состоит из ядерной e_n (nucleon), электронной e_e , колебательной e_v (vibration) и вращательной e_r (rotation) составляющих. Энергия 1 моля молекул — E с теми же индексами.

$$E_v = [(v + 1/2) - x_e(v + 1/2)^2 + y_e(v + 1/2)^3] N_A h \nu_e$$

где v — колебательное квантовое число; x_e и y_e — коэффициенты ангармоничности; ν_e — волновое число собственных колебаний.

$$E_r = j(j+1) B_e N_A h c$$

где j — вращательное квантовое число $B_e = h/8\pi^2 I$ — вращательная постоянная; $I = m^* r_e^2$ — момент инерции; $m^* = M_1 M_2 / N_A (M_1 + M_2)$ — приведенная масса молекул; r_e — равновесное межъядерное расстояние.

$$B_v = B_e - \alpha(v + 1/2)$$








где B_v — вращательная постоянная при учете взаимодействия колебательного и вращательного движений; α — коэффициент взаимодействия.

Молекула	Терм. основного состояния	$\omega_e \cdot 10^{-2}, \text{ м}^{-1}$	$\omega_e x_e \cdot 10^{-2}, \text{ м}^{-1}$	$\omega_e y_e \cdot 10^{-2}, \text{ м}^{-1}$	$r_e \cdot 10^{10}, \text{ м}$	$I \cdot 10^{41}, \text{ кг} \cdot \text{м}^2$	$B_e \cdot 10^{-2}, \text{ м}^{-1}$	α	$D_0^0, \text{ кДж/моль}$
BCl	1Σ	839,12	5,11	—	1,716	40,5	0,691	—	544 ± 20
BN	3Π	1885,44	11,769	—	1,281	16,63	1,684	—	384,9
BO	$2 \Sigma^+$	325,321	1,077	—	1,204	15,53	1,803	—	799,8
Br₂	$1 \Sigma^+$	1854,73	13,389	—2,298	2,281	346,1	0,081	0,000275	190,1
C₂	$1 \Sigma^+$	2028,616	13,111	—	1,243	15,41	1,817	—	594,0
CN	$2 \Sigma^+$	2169,812	13,289	—	1,172	14,75	1,898	—	757,5
CaF	$2 \Sigma^+$	587,8	2,77	—	1,128	14,5	1,93	0,01752	531,1
Cl₂	$1 \Sigma^+$	559,7	2,67	—0,007	1,927	79,4	0,353	—	239,2
D₂	$1 \Sigma^+$	3118,46	64,10	1,2514	1,988	116,3	0,241	0,0017	439,7
F₂	$1 \Sigma^+$	919	13,6	—	0,7416	0,92	30,43	—	154,8
H₂	$1 \Sigma^+$	4396,554	117,973	0,0434	1,416	31,63	0,885	0,014	432,2
H₂	$2 \Sigma^+$	2320	66,7	0,7	0,741	0,46	60,87	3,056	255,7
H⁷⁹Br	1Σ	2649,683	45,52	0,104	1,08	0,98	28,57	—	362,5
H⁸¹Br	1Σ	2990,95	52,819	0,2242	1,414	3,30	8,485	0,2313	427,8
H⁸³Cl	1Σ	—	—	—	1,275	2,64	10,606	0,3019	—

Молекула	Терм. основного состояния	$\omega_e \cdot 10^{-3}, \text{ м}^{-1}$	$\omega_e x_e \cdot 10^{-3}, \text{ м}^{-1}$	$\omega_e y_e \cdot 10^{-3}, \text{ м}^{-1}$	$r_e \cdot 10^8, \text{ м}$	$I \cdot 10^{47}, \text{ кг} \cdot \text{м}^2$	$B_e \cdot 10^{-2}, \text{ м}^{-1}$	α	$D_0^\circ, \text{ кДж/моль}$
HD	—	3817,09	94,958	1,4569	0,7413	0,61	45,68	—	435,5
HF	1Σ	4141,03	90,439	1,178	0,917	1,34	20,896	0,7971	566,3
HI	1Σ	2309,03	39,65	—0,025	1,609	4,30	6,512	0,172	294,6
HS	$2 \Pi_{1/2}$	2711,6	59,9	—	1,34	2,91	9,622	—	340 ± 11
I_2	$1 \Sigma^+ g$	214,543	0,607	—0,0016	2,666	749,0	0,037	0,000121	148,8
$I_2^{19}\text{Br}$	$1 \Sigma^+ g$	268,71	0,83	—	2,469	492,9	0,057	—	175,3
K_2	$1 \Sigma^+ g$	92,64	0,354	—	3,923	499,6	0,056	0,000219	53,6
N_2	$1 \Sigma^+ g$	2358,027	14,1351	—	1,098	14,02	2,000	1,097632	941,6
NBr	$3 \Sigma^+ g$	691,75	4,720	—	1,79	63,41	0,442	—	272 ± 20
NO	2Π	1904,40	14,187	—	1,151	16,42	1,705	—	626,8
NS	$2 \Pi_r$	1220,0	7,75	—	1,495	36,18	0,774	—	481 ± 10
Na_2	1Σ	159,13	0,726	—	3,077	180,7	0,155	0,00079	71,1
Na_2^+	—	(113)	—	—	(3,43)	(224,6)	(0,125)	—	94 ± 2
O_3	$3 \Sigma^- g$	1579,78	11,699	—	1,207	19,35	1,447	0,01579	493,6
O_3^+	$2 \Pi_g$	1903,85	16,18	—	1,116	16,53	1,694	—	642,8
O_2	$2 \Pi_g$	≈ 1107	$\approx 8-9$	—	1,341	23,89	1,172	—	393,7
OH	$2 \Pi_{1/2}$	3737,90	84,965	—	0,971	1,48	18,92	0,708	423,7
OS	$3 \Sigma^-$	1148,19	6,116	—	1,481	38,87	0,720	—	517,0
spP_2	$1 \Sigma^+ g$	780,428	2,804	—	1,894	9,233	0,303	0,000167	485,6
S_3	$3 \Sigma^- g$	725,668	2,844	—	1,889	94,80	0,295	0,0016	422,6
Se_2	O_2^g	—	—	—	2,166	307,6	0,091	—	305,2
SIF	$2 \Pi_{1/2}, 1/2$	857,2	4,74	—	1,601	48,23	0,581	—	535 ± 12
SiN	2Σ	1151,36	6,47	—	1,571	38,30	0,731	—	500 ± 40

108. Главные моменты инерции молекул

m_i — масса ядра; r_i — межъядерное расстояние; $m = \sum m_i$; $r = \sum r_i^2$; α — угол между связями; σ — коэффициент симметрии.

Расположение ядер	Тип молекулы	σ	Момент инерции I
Линейные молекулы			
	Симметричная	2	$\frac{1}{2} m_1 r_{11}^2$
	Асимметричная	1	$(m_1 m_2 / m) r_{12}^2$
	Симметричная	2	$2 m_1 r_{12}^2$
	Асимметричная $r_{12} \neq r_{23}$	1	$(m_1 m_3 / m) (r_{12}^2 + r_{23}^2) + (m_2 / m) (m_1 r_{12}^2 + m_3 r_{23}^2)$
Сферический волчок			
	Тетраэдр	12	$I_1 = I_2 = I_3 = m_1 r_{11}^2$
	Тетраэдр	12	$I_1 = I_2 = I_3 = \frac{8}{3} m_2 r_{12}^2$
Симметричный волчок			
	Тригональная пирамида; β — угол между связью r_{12} и осью симметрии, проходящей через m_1 и центр плоскости $m_2-m_2-m_2$	3	$I_1 = 3 m_2 r_{12}^2 \sin^2 \beta$ $I_2 = I_3 = \frac{3 m_2 r_{12}^2}{2 (1 + 2 m_2 / m_1)} \times [2 - (1 - 3 m_2 / m_1) \sin^2 \beta]$ $I_1 \cdot I_2 \cdot I_3 = 2 m_1^3 (1 - \cos \alpha)^3 \times [1 + \mu \frac{1 + 2 \cos \alpha}{1 - \cos \alpha}]^2 r_{12}^2$ где $\mu = \frac{m_1}{m_1 + 3 m_2}$


Расположение ядер	Тип молекулы	σ	Момент инерции I
Асимметричный волчок			
	Изогнутая симметричная	2	$I_1 = \frac{2m_1m_2}{2m_2 + m_1} r_{12}^2 \cos^2(\alpha/2)$ $I_2 = 2m_2 r_{12}^2 \sin^2(\alpha/2)$ $I_3 = I_1 + I_2$
Плоские молекулы			
	Симметричная	6	$I_1 = I_2 = I_3 =$ $= \left(\frac{27}{4}\right)^{1/2} m_2 r_{12}^2$
	Симметричная	4	$I_1 = 4m_2 r_{12}^2 \sin^2(\alpha/2)$ $I_2 = 4m_2 \left[\frac{1}{2} r_{11} + r_{12} \times \right.$ $\times \cos(\alpha/2) \left. \right]^2 + \frac{1}{2} m_1 r_{11}^2$ $I_3 = I_1 + I_2$

109. Активность колебаний в инфракрасных спектрах и спектрах комбинационного рассеяния

A — невырожденные симметричные колебания (знак A не изменяется при повороте на угол $2\pi/n$ вокруг оси порядка n); B — невырожденные антисимметричные колебания (знак B изменяется); численный индекс — это число n ; E и F — дважды и трижды вырожденные колебания; g и u — симметричные и антисимметричные колебания по отношению к инверсии в центре симметрии; знак $+$ указывает на симметрию, а знак $-$ на антисимметрию по отношению к отражению в плоскости h , перпендикулярной к главной оси; π и σ — колебания, параллельные и перпендикулярные оси молекулы; p и d — поляризованный и неполяризованный свет.


Линейные молекулы XYZ

Обозначение колебания
Класс ИКС
СКР




Линейные молекулы YX₃

Обозначение колебания
Класс ИКС
СКР



Нелинейные молекулы XYZ

Обозначение колебания



Класс ИКС
СКР


A'
акт. (π)
акт. (p)

A'
акт. (π)
акт. (p)

A'
акт. (σ)
акт. (p)


Нелинейные молекулы YX₂

Обозначение колебания
Класс ИКС
СКР




Линейные молекулы X₂Y₂

Обозначение колебания
Класс ИКС
СКР




Пирамидальные молекулы YX₃

Обозначение колебания
Класс ИКС
СКР




Плоские молекулы YX₃

Обозначение колебания
Класс ИКС
СКР








Тетраэдрические молекулы YX₄











Обозначение колебания
Класс ИКС
СКР












110. Структура и константы многоатомных молекул газообразных веществ



Число атомов в молекуле $n \geq 3$. Число характеристических колебаний $3n - 5$ у линейных и $3n - 6$ у нелинейных молекул. Число частот валентных колебаний $\nu - 1$; число частот деформационных колебаний $2\nu - 4$ у линейных и $2\nu - 5$ у нелинейных молекул. Колебания: ν — валентные, δ — деформационные, s — симметричные, as — асимметричные, γ — крутильные, σ — колебания перпендикулярные оси молекулы; π — колебания, параллельные оси молекулы. Характеристическая температура $\theta = 1,439 \theta_K$.

Молекула	Форма и симметрия	Межъядерное расстояние r , 10 ⁻¹⁰ м	Характеристика колебаний		Волновое число $\omega \cdot 10^{-3}$, м ⁻¹	Характеристическая температура θ , К
			направление колебаний	степень вырождения		
CO ₂	Линейная, симметричная O=C=O $D_{\infty h}$	1,162	 $\nu(s)$	2	1388,17 2349,16	1937,6 3380,4
CS ₂	Линейная, симметричная S=C=S $D_{\infty h}$	1,5529	 $\nu(as)$	2	667,4 657,98 1532,5 396,7	960,4 946,8 2205,3 570,8
C ₂ H ₂	Линейная, симметричная H-C≡C-H $D_{\infty h}$	C-H 1,06 C≡C 1,20	 $\nu_1(s)$  $\nu_2(s)$  $\nu(as)$  $\delta(as)$	2 2	3372,5 1973,5 3294,8 611,7 729,1	4853,0 2839,9 4741,2 880,2 1049,2
N ₂ O	Линейная, несимметричная $\begin{matrix} + \\ N=N=O \\ - \end{matrix}$ $C_{\infty v}$	$\begin{matrix} + \\ N=O \end{matrix}$ 1,184 $\begin{matrix} - \\ N=N \end{matrix}$ 1,128	 $\nu(s)$  $\nu(as)$  $\delta(as)$	2	2223,76 1284,9 588,78	3200,0 1849,0 847,2

C ₂ H ₄	Плоская  $\begin{matrix} H & & H \\ & \diagdown & / \\ & C=C & \\ & / & \diagdown \\ H & & H \end{matrix}$ $\angle HCH \approx 117^\circ 22'$ $\angle CCH \approx 121^\circ 19'$ D_{2h}	C-H 1,086 C=C 1,337	 $\nu_1(\pi, s)$  $\nu_2(\pi, s)$  $\nu(\sigma, s)$  $\nu(\sigma, as)$  $\delta(\pi, s)$  $\delta(\pi, as)$  $\delta(\sigma, s)$  $\delta(\sigma, as)$  $\delta'(\sigma, s)$  $\delta'(\sigma, as)$  $\gamma(\tau)$	$\nu_1(\pi, s)$ $\nu_2(\pi, s)$ $\nu(\pi, as)$ $\nu(\sigma, s)$ $\nu(\sigma, as)$ $\delta(\pi, s)$ $\delta(\pi, as)$ $\delta(\sigma, s)$ $\delta(\sigma, as)$ $\delta'(\sigma, s)$ $\delta'(\sigma, as)$ $\gamma(\tau)$	3026,4 1622,6 2988,7 3102,5 3105,5 1934 1443,5 1342,2 1222 1027 949,3 943 826,3	4352 2335 4301 4463 4470 1934 2062 1758 1479 1366 1357 1166
NO ₂	Изогнутая $\begin{matrix} & N & \\ & // & \\ O & & O \end{matrix}$ $\angle ONO \ 134^\circ 15'$ C_{2v}	1,197	 $\nu(s)$  $\nu(as)$  $\delta(s)$	$\nu(s)$ $\nu(as)$ $\delta(s)$	(1319,7) 1617,75 749,8	(1899) 2327,9 1079

Молекула	Форма и симметрия	Межъядерное расстояние r , 10 ⁻¹⁰ нм	Характеристика колебаний			Волновое число $\omega \cdot 10^{-3}$, н ⁻¹	Характеристическая температура θ , К
			направление колебаний	степень вырождения	обозначение		
H ₂ O	Изогнутая  → НОН 104° 31' ± 3' C _{2v}	О—Н 0,9572			ν (s) ν (as) δ (s)	5262,4 5404,6 2294,9	
H ₂ S	Изогнутая  → HSH 92,06° C _{2v}	S—Н 1,336			ν (s) ν (as) δ (s)	3762,4 3780,9 1701,9	
SO ₂	Изогнутая  → OSO 118,5° ± 1° C _{2v}	S=O 1,431			ν (s) ν (as) δ (s)	1656,9 1959,6 744,8	
NH ₃	Тригональная пирамида  → HNH 107° 17' C _{3v}	H—N 1,0156 H—H 1,61	 $\nu(s)$	2 2	ν (s) ν (as) δ (s) δ (as)	4802,2 4955,3 1341,9 2340	


PCl ₅	Тригональная пирамида симметричная	P—Cl 2,043				
	 $\angle \text{ClPCl } 100^\circ \pm 1^\circ$ C_{3v}		 $\nu(as)$	2	$\nu(s)$	741
			 $\delta(s)$	2	$\nu(as)$ $\delta(s)$ $\delta(as)$	515,0 504,0 258,3 136,0
			 $\delta(as)$			
CCl ₄	Правильный тетраэдр  $\Rightarrow$ при $\angle \text{C } 109^\circ 28'$ T_d	C—Cl 1,767	 $\nu(s)$	2	$\nu(s)$	659
			 $\delta(s)$	2	$\nu(as)$	1150
			 $\delta(as)$	3	$\delta(s)$ $\delta(as)$	314 446
CH ₄	Правильный тетраэдр  $\Rightarrow$ при $\angle \text{C } 109^\circ 28'$ T_d	C—H 1,0934	 $\nu(as)$	3	$\nu(s, \text{C—H})$	4196,8
			 $\delta(as)$	2	$\nu(as, \text{C—H})$	4345,1
			 $\delta(s, \text{H—C—H})$	2	$\delta(s, \text{H—C—H})$	2206,8
			 $\delta(as, \text{H—C—H})$	3	$\delta(as, \text{H—C—H})$	1879,6

Молекула	Форма и симметрия	Межъядерное расстояние r , 10, нм	Характеристика колебаний			Волновое число $\omega \cdot 10^{-3}$, м ⁻¹	Характеристическая температура θ , К
			направление колебаний	степень вырождения	обозначение		
CH ₃ Cl	Тетраэдр  $\angle \text{HCH } 108^\circ$ $\angle \text{HCCl } 110^\circ 55'$ C_{3v}	C—H 1,096 C—Cl 1,781		2 2 2	ν (s, C—Cl) ν (s, C—H) ν (as, C—H) δ (s, H—C—H) δ (as, H—C—Cl) δ (as, H—C—H)	1054,5 4270,7 2141,5 1950 1464,2 4379,7	966 4365 1105 525 1755 368
						732,8 2967,8 1488,2 1355,1 1017,5 3043,6	
CHCl ₃	Тетраэдр  $\angle \text{ClCCl } 112^\circ$ C_{3v}	C—H 1,10 C—Cl 1,80 Cl—Cl 2,93		2 2 2	ν (s, C—Cl) ν (s, C—H) ν (as, C—Cl) δ (s, Cl—C—Cl) δ (as, H—C—Cl) δ (as, Cl—C—Cl)	671,1 3032 767,7 364,8 1218 255,5	

111. Силовые постоянные связей в двухатомных и многоатомных молекулах

Силовая постоянная $k = 4\pi^2\nu_e^2 m^* = 4\pi^2 c^2 \omega_e^2 M_1 M_2 / N_A (M_1 + M_2)$, где ν_e и ω_e — частота и волновое число собственных колебаний; c — скорость света в вакууме; M_1 и M_2 — атомные массы; m^* — приведенная масса молекулы.

Молекула	$\omega_e \cdot 10^{-2}$, м ⁻¹	$k \cdot 10^{-2}$, Н/м	Молекула	$\omega_e \cdot 10^{-2}$, м ⁻¹	$k \cdot 10^{-2}$, Н/м
⁷⁹ Br ₂	325,3	2,40	¹ H ⁷⁹ Br	2649,7	4,08
¹² C ₂	1854,8	12,16	¹ H ³⁵ Cl	2990,9	5,12
³⁵ Cl ₂	559,7	3,26	¹ H ¹⁹ F	4141,0	9,60
¹² C ¹⁶ O	2169,8	19,03	¹ H ¹²⁷ I	2309,6	3,14
¹⁹ F ₂	919,0	4,72	¹²⁷ I ₂	214,5	1,72
¹ H ₂	4396,5	5,69	¹⁴ N ₂	2358,0	22,9
² D ₂	3118,4	5,73	¹⁶ O ₂	1579,8	11,7

Связь	Вид связи *	$k \cdot 10^{-2}$, Н/м	Связь	Вид связи	$k \cdot 10^{-2}$, Н/м
C—C	sp^3-sp^3	4,5	C—F		5,96
	$sp^2=sp^2$	9,7	C—Cl **		3,64
	$sp \equiv sp$	15,6	C—Br		3,12
	sp^3-sp^2	4,8	C—I		2,65
	sp^3-sp	4,5	C=O	sp^2-C	12,1
	sp^3 — (карбонильная группа)	4,8	C=O	$sp-C$	15,5
	sp^2 в бензоле	5,2—5,6	C—NH ₂		4,9
	В ядре цикlopentadiенила	5,39	C—NO ₂		4,7
			C≡N	$sp-C$	17,7
			C=N	sp^2-C	10,5
C—H	sp^3	4,8			
	sp^2	5,3			
	sp	5,9			
	В ароматических соединениях	5,0			
	В карбонильных соединениях (с гибридизацией sp^2)	5,3			5,0

* Там, где нет специальных указаний, атомы C предполагаются sp^3 -гибридизованными.

** Силовая постоянная связи C—Cl в молекулах CCl₄, CH₂Cl₂, CH₃Cl, C₂H₅Cl и ClCN $k = 500$ Н/м.

112. Характеристические частоты поглощения групп атомов в молекулах

Интенсивность: пер. — переменная; с. — сильная; сл. — слабая; ср. — средняя.

Группа атомов	Область поглощения		Интенсивность полосы	Примечания
	см ⁻¹	мкм		

Алканы

Валентные колебания C—H

—CH ₃	2975—2950	3,36—3,39	ср.	Присутствие нескольких таких групп дает сильное поглощение
	2885—2860	3,47—3,50	»	
—CH ₂ —	2940—2915	3,40—3,45	»	
—CH ₂ — (циклопропан)	2870—2845	3,49—3,52	»	Ограниченное число данных
—CH—	3080—3040	3,25—3,29	пер.	
	2900—2880	3,45—3,47	сл.	То же

Деформационные колебания C—H

C—CH ₃	1470—1435	6,80—6,97	ср.	Асимметричные деформационные
	1385—1370	7,22—7,30	с.	Симметричные деформационные
C(CH ₃) ₂	1385—1380	7,22—7,25	»	Дублет приблизительно одинаковой интенсивности
	1370—1365	7,30—7,33	»	
C(CH ₃) ₃	1395—1385	7,17—7,22	ср.	Дублет; примерное отношение интенсивностей 1 : 2
	1365	7,33	с.	
—CH ₂ —	1480—1440	6,76—6,94	ср.	Ограниченное число данных
—CH—	1340	7,46	сл.	

Колебания скелета

C(CH ₃) ₂	1175—1165	8,51—8,58	с.	Ограниченное число данных
	1170—1140	8,55—8,77	»	
	840—790	11,90—12,66	ср.	
C(CH ₃) ₃	1255—1245	7,97—8,03	с.	То же
	1250—1200	8,00—8,33	»	
	750—720	13,33—13,89	»	
—(CH ₂) ₄ —	1020—1000	9,80—10,00	ср.	
—CH ₂ — (циклопропан)				

Алкены

Валентные колебания C=C

Несопр. C=C	1680—1620	5,95—6,17	пер.	Ограниченное число данных
CHR=CH ₂	1645—1640	6,08—6,10	»	
CHR ₁ =CHR ₂ (цис)	1665—1635	6,01—6,12	»	
CHR ₁ =CHR ₂ (транс)	1675—1665	5,97—6,00	»	
CR ₁ R ₂ =CH ₂	1660—1640	6,02—6,10	»	
CR ₁ R ₂ =CHR ₃	1675—1665	5,97—6,00	»	
CR ₁ R ₂ =CR ₃ R ₄	1690—1670	5,92—5,99	сл.	Повышенная интенсивность
Фенил, сопр. C=C	≈1625	≈6,16	с.	

Продолжение

Группа атомов	Область поглощения		Интенсивность полосы	Примечания
	см ⁻¹	мкм		
C=O или C=C сопр. с C=C	1660—1580	6,02—6,33	»	Интенсивность цис-форм часто выше, чем транс-форм

Валентные и деформационные колебания C—H

CHR ₁ =CH ₂	3040—3010	3,29—3,32	ср.	CH валентные (CHR ₁)
	3095—3075	3,23—3,25	»	CH валентные (CH ₂)
	995—985	10,05—10,15	»	CH внеплоскостные деформационные
	915—905	10,93—11,05	ср.	CH ₂ внеплоскостные деформационные
	1850—1800	5,41—5,56	ср.	Обертон
	1420—1410	7,04—7,09	сл.	CH ₂ плоскостные деформационные
	1300—1290	7,69—7,75	пер.	CH плоскостные деформационные
CHR ₁ =CHR ₂ (цис)	3040—3010	3,29—3,32	ср.	CH валентные
	1420—1400	7,04—7,14	сл.	CH плоскостные деформационные
	730—665	13,70—15,04	с.	CH внеплоскостные деформационные
CHR ₁ =CHR ₂ (транс)	3040—3010	3,29—3,32	ср.	CH валентные
	1310—1290	7,63—7,75	сл.	CH плоскостные деформационные
	980—960	10,20—10,42	с.	CH внеплоскостные деформационные
CR ₁ R ₂ =CH ₂	3095—3075	3,23—3,25	ср.	CH валентные
	895—885	11,17—11,30	с.	Внеплоскостные деформационные
	1800—1780	5,56—5,62	ср.	Обертон
	1420—1410	7,04—7,09	сл.	CH ₂ плоскостные деформационные
CR ₁ R ₂ =CHR ₃	3040—3010	3,29—3,32	ср.	CH валентные
	850—790	11,76—12,66	»	CH внеплоскостные деформационные

Алкины

RC≡CH	3310—3300	3,02—3,03	ср.	C—H валентные
	2140—2100	4,67—4,76	сл.	C≡C
R ₁ C≡CR ₂	2260—2190	4,43—4,57	пер.	C≡C

Алкены

C=C=C	1970—1950	5,08—5,13	ср.	Валентные типа C≡C
	≈1060	≈9,43	»	Валентные типа C—C

Ароматические карбоциклические соединения

Валентные колебания

=C—H валентные	3080—3030	3,25—3,30	сл.	Может быть несколько пиков Обычно ближе к 1600 см ⁻¹ Обычно ближе к 1500 см ⁻¹ Для сопряженных систем сильная полоса
C=C плоскостные	1625—1575	6,16—6,35	ср.	
	1525—1475	6,56—6,78	пер.	
	1590—1575	6,29—6,36	пер.	
	1465—1440	6,38—6,94	»	

Группа атомов	Область поглощения		Интенсивность полосы	Примечания
	см ⁻¹	мкм		
<i>Плоскостные деформационные колебания С—Н для различных типов замещения бензольного кольца</i>				
Монозамещенные	1175—1125	8,51—8,89	сл.	В этом интервале две полосы
	1110—1070	9,01—9,35	»	
	1070—1000	9,35—10,00	»	
1,2-Дизамещенные	1225—1175	8,17—8,51	»	
	1125—1090	8,89—9,17	»	
	1070—1000	9,35—10,00	»	
1,3-Дизамещенные	1000—960	10,00—10,42	»	
	1175—1125	8,51—8,89	»	
	1110—1070	9,01—9,35	»	
1,4-Дизамещенные	1070—1000	9,35—10,00	»	
	1225—1175	8,17—8,52	»	
	1125—1090	8,89—9,17	»	
1,2,3-Тризамещенные	1070—1000	9,35—10,00	»	
	1175—1125	8,51—8,89	сл.	
	1110—1070	9,01—9,35	»	
1,2,4-Тризамещенные	1070—1000	9,35—10,00	»	
	1000—960	10,00—10,42	»	
	1225—1175	8,17—8,51	»	
1,3,5-Тризамещенные	1175—1125	8,51—8,89	»	
	1125—1090	8,89—9,17	»	
	1070—1000	9,35—10,00	»	
1,3,5-Тризамещенные	1000—960	10,00—10,42	»	
	1175—1125	8,51—8,89	»	
	1070—1000	9,35—10,00	»	
<i>Внеплоскостные деформационные колебания С—Н для различных типов замещения бензольного кольца *</i>				
Монозамещенные	770—730	12,99—13,70	с.	5 рядом стоящих атомов Н
1,2-Дизамещенные	710—690	14,08—14,49	»	То же
	770—735	12,99—13,61	»	4 рядом стоящих атома Н
	900—860	11,11—11,63	ср.	1 изолированный атом Н
1,3-Дизамещенные	810—750	12,35—13,33	а.	3 рядом стоящих атома Н
	725—680	13,74—14,71	ср.	3 рядом стоящих атома Н, ограниченное число данных
1,4- и 1,2,3,4-замещенные	860—800	11,63—12,50	а.	2 рядом стоящих атома Н
1,2,3-Тризамещенные	800—770	12,50—12,99	»	3 рядом стоящих атома Н

* Слабые полосы поглощения, являющиеся обертонами и составными частотами внеплоскостных деформационных колебаний С—Н, образуют в области 2000—1650 см⁻¹ (5,00—6,06 мкм) сложную и весьма характерную для каждого типа замещения бензольного кольца общую картину. Для изучения этой картины требуются очень концентрированные растворы (в 20 раз более, чем обычные). Полосы ароматического соединения могут маскироваться другими появляющимися в этой области полосами, например сильными основными полосами валентных колебаний С=С и С=О. Число полос, их форма и относительная интенсивность более характерны, чем абсолютные значения частот.

Группа атомов	Область поглощения		Интенсивность полосы	Примечания
	см ⁻¹	мкм		
1,2,3-Тризамещенные	720—685	13,89—14,60	ср.	3 рядом стоящих атома Н, ограниченное число данных
1,2,4-Тризамещенные	860—800	11,63—12,50	с.	2 рядом стоящих атома Н
1,3,5-Тризамещенные	900—860	11,11—11,63	ср.	1 изолированный атом Н
	900—860	11,11—11,63	»	То же
	865—810	11,56—12,35	»	»
1,2,3,5-, 1,2,4,5- и 1,2,3,4,5-замещенные	730—675	13,70—14,81	»	»
	900—860	11,11—11,63	ср.	»
Связи углерода с различными атомами				
С—Br	600—500	16,67—20,00		Валентные
С—Cl	800—600	12,50—16,67		»
С—F	1400—1000	7,14—10,00		»
С—I	500	20,00		»
С≡N	2275—2215	4,40—4,51		»
С=O	1780—1640	5,62—6,10		»
Неорганические соединения				
CO ₃ ²⁻	1450—1410	6,90—7,09		Валентные
N—H	3500—3200	2,86—3,12		
NO ₂ ⁻	1250—1230	8,00—8,13		
NO ₃ ⁻	1420—1350	7,04—7,41		Валентные
O—H	3650—3590	2,74—2,79		
SO ₄ ²⁻	1130—1080	8,85—9,26		
Силикаты	1100—900	9,09—11,11		
Водородная связь O...H	3570—3200	2,80—3,12		

113. Длина межатомных связей в молекулах

Значения r получены усреднением по подобным молекулам.

Тип связи	Соединения	$r \cdot 10, \text{нм}$	Тип связи	Соединения	$r \cdot 10, \text{нм}$
B—H	Бороводороды	1,32	C—H	RC ₃ H ₃	1,096
N—H	NH ₃	1,012		R ₂ CH ₂	1,073
N—H	RNH ₂	1,01		R ₃ CH	1,070
NO	RONO ₂	1,36		Алкены	1,083
NO	RNO ₂	1,22		Аллены	1,07
O—O	H ₂ O ₂	1,48	C—F	Ароматические соединения	1,084
P—H	PH ₃	1,437		Алкены	1,055
S—H	H ₂ S	1,335		Алканы	1,379
Si—H	R ₃ SiH	1,476			

Тип связи	Соединения	$r \cdot 10, \text{нм}$	Тип связи	Соединения	$r \cdot 10, \text{нм}$
C—Cl	Алкены	1,333	C=C	Изолированная связь	1,335
	Ароматические соединения	1,328	C≡C	То же	1,202
	Алканы	1,767	C≡N	Пиридин	1,339
	Алкены	1,719	C≡N	C ₂ H ₅ CN	1,157
	Ароматические соединения	1,70	C—O	Алифатические спирты, простые эфиры	1,426
C—C	Алмаз	1,5445	C=O	Альдегиды, кетоны	1,215
	Алканы	1,537	C=O	CO	1,128
	C—C≡C	1,459	C=S	Тиофен	1,718
	C=C—C≡C	1,45	C—Si	Алкилсиланы	1,870
C—C	Бензол	1,397		Арилсиланы	1,843
	Графит	1,421			

114. Углы между связями в молекулах

R — радикал, X — галоген.

Структура	Угол, градусы	Структура	Угол, градусы
Алканы	CCC 112,6	NH ₃	HNH 107,3
C—C—H	HCH 104±2	RNH ₂	HNH 106
C—C—C (sp ² и sp)	CCN 107—108		CNH 112
C—C—C	CCC 110—111	H ₂ S	HSN 92,3
C—C—C	CCC 122—125	SO ₂	OSO 119,5
C=C—H	CCN 119	PX ₃	XPX 100—101
H ₂ O	HOH 104,45	PR ₃	RPR 100
ROH	COH 108—109		
R ₂ O	COC 110±3		
	CCO 111		
	HCO 107		
RCI	CCCI 107		
	HCCI 108		

115. Степень ионности связи в комплексных ионах и в двухатомных молекулах

Ион	Степень ионности связи, %	Ион	Степень ионности связи, %	Молекула	Степень ионности связи, %	Молекула	Степень ионности связи, %
[NiF ₆] ⁴⁻	96	[SnBr ₆] ²⁻	60	CsF	98	LiBr	57
[CoF ₆] ³⁻	96	[PtBr ₆] ²⁻	57	RbF	97	KI	52
[CoBr ₆] ³⁻	95	[PtCl ₆] ²⁻	44	CaO	81	LiI	46
[CoI ₆] ³⁻	92	[PdCl ₆] ²⁻	43	BaS	76	MgS	35
[CuCl ₄] ²⁻	92	[PtBr ₆] ²⁻	38	CsCl	74	CaTe	25
[CoEt ₂ Cl ₂] ⁺ (транс)	75	[PdBr ₆] ²⁻	37	RbCl	72		
[PdBr ₄] ²⁻	60	[PtI ₆] ²⁻	30	KBr	64		

116. Магнитные моменты молекул и ионов

Магнитные моменты выражают в магнетонах Бора μ_B , они пропорциональны механическим угловым моментам UM : $\mu_B = eh/2m_e c$. Различают два случая: чисто-спиновый и спин-орбитальный моменты. Чисто-спиновым моментом обладает подавляющее число молекул: терм их основного состояния Σ нечетает условию $\Lambda = 0$ (см. табл. 101).

У ионов в комплексных соединениях под действием поля лигандов происходит погашение орбитального момента. Анализ показывает, что поле в большей или меньшей степени снижает вращательное вырождение.

Чисто-спиновое взаимодействие дает эффективный магнитный момент $\mu_S = \sqrt{4S(S+1)}$. Так как $S = n/2$ (n — число неспаренных электронов), то $\mu_S = \sqrt{n(n+2)}$.

Если разность энергий соседних вращательных уровней значительно меньше тепловой энергии (kT), то $\mu_{L+S} = \sqrt{4S(S+1) + L(L+1)}$. Это уравнение достаточно точно, если L и S взаимодействуют с внешним полем независимо друг от друга. Комплексы в этом случае называют спин-свободными. При сильном погашении орбитальных моментов образуются спин-спаренные чисто-спиновые комплексы. Экспериментальные значения магнитных моментов спин-свободных комплексов обычно ниже вычисленных (по причине погашения L).

Спин-спаренные комплексы характерны для второго и третьего ряда переходных элементов. При нечетном числе электронов их магнитные моменты приближенно отвечают наличию одного неспаренного электрона, а при четном проявляется диамагнетизм.

Магнитные моменты молекул

Молекула	Терм	μ_M	Молекула	Терм	μ_M
O ₂	³ Σ _g ⁻	$\sqrt{8}$	NO ₂	² Σ _g ⁺	$\sqrt{3}$
S ₂	³ Σ _g ⁻	$\sqrt{8}$	NO	² Π _g ⁺	1,837
				² Π _g ⁻	

Магнитные моменты ионов первого переходного ряда элементов

Ион	Конфигурация	Терм основного состояния	μ спин-свободных комплексов		μ спин-спаренных комплексов	
			μ _S (расч.)	μ _{S+L} (расч.)	μ (эксп.)	μ _S μ (эксп.)
Ti ³⁺	d ¹	² D	1,73	3,00	1,7—1,85	—
V ⁴⁺	d ¹	² D	1,73	3,00	1,7—1,8	—
V ³⁺	d ²	³ F	2,83	4,47	2,6—2,9	—
V ²⁺	d ³	⁴ F	3,88	5,20	3,8—3,9	—
Cr ³⁺	d ³	⁴ F	3,88	5,20	3,7—3,9	—
Mn ⁴⁺	d ³	⁴ F	3,88	5,20	3,8—4,0	—

Ион	Конфигурация	Терм. основного состояния	μ спин-свободных комплексов			μ спин-спаренных комплексов	
			μ _S (расч.)	μ _S + L (расч.)	μ (эксп.)	μ _S	μ (эксп.)
Cr ²⁺ Mn ³⁺	d ⁴	⁵ D	4,90	5,48	4,7—4,9 4,9—5,0	2,83	3,2—3,3 3,2
Mn ²⁺ Fe ³⁺	d ⁵	⁶ S	5,92	5,92	5,6—6,1 5,7—6,0	1,73	1,8—2,1 2,0—2,5
Fe ²⁺ Co ³⁺	d ⁶	⁵ D	4,90	5,48	5,1—5,7 ≈ 5,4	0	≈ 0
Co ²⁺ Ni ³⁺	d ⁷	⁴ F	3,88	5,20	4,3—5,2 —	1,73	1,7—2,0 1,8—2,0
Ni ²⁺	d ⁸	³ F	2,83	4,47	2,8—4,0	—	—
Cu ²⁺	d ⁹	² D	1,73	3,00	1,7—2,2	—	—

117. Диамагнитная восприимчивость атомов и связей (по Паскалю)

Молярная магнитная восприимчивость $\chi = \chi_D + \chi_P = N_A (\alpha + \mu_m^2/3kT)$, где α — наведенная внешним полем магнитная восприимчивость и μ_m — магнитный момент на одну молекулу. Если $\mu_m = 0$, то при наложении неоднородного поля молекула передвигается в область более слабого поля. Произведение $N_A \alpha = \chi_D$ называют диамагнитной восприимчивостью, знак ее отрицателен. Если $\mu_m > 0$, то $\chi_P = N_A \mu_m^2/3kT$ — парамагнитная восприимчивость с положительным знаком.

У многоэлектронного атома $\chi_D = -N_A e^2 \bar{r}^2 / 6m_e c^2$, где $\bar{r}^2$ — средний квадратичный радиус орбиталей. Диамагнитный вклад зависит от силы приложенного поля. Так как этот вклад составляет приблизительно одну сотую полной восприимчивости, полагают $\chi = \chi_P$. Диамагнитную восприимчивость молекулы принимают равной сумме атомных восприимчивостей, так что $\chi_D = \sum n_i \chi_i + \lambda$, где n_i — число атомов; χ_i — атомная восприимчивость и λ — инкремент группы.

Магнитная восприимчивость выражается в м³/моль.

Атом	$\chi_D \cdot 10^{12}$, м ³ /моль	Атом	$\chi_D \cdot 10^{12}$, м ³ /моль	Атом	$\chi_D \cdot 10^{12}$, м ³ /моль
Ag	-31	I	-44,6	Na	-9,2
Al	-13	K	-18,5	O в спиртах и эфирах	-4,61
As	-43	Li	-4,2	в C=O	+1,73
Br	-30,6	Mg	-10	карбоксильный	-3,36
C	-6,00	N в открытых цепях	-5,57	p	-26,3
Ca	-15,9	в циклах	-4,61	Pb	-46
Cl	-20,1	в моноамидах	-1,54	S	-15
F	-11,5	в диамидах и имидах	-2,11	Sb ³⁺	-74
H	-2,93			Si	-20
Hg ₂ ²⁺	-33			Zn	-13,5

Группа	$\chi_D \cdot 10^{12}$, м ³ /моль	Группа	$\chi_D \cdot 10^{12}$, м ³ /моль
$-\text{C}=\text{C}-$	+5,5	$-\text{C}-\text{Cl}$	+3,1
$-\text{C}=\text{C}-\text{C}=\text{C}-$	+10,6	$-\text{C}-\text{Br}$	+4,1
$-\text{C}\equiv\text{C}-$	+0,8		
$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-$	+4,5	$\text{Cl}-\text{C}-\text{C}-\text{Cl}$	+4,3
Циклогексан	+3,0	$\text{Br}-\text{C}-\text{C}-\text{Br}$	+6,2
$-\text{N}=\text{N}-$	+1,8		
$-\text{C}=\text{NR}$	+8,2	$-\text{C}-\text{Cl}$	+1,4
$-\text{N}=\text{O}$	+1,7		
С для каждого С атома в одном цикле	-0,24	Добавочные поправки в группах	
для каждого атома С, принадлежащего двум циклам	-3,1	$\text{C}-\text{C}^{(3)}-\text{X}-\text{C}-\text{C}^{(4)}=\text{C}$	
для атома С, принадлежащего трем циклам	-4,0	где С ⁽³⁾ и С ⁽⁴⁾ являются третичными или четвертичными атомами. Кислородсодержащая группа может находиться по отношению к С ⁽³⁾ в положении α, а к С ⁽⁴⁾ — в положении β или α и β. Тогда требуется введение инкрементов:	
		в случае С ⁽³⁾	-1,29
		» » С ⁽⁴⁾	-1,54
		» » С ⁽³⁾ и С ⁽⁴⁾	-0,48

118. Химические сдвиги протонов относительно тетраметилсилана

Смесь исследуемого и стандартного (тетраметилсилан, ТМС) веществ помещают в ампулу внутри катушки. На нее налагают переменное поле с частотой ν. Катушка, в свою очередь, находится в магнитном поле, напряженность H₀ которого можно изменять. Если напряженность H₀ достаточно велика, то у протонов исследуемого вещества возникает поле H_{эфф} и появляется сигнал. У протонов ТМС сигнал возникает той же эффективной напряженности, но с отличающейся H₀, что зависит от различного экранирующего действия электронов. Расстояние между двумя сигналами выражают в единицах частоты (герцы) и называют химическим сдвигом. Описанный способ определения химического сдвига называют разверткой по полю. Возможна и развертка по частоте (изменение ν при H₀ = const). Химический сдвиг зависит от частотных условий определения. Чтобы получить данные, не зависящие от условий опыта, введена шкала δ, в которой значение сдвига делают на рабочую частоту и выражают полученную безразмерную величину в миллионных долях. За стандарт принято

значение $\delta_{\text{TMC}} = 10$ млн. долей. Величина δ положительна, когда сигнал находится в области поля с меньшей напряженностью (большой частотой), чем сигнал ТМС, и отрицательна, когда сигнал находится в поле с большей напряженностью (меньшей частотой), чем сигнал ТМС.

Звездочкой ниже отмечены протоны, определяющие сдвиг. Все вещества, кроме указанных, — жидкие.

Водород и вода

Протон	H (атом)	H ₂ O	H ₂	H ₂ O (г.)
—20,94	—3,16	4,68	5,66	9,26

Углеводороды

C ₂ H ₆	C ₂ H ₄	C ₂ H ₂	C ₆ H ₁₂	C ₃ H ₈	CH ₄
2,73	4,68	8,51	8,57	9,11	9,86

Галогенводороды

HF	HF (г.)	HCl	HBr	HI
0,70	7,35	10,31	14,21	23,11

Галогензамещенные углеводороды

CHCl ₃	CH ₃ F	CH ₃ Cl	CH ₃ Br	CH ₃ I
2,73	5,70	7,00	7,30	7,83

Органические вещества, содержащие кислород и азот

CH ₃ COOH*	CH ₃ *CHO	CH ₃ NO ₂	Диоксан	CH ₃ CH*O	(CH ₃) ₂ CO	CH ₃ CN	CH ₃ OH*
—1,37	0,20	5,67	6,30	7,80	7,83	8,00	8,57


Неорганические вещества

SiH ₄	PH ₃	H ₂ S	NH ₃
6,86	8,38	9,78	9,91

КРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕЩЕСТВА

119. Симметрия кристаллов и кристаллические решетки

Разрешенные оси симметрии в кристалле



Порядок оси n	1	2	3	4	6
Угол поворота φ°	360	180	120	90	60
Обозначения	E	C_2	C_3	C_4	C_6

Обозначения классов кристаллов

Приведена классификация по Шенфлису. В кристаллографии пользуются также системой Германа—Могена.








Системы (7)	Триклинная	Моноклиная	Ромбическая	Ромбоэдрическая
Классы (32)	C_1, C_i	C_2, C_2, C_{2h}	C_{2v}, D_2, D_{2h}	$C_3, C_{3v}, D_3, D_{3h}, S_6$

Системы	Тетрагональная	Гексагональная	Кубическая
Классы	$C_4, C_{4v}, C_{4h}, D_{2d}, D_4, D_{4h}, S_4$	$C_6, C_{6v}, C_{3h}, C_{3v}, D_{3d}, D_6, D_{6h}$	T, T_d, T_h, O, O_h


Решетки Браве

В кристаллах 230 пространственных групп, оси симметрии 2, 3, 4 и 6 порядков.


Сингония	Тип решетки			
	примитивная (P)	базоцентрированная (C)	объемно-центрированная (I)	гранецентрированная (F)
Триклинная $a \neq b \neq c$ $\alpha \neq \beta \neq \gamma$				
Моноклиная $a \neq b = c$ $\alpha = \gamma = 90^\circ \neq \beta$				
Ромбическая $a \neq b \neq c$ $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$				

Сингония	Тип решетки			
	примитивная (P)	базоцентрированная (C)	объемно-центрированная (I)	гранецентрированная (F)
Тригональная (ромбоэдрическая) $a = b = c$ $\alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$				
Тетрагональная $a = b \neq c$ $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$				
Гексагональная $a = b \neq c$ $\alpha = \beta = 90^\circ; \gamma = 120^\circ$				
Кубическая $a = b = c$ $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$				

Координаты и углы между осями



Символы вершин и центра куба



120. Параметры кубической решетки

См. рисунки к табл. 122; a_0 — период решетки

Тип решетки	Атомный радиус	Координационное число	Плотность упаковки	Число атомов в элементарной ячейке
Примитивная	$a_0/2$	6	$\pi/6 = 0,52$	1
Объемно-центрированная	$a_0\sqrt{3}/4$	8	$\pi\sqrt{3}/8 = 0,68$	2
Гранецентрированная	$a_0\sqrt{2}/2$	12	$\pi\sqrt{2}/6 = 0,74$	4

121. Корреляция между координационным числом и отношением ионных радиусов

Тип решетки	Координационное число	Пример	r_+/r_-
Гексаэдр	8	CsCl	$>0,732$
Октаэдр	6	NaCl	$0,414-0,732$
Тетраэдр	4	ZnS	$0,225-0,414$

122. Постоянные кристаллических решеток

Вещество	Тип решетки	d , нм	Вещество	Тип решетки	d , нм
Li	Объемно-центрированный куб	0,350	C	Алмаз	0,35597
Na	То же	0,430	Si	»	0,542
K	»	0,520	BaO	NaCl	0,550
Cu	Гранецентрированный куб	0,3597	CaO	NaCl	0,4797
Ag	То же	0,4078	KCl	NaCl	0,6277
Be	Гексагональная плотная упаковка	0,2283	MgO	NaCl	0,4203
Mg	То же	0,3220	NaCl	NaCl	0,5628
Zn	»	0,2657	CsCl	CsCl	(0,411)
Cd	»	0,298	CaF ₂	CaF ₂	0,546
			Cu ₂ S	CaF ₂	0,559
			ZnS	ZnS	0,543
			BeS	ZnS	0,485

Примеры элементарных ячеек






Рис. 122.1. Элементарная ячейка кубической объемно-центрированной решетки.

Рис. 122.2. Элементарная ячейка кубической гранецентрированной решетки.

Рис. 122.3. Элементарная ячейка гексагональной плотной упаковки.






Рис. 122.4. Строение алмаза по Брэггу.

Рис. 122.5. Элементарная ячейка решетки алмаза.

Рис. 122.6. Элементарная ячейка графита.

123. Радиусы атомов и ионов в кристаллах

Значения радиусов вычислены по Мелвин-Хьюзу (МХ), Гольдшмидту (Г), Полингу-Хатгинсу (П), Ингольду (Ин) в кристаллах у ионов с оболочкой благородных газов, по Бокино (Б). Радиусы по Полингу — ковалентные, относятся к координационному числу к. ч. = 6. При к. ч. = 4 поправка составляет -6 %, при к. ч. = 8 поправка +3 %, при к. ч. = 12 поправка +12 %. За радиусы ковалентной связи принимают расстояния от центра ядра до среднего положения связывающих электронных оболочек. Остальные радиусы относятся к к. ч. = 12.

Элемент	Радиус атома $r_a \cdot 10, \text{ нм}$				Заряд иона	Радиус иона $r_i \cdot 10, \text{ нм}$				
	МХ	Г	П	Б		МХ	Г	П	Ин	Б
Ag	1,445	1,44	1,53	1,44	+1	1,011	1,13	1,26	1,26	1,13
Al	1,432	1,43	1,26	1,43	+3	0,55	0,57	0,50	0,72	0,57
As	1,248	1,22	1,18	1,48	+5	—	0,46	—	0,71	(0,47)
Au	1,442	1,44	1,50	1,44	+1	—	0,58	—	—	0,69
	(0,795)	0,91	0,89	0,91	+3	—	1,37	—	1,37	(1,37)
B	0,795	0,91	0,89	0,91	+3	(0,20)	0,23	0,20	0,35	(0,20)
Ba	2,174	2,17	—	2,21	+2	1,395	1,34	1,35	1,53	1,38
Be	1,113	1,11	1,07	1,13	+2	0,314	0,35	0,31	0,44	0,34
Bi	1,548	1,55	1,46	1,82	+5	—	0,74	—	0,98	(0,74)
Br	1,1415	1,14	1,14	—	+3	1,20	0,96	—	—	1,20
	—	—	—	—	+7	—	—	—	0,62	(0,39)
C	0,771	0,77	0,77	0,77	+4	1,973	1,96	1,95	1,95	1,96
	—	—	—	—	+2	0,195	0,16	0,15	0,29	0,2
Ca	1,974	1,37	—	1,97	+2	1,051	0,99	0,99	1,18	1,04
Cd	1,490	1,48	1,48	1,56	+2	0,99	0,97	—	1,14	0,99
Cl	0,994	0,99	0,99	—	+7	—	—	—	0,49	(0,26)
Co	1,253	1,25	1,25	1,25	+1	1,811	1,81	—	1,81	1,81
	—	—	—	—	+3	0,65	0,63	—	—	0,64
Cr	1,249	1,25	1,25	1,27	+2	0,78	0,72	—	—	0,78
	—	—	—	—	+6	—	0,52	—	0,81	0,35
Cs	2,655	2,62	—	2,68	+3	0,65	0,63	—	—	0,64
	—	—	—	—	+2	—	—	—	—	0,83
Cu	1,278	1,27	1,35	1,28	+1	1,678	1,67	1,69	1,69	1,65
F	0,709	0,64	0,64	—	+2	0,47	0,72	—	0,96	0,80
	—	—	—	—	+7	—	0,96	—	—	0,98
Fe	1,241	1,26	—	1,26	+1	—	—	—	0,19	—
	—	—	—	—	+3	1,294	1,36	1,36	1,36	1,33
H	0,3707	0,36	0,30*	0,46	+2	0,67	0,64	—	—	0,67
	—	—	—	—	+7	0,80	0,71	—	—	0,80
Hg	1,503	1,50	1,48	1,60	+2	—	1,53	—	2,08	1,36
I	1,333	2,20	1,28	—	+7	0,66	1,10	—	1,25	1,12
K	2,272	2,36	—	2,36	+1	—	0,50	—	0,77	(0,50)
	—	—	—	—	+3	2,228	2,20	2,16	2,16	2,20
La	1,870	1,86	—	1,87	+1	1,341	1,33	1,33	1,33	1,33
Li	1,520	1,55	1,34	1,55	+3	1,14	1,14	1,15	1,39	1,04
Mg	1,599	1,60	1,40	1,60	+1	0,758	0,68	0,60	0,60	0,68
Mn	1,366	1,30	—	1,30	+2	0,780	0,66	0,65	0,82	0,74
Mo	1,363	1,36	1,40	1,39	+7	—	0,46	—	0,75	(0,46)
	—	—	—	—	+4	0,52	0,60	—	—	0,52
N	0,547	0,71	0,70	0,71	+2	0,83	0,80	—	—	0,91
	—	—	—	—	+6	—	0,62	—	0,93	0,65
Na	1,858	1,88	1,54	1,89	+4	0,68	0,70	—	—	0,68
NH ₄	—	—	—	—	+3	—	1,48	—	—	1,48
Ni	1,246	1,24	1,24	1,24	+1	1,012	0,97	0,97	0,95	—
O	0,6037	0,66	0,66	—	+1	—	—	—	1,42	—
P	0,947	1,08	1,10	1,3	+2	0,74	0,69	—	—	0,74
	—	—	—	—	+6	—	0,1	—	0,22	—
Pb	1,750	1,75	1,46	1,75	+1	—	1,40	—	1,76	1,36
Pd	—	1,31	1,37	1,37	+5	0,66	0,3	—	0,59	0,35
	—	—	—	—	+4	0,70	0,84	—	0,84	0,86
Pt	1,388	1,38	1,38	1,38	+2	1,28	1,20	—	—	1,25
	—	—	—	—	+4	—	0,65	—	—	0,64
Rb	2,475	2,43	—	2,48	+2	—	—	—	—	0,88
	—	—	—	—	+4	0,55	0,65	—	—	0,64
S	1,02	1,04	1,04	1,58	+2	—	0,80	—	—	—
Sb	1,45	1,44	1,36	1,61	+1	1,488	1,47	1,48	1,48	1,49
Si	1,176	1,17	1,17	1,34	+2	1,786	1,81	1,84	2,19	1,82
	—	—	—	—	+4	—	0,62	—	0,89	0,62
Sn	1,405	1,40	1,40	1,58	+3	—	0,76	—	—	0,90
Sr	2,151	2,14	—	2,15	+4	(0,40)	0,42	—	0,65	0,39
Ti	1,44	1,46	—	1,46	+2	0,65	0,71	0,71	0,96	0,67
Zn	1,333	1,34	1,31	1,39	+2	1,175	1,12	1,13	1,32	1,20
	—	—	—	—	+4	0,60	0,68	—	0,96	0,64
—	—	—	—	—	+2	0,566	0,74	—	0,88	0,83

* В Н—Н; в остальных связях 0,37.

124. Вандерваальсовы радиусы атомов

Вандерваальсовы радиусы (в отличие от кристаллических и ковалентных) — это радиусы несвязанных атомов и должны быть близки к кинетическим радиусам (см. табл. 129).

Атом	H	N	P	As	Sb	O	S	Se	Te	F	Cl	Br	I
$r \cdot 10, \text{ нм}$	1,1	1,5	1,9	2,0	2,2	1,40	1,85	2,00	2,2	1,35	1,80	1,95	2,15

125. Радиусы ионов в бесконечно разбавленных водных растворах (по Робинсону и Стоксу)

Ион	Na ⁺	Li ⁺	Be ²⁺	Mg ²⁺	Ca ²⁺	Sr ²⁺
$r_s \cdot 10, \text{ нм}$	1,83	2,37	4,08	3,46	3,09	3,09
$r_{эфф} \cdot 10, \text{ нм}$	3,3	3,7	4,6	4,4	4,2	4,2
$r_{крист} \cdot 10, \text{ нм}$	0,97	0,60	—	0,65	0,99	1,13
h — число гидратации	5	7	13—14	12	10	10

Ион	Ba ²⁺	Zn ²⁺	La ³⁺	N(CH ₃) ₄ ⁺	N(C ₂ H ₅) ₄ ⁺	N(C ₆ H ₁₁) ₄ ⁺
$r_s \cdot 10, \text{ нм}$	2,88	3,46	3,95	2,04	4,71	5,25
$r_{эфф} \cdot 10, \text{ нм}$	4,1	4,4	4,6	3,47	4,94	5,29
$r_{крист} \cdot 10, \text{ нм}$	1,35	0,74	1,15	—	—	—
h — число гидратации	9—10	12	13—14	—	—	—

126. «Термохимические» радиусы ионов

Данные в пределах 20 % согласуются с расчетом r_s .

Ион	H ₃ O ⁺	NH ₄ ⁺	OH ⁻	CN ⁻	ClO ₄ ⁻	HCOO ⁻	MnO ₄ ⁻	NCS ⁻	SH ⁻	SO ₄ ²⁻
$r \cdot 10, \text{ нм}$	1,35	1,43	1,53	1,92	2,36	1,58	2,40	1,95	2,00	2,30

127. Значения постоянной Маделунга

Тип структуры	Пример соединения	Координационное число	A_M
Хлорид натрия	NaCl, AgCl, CdO, PbS	6	1,748
	CsCl, TlCl, RbF	8	1,763
	ZnS, BeO, ZnO, CdS	4	1,641
	ZnS, CuCl, AgI, HgS	4	1,638
Сфалерит (цинковая обманка)			
Флюорит	CaF ₂ , PbF ₂ , UO ₂ , Na ₂ S	8 (4)	5,039
Рутил	TiO ₂ , MgF ₂ , MnO ₂ , NiF ₂	6 (3)	4,816
Куприт	Cu ₂ O	4 (2)	4,322

128. Энергия кристаллических решеток

Приведены значения энергии (теплоты) разрушения решетки ($\Delta H_{\text{кр}}$ в кДж/моль).

Катионы	Анионы									
	F	Cl	Br	I	H	O	OH	S		
Li	1044,3	862,3	819,6	764,6	923,0	—	—	—	—	—
Na	925,9	788,3	753,1	705,8	810,0	—	—	—	—	—
K	823,0	717,5	609,5	649,3	692,5	—	—	—	—	—
Rb	789,9	692,1	666,9	629,7	680,3	—	—	—	—	—
Cs	755,2	669,0	646,8	613,4	655,2	—	—	—	—	—
NH ₄	818,4	642,6	617,5	579,9	—	—	—	—	—	—
Ag	872,8	784,9	759,8	738,9	—	—	—	—	—	—
Cu (I)	—	856,0	830,9	789,1	—	2457,5	—	—	—	2579,8
Cu (II)	—	2763,9	—	—	—	2709,5	—	—	—	3726,3
Mg	2914,6	2500,3	2412,5	2303,7	—	4144,7	—	—	—	3324,3
Ca	2613,3	2240,9	2157,3	2065,2	—	3952,2	—	—	—	3107,0
Sr	2462,7	2123,8	2048,5	1948,1	—	3320,4	2584,0	—	—	2902,0
Ba	2316,2	2023,4	1932,5	1847,6	—	3140,5	2416,7	—	—	2738,8
Zn	—	2688,6	2051,0	2596,6	—	4061,0	2299,5	—	—	3441,7
Cd	2638,4	2504,5	2050,6	2358,1	—	3655,1	—	—	—	3228,4

КИНЕТИКА ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

129. Кинетические диаметры атомов и молекул

Кинетический диаметр σ — расстояние между центрами незаряженных частиц в состоянии соударения. Диаметр межмолекулярного взаимодействия при температуре T К вычисляют по формуле:

$$\sigma_T^2 = \sigma_\infty^2 \left(1 + \frac{C}{T}\right)$$

где σ_∞ — диаметр при весьма высокой температуре; C — постоянная Сесерленда.

Диаметр при критической температуре σ_K вычисляется по формуле:

$$\sigma_K = \left(\frac{3b}{2\pi N_0}\right)^{1/3} = 2,61 \cdot 10^{-7} b^{1/3}$$

где N_0 — число молекул на 1 см³ при 273 К и 101,325 кПа, b — постоянная отталкивания Ван-дер-Ваальса, σ_0 — расстояние между частицами, на котором потенциальная энергия их взаимодействия равна нулю.

Атом или молекула	σ_∞ , нм	σ_K , нм	σ_0 , нм	C	Атом или молекула	σ_∞ , нм	σ_K , нм	σ_0 , нм	σ
Ar	2,99	2,95	3,42	142	Ne	2,25	2,38	2,80	128
Br ₂	3,80	—	(4,47)	533	NH ₃	2,47	3,09	—	626
Cl ₂	3,68	3,54	(4,12)	351	NO	3,09	2,81	3,47	128
CO	3,23	3,16	3,59	101	O ₂	3,02	2,93	3,43	125
CO ₂	3,45	3,23	4,00	213	SO ₂	3,71	3,55	4,29	306
F ₂	3,18	2,88	(3,63)	129	CH ₄	3,33	3,24	3,82	162
H ₂	2,22	2,59	2,97	234	CH ₃ OH	3,25	3,59	3,76	487
HBr	3,16	3,27	—	375	C ₂ H ₂	3,72	3,44	4,22	198
HCl	2,96	3,19	3,31	362	C ₂ H ₄	3,72	3,57	4,23	225
HI	3,55	—	—	390	C ₂ H ₆	3,88	3,70	4,42	252
H ₂ O	2,27	2,89	—	961	C ₂ H ₅ OH	3,95	4,06	4,46	407
H ₂ S	3,18	3,24	—	331	CH ₃ Cl	3,57	3,38	3,72	441
He	1,82	2,66	2,70	173	CH ₂ Cl ₂	4,23	—	4,76	425
Hg	2,51	2,38	2,83	942	CHCl ₃	4,73	4,32	5,43	373
I ₂	4,45	—	(4,98)	568	CCl ₄	5,15	4,65	5,88	365
N ₂	3,22	3,13	3,68	105	C ₆ H ₆	4,71	4,51	5,27	448



130. Общая систематизация гомогенных реакций

Классификация реакций (по Ингольду)

Нуклеофильное замещение S_N :





Нуклеофильное мономолекулярное замещение S_{N1} :




Нуклеофильное бимолекулярное замещение S_N2 :





Радикальное замещение S_R :



Электрофильное замещение S_E :



Мономолекулярное отщепление E_1 :



Бимолекулярное отщепление E_2 :



Нуклеофильные реагенты (доноры электронов в присутствии акцепторов)¹
анионы: H^- , OH^- , RO^- (R — радикал насыщенных углеводородов), $RCOO^-$,
 HOO^- , HS^- , S^{2-} , ArO^- (Ar — радикал ароматических углеводородов)
 ArS^- , NH_2^- , RHN^- , R_3N^- , X^- (галогены), карбанионы, например
($N \equiv C$) $_2CR^-$;

молекулы: H_2O , ROH , $ArOH$, NRH_2 , PH_3 , $P(OH)_3$

Электрофильные реагенты (акцепторы электронов в присутствии доноров):
катионы: H^+ , X^+ (галогены), NO^+ , NO_2^+ , HSO_3^+ , $ArSO_3^+$, Me^+ (металлы),
 $ArN = N^+$, карбокатионы, например R_3C^+ , Ar^+ ;

кислоты Льюиса: BF_3 , $AlCl_3$, $ZnCl_2$;

молекулы: Br_2 , ICl , $R_3C=O$, $RCOCl$, CO_2

Состояние симметрии реагентов и продуктов реакции (по Вудворду—Хоффману)

Если на реакцию систему не действуют излучения, то реакция может происходить в одну элементарную стадию лишь при сохранении молекулярной симметрии реагентов и продуктов реакции. Если на реакцию систему действуют излучения (например, видимого света или инфракрасное), то реакция может идти без сохранения симметрии, но в несколько стадий, с образованием промежуточных соединений.

131. Кинетические параметры гомогенных реакций

Кинетическими параметрами в выражениях скоростей гомогенных реакций вида $v = k c_1^{n_1} c_2^{n_2} \dots$ являются константа скорости k и порядки реакции n_i по реагентам. Зависимость константы скорости реакции от температуры в области не слишком низких и не слишком высоких температур подчиняется уравнению Аррениуса $k = A \exp [-E/RT]$, где E — энергия (теплота) активации; A — предэкспоненциальный множитель, определяемый природой реагентов и среды (E и A слабо зависят от температуры).

Скорость реакции может быть выражена в различных единицах: c^{-1} , моль/(л·с), моль/(см³·с), в физических процессах — числом молекул в 1 см³ в 1 с, в реакциях между газами, — в Па/с или мм рт. ст./с.

Реакции в газах

Первый порядок

Реакция	A , с ⁻¹	E , кДж/моль
<i>Реакции между молекулами</i>		
<i>А. Разложение</i>		
$C_2H_5Br \longrightarrow C_2H_4 + HBr$	$7,2 \cdot 10^{12}$	218,0
$C_2H_5Cl \longrightarrow C_2H_4 + HCl$	$4 \cdot 10^4$	247,5
$CH_3CHCl_2 \longrightarrow CH_2=CHCl + HCl$	$1,3 \cdot 10^{12}$	207,8
$CCl_3CH_3 \longrightarrow CCl_2=CH_2 + HCl$	$3,2 \cdot 10^{12}$	201,0
$CH_3COOC_2H_5 \longrightarrow CH_3COOH + C_2H_4$	$3,2 \cdot 10^{12}$	200,5
$цикло-(CH_2CHO)_3 \longrightarrow 3CH_3CHO$	$1,3 \cdot 10^{12}$	185,5
$N_2O_5 \longrightarrow N_2O_4 + \frac{1}{2} O_2$	$4,6 \cdot 10^{12}$	103,5
$N_2O_4 \longrightarrow 2NO_2$	10^{16}	54,4

Б. Изомеризация

<i>транс</i> -Дихлорэтилен $\longrightarrow$ <i>цис</i>	$4,9 \cdot 10^{12}$	175,8
Циклопропан $\longrightarrow$ пропилен	$1,5 \cdot 10^{12}$	272,8
Винилаллиловый эфир $\longrightarrow$ аллилацетальдегид	$5 \cdot 10^{11}$	128,3

Реакции с участием атомов и радикалов

$CCl_4 \longrightarrow CCl_3 + Cl$	$2 \cdot 10^{12}$	356,2
$CH_3Cl \longrightarrow CH_3 + Cl$		356,2
$C_2H_6 \longrightarrow 2CH_3$		354,0
$C_2H_5Br \longrightarrow C_2H_5 + Br$		225,2
$C_2H_5I \longrightarrow C_2H_5 + I$		216,0
$C_2H_5Br \longrightarrow C_2H_5 + Br$		297,2
$C_6H_5CH_2Br \longrightarrow C_6H_5CH_2 + Br$		211,8
$C_6H_5C_2H_5 \longrightarrow C_6H_5CH_2 + CH_3$		264,2

Второй порядок

Реакция	A , см ³ /(моль·с)	E , кДж/моль
<i>Реакции между молекулами</i>		
$CH_3CH=CHCH_3 + HBr \longrightarrow CH_3CH_2CHBrCH_3$	$1,6 \cdot 10^{10}$	94,2
$H_2 + C_2H_4 \longrightarrow C_2H_6$	$4 \cdot 10^{13}$	180,5
$H_2 + I_2 \longrightarrow 2HI$	$1,6 \cdot 10^{14}$	165,5
$HI + CH_3I \longrightarrow CH_4 + I_2$	$2 \cdot 10^{14}$	140,0
$2HI \longrightarrow H_2 + I_2$	$9,2 \cdot 10^{13}$	186,4
$2NO_2 \longrightarrow 2NO + O_2$	$9,4 \cdot 10^{12}$	112,6

Реакции с участием атомов и радикалов

$CH_3 + CH_3 \longrightarrow C_2H_6$	$1,03 \cdot 10^4$	0
$CH_3 + C_2H_4 \longrightarrow C_3H_6$	$2,5 \cdot 10^{11}$	29,3
$CH_3 + C_2H_6 \longrightarrow CH_4 + C_2H_5$	—	43,5
$CH_3 + C_6H_6 \longrightarrow CH_4 + C_6H_5$	$1,4 \cdot 10^{10}$	38,5
$CH_3 + CHCl_3 \longrightarrow CH_4 + CCl_3$	—	24,3
$CH_3NH_2 + BF_3 \longrightarrow CH_3NH_2BF_3$	$7,9 \cdot 10^{11}$	0
$C_2H_5 + C_2H_5 \longrightarrow C_4H_{10}$	$1,12 \cdot 10^4$	8,4
$Br + CH_4 \longrightarrow HBr + CH_3$	$5 \cdot 10^{13}$	76,6

Реакция	A , см ² /(моль·с)	E , кДж/моль
$\text{Br} + \text{C}_2\text{H}_6 \longrightarrow \text{HBr} + \text{C}_2\text{H}_5$	—	58,2
$\text{Br} + \text{H}_2 \longrightarrow \text{HBr} + \text{H}$	$6,9 \cdot 10^{13}$	74,2
$\text{Cl} + \text{CH}_4 \longrightarrow \text{HCl} + \text{CH}_3$	$2,5 \cdot 10^{13}$	16,3
$\text{Cl} + \text{C}_2\text{H}_6 \longrightarrow \text{HCl} + \text{C}_2\text{H}_5$	$1,3 \cdot 10^{14}$	4,2
$\text{Cl} + \text{H}_2 \longrightarrow \text{HCl} + \text{H}$	$9,5 \cdot 10^{13}$	23,0
$\text{H} + \text{CH}_4 \longrightarrow \text{H}_2 + \text{CH}_3$	$3,2 \cdot 10^{10}$	27,6
$\text{H} + \text{C}_2\text{H}_2 \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_3$	$2 \cdot 10^{11}$	75,4
$\text{H} + \text{C}_2\text{H}_4 \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_5$	$3,2 \cdot 10^{13}$	17,2
$\text{H} + \text{C}_2\text{H}_6 \longrightarrow \text{H}_2 + \text{C}_2\text{H}_5$	$3,2 \cdot 10^{12}$	28,5
$\text{H} + \text{CCl}_4 \longrightarrow \text{HCl} + \text{CCl}_3$	—	14,6
$\text{H} + \text{C}_2\text{H}_5\text{Cl} \longrightarrow \text{HCl} + \text{C}_2\text{H}_5$	—	33,5
$\text{H} + \text{HBr} \longrightarrow \text{H}_2 + \text{Br}$	$1,3 \cdot 10^{15}$	4,6
$\text{Na} + \text{CH}_3\text{Cl} \longrightarrow \text{NaCl} + \text{CH}_3$	—	42,7
$\text{NO} + \text{Cl}_2 \longrightarrow \text{NOCl} + \text{Cl}$	$4 \cdot 10^{12}$	85,0
$\text{OH} + \text{H}_2 \longrightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{H}$	$1,4 \cdot 10^{14}$	41,8
$\text{OH} + \text{CO} \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}$	$1,3 \cdot 10^{13}$	29,3
$\text{OH} + \text{CH}_4 \longrightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{CH}_3$	—	36,2
$\text{OH} + \text{C}_2\text{H}_6 \longrightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{C}_2\text{H}_5$	—	23,0

Третий порядок

Реакция	A , см ² /(моль·с)	E , кДж/моль
$2\text{NO} + \text{Br}_2 \longrightarrow 2\text{NOBr}$	$2,7 \cdot 10^{10}$	5,44
$2\text{NO} + \text{Cl}_2 \longrightarrow 2\text{NOCl}$	$4,6 \cdot 10^9$	15,5
$2\text{NO} + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{NO}_2$	$1,0 \cdot 10^9$	-4,7

Реакции в растворах

Второй порядок

Реакция	Раствори- тель	A , см ² /(моль·с)	E , кДж/моль
$\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{OH}^- \longrightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	H_2O	$1,4 \cdot 10^{10}$	46,9
$\text{CH}_3\text{COOC}_3\text{H}_7 + \text{OH}^- \longrightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$	То же	$1,9 \cdot 10^{10}$	47,3
$\text{CH}_3\text{COOC}_4\text{H}_9 + \text{OH}^- \longrightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$	»	$2,1 \cdot 10^{10}$	47,7
$\text{CH}_2\text{ICOOH} + \text{OH}^- \longrightarrow \text{CH}_2\text{OHCOOH} + \text{I}^-$	»	$6,3 \cdot 10^{14}$	98,0
$\text{C}_2\text{H}_5\text{Br} + \text{OH}^- \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{Br}^-$	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	$4,3 \cdot 10^{14}$	89,6
$\text{CH}_2\text{ICOOH} + \text{Cl}^- \longrightarrow \text{CH}_2\text{ClCOOH} + \text{I}^-$	H_2O	$7,9 \cdot 10^{14}$	95,8
$\text{CH}_2\text{ClCOOH} + \text{I}^- \longrightarrow \text{CH}_2\text{ICOOH} + \text{Cl}^-$	То же	$1,3 \cdot 10^{13}$	82,9
$\text{CH}_3\text{Br} + \text{I}^- \longrightarrow \text{CH}_3\text{I} + \text{Br}^-$	»	$1,7 \cdot 10^{13}$	76,6
$\text{CH}_3\text{Br} + \text{I}^- \longrightarrow \text{CH}_3\text{I} + \text{Br}^-$	CH_3OH	$2,3 \cdot 10^{13}$	76,2
$\text{C}_6\text{H}_5\text{COCH}_2\text{Cl} + \text{I}^- \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{COCH}_2\text{I} + \text{Cl}^-$	CH_3COCH_3	$1,0 \cdot 10^{15}$	93,0
$\text{CH}_3\text{I} + \text{C}_2\text{H}_5\text{O}^- \longrightarrow \text{CH}_3\text{OC}_2\text{H}_5 + \text{I}^-$	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	$2,4 \cdot 10^{14}$	81,6
$\text{C}_2\text{H}_5\text{I} + \text{C}_2\text{H}_5\text{O}^- \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5 + \text{I}^-$	То же	$1,5 \cdot 10^{14}$	86,6
$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{I} + \text{C}_2\text{H}_5\text{O}^- \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OC}_2\text{H}_5 + \text{I}^-$	»	$1,5 \cdot 10^{13}$	83,3
$\text{C}_3\text{H}_7\text{I} + \text{C}_2\text{H}_5\text{O}^- \longrightarrow \text{C}_3\text{H}_7\text{OC}_2\text{H}_5 + \text{I}^-$	»	$3,5 \cdot 10^{14}$	94,2
$\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa} + \text{C}_2\text{H}_5\text{I} \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5 + \text{NaI}$	»	$1,5 \cdot 10^{14}$	86,2
$\text{C}_6\text{H}_5\text{N}(\text{CH}_3)_2 + \text{CH}_3\text{I} \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_5(\text{CH}_3)_3\text{N}^+ + \text{I}^-$	$\text{C}_2\text{H}_2\text{Cl}_4$	$2,2 \cdot 10^4$	49,0
$(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{N} + \text{C}_2\text{H}_5\text{Br} \longrightarrow (\text{C}_2\text{H}_5)_4\text{N}^+ + \text{Br}^-$	C_6H_6	$2,8 \cdot 10^3$	46,9
$(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{N} + \text{C}_2\text{H}_5\text{Br} \longrightarrow (\text{C}_2\text{H}_5)_4\text{N}^+ + \text{Br}^-$	CH_3COCH_3	$8,5 \cdot 10^3$	49,0
$\text{C}_6\text{H}_5(\text{CH}_3)_2\text{N} + \text{C}_2\text{H}_5\text{I} \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_5(\text{CH}_3)_2\text{C}_2\text{H}_5\text{N}^+ + \text{I}^-$	То же	$2,7 \cdot 10^4$	57,4
$\text{C}_6\text{H}_5(\text{CH}_3)_2\text{N} + \text{CH}_3\text{I} \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_5(\text{CH}_3)_3\text{N}^+ + \text{I}^-$	$\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$	$2,6 \cdot 10^4$	54,4
$\text{C}_6\text{H}_5(\text{CH}_3)_2\text{N} + \text{CH}_3\text{I} \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_5(\text{CH}_3)_3\text{N}^+ + \text{I}^-$	$\text{C}_2\text{H}_2\text{Cl}_2$	$2,1 \cdot 10^4$	49,0
$\text{C}_6\text{H}_5(\text{CH}_3)_2\text{N} + \text{CH}_3\text{I} \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_5(\text{CH}_3)_3\text{N}^+ + \text{I}^-$	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH}$	$7,0 \cdot 10^6$	60,2
$\text{CO}_2 + \text{OH}^- \longrightarrow \text{HCO}_3^-$	H_2O	$1,5 \cdot 10^{13}$	38,2

$$k = A \exp(-E/RT) \text{ (см}^3/\text{моль)}^{n-1}/\text{с}$$

$\text{N}_2\text{O}_4 \longrightarrow \text{N}_2\text{O}_4 + 1/2\text{O}_2$			$2\text{HI} \longrightarrow \text{H}_2 + \text{I}_2$			$2\text{NO} + \text{Br}_2 \longrightarrow 2\text{NOBr}$			$\text{CH}_3\text{CHO} \longrightarrow \text{CH}_4 + \text{CO}$		
$n = 1; A = 4,95 \cdot 10^{11}; E = 103,39 \text{ кДж/моль}$			$n = 2; A = 9,17 \cdot 10^{10}; E = 185,98 \text{ кДж/моль}$			$n = 3; A = 2,7 \cdot 10^4; E = 5,44 \text{ кДж/моль}$			$n = 2; A = 4,03 \cdot 10^{12}; E = 138,91 \text{ кДж/моль}$		
T, K	$k_{\text{эксп}}$	$k_{\text{расч}}$	T, K	$k_{\text{эксп}}$	$k_{\text{расч}}$	T, K	$k_{\text{эксп}}$	$k_{\text{расч}}$	T, K	$k_{\text{эксп}}$	$k_{\text{расч}}$
273	$7,87 \cdot 10^{-7}$	$7,67 \cdot 10^{-7}$	556	$3,52 \cdot 10^{-7}$	$3,11 \cdot 10^{-7}$	265	$2,12 \cdot 10^3$	$2,16 \cdot 10^3$	631	$1,23 \cdot 10$	$1,22 \cdot 10$
288	$1,04 \cdot 10^{-6}$	$0,82 \cdot 10^{-6}$	575	$1,22 \cdot 10^{-6}$	$1,18 \cdot 10^{-6}$	273	$2,35 \cdot 10^3$	$2,34 \cdot 10^3$	647	$2,30 \cdot 10$	$2,37 \cdot 10$
293	$1,76 \cdot 10^{-6}$	$1,72 \cdot 10^{-6}$	629	$3,02 \cdot 10^{-6}$	$3,33 \cdot 10^{-6}$	288	$2,68 \cdot 10^3$	$2,70 \cdot 10^3$	663	$4,48 \cdot 10$	$4,42 \cdot 10$
298	$3,38 \cdot 10^{-6}$	$3,43 \cdot 10^{-6}$	647	$8,59 \cdot 10^{-6}$	$8,96 \cdot 10^{-6}$				676	$7,71 \cdot 10$	$7,17 \cdot 10$
308	$1,35 \cdot 10^{-4}$	$1,36 \cdot 10^{-4}$	666	$2,19 \cdot 10^{-4}$	$1,92 \cdot 10^{-4}$				696	$1,44 \cdot 10^2$	$1,43 \cdot 10^2$
313	$2,47 \cdot 10^{-4}$	$2,54 \cdot 10^{-4}$	683	$5,12 \cdot 10^{-4}$	$5,53 \cdot 10^{-4}$						
318	$4,98 \cdot 10^{-4}$	$4,73 \cdot 10^{-4}$	700	$1,16 \cdot 10^{-3}$	$1,21 \cdot 10^{-3}$						
323	$7,59 \cdot 10^{-4}$	$8,80 \cdot 10^{-4}$	716	$2,50 \cdot 10^{-3}$	$2,53 \cdot 10^{-3}$						
328	$1,50 \cdot 10^{-3}$	$1,60 \cdot 10^{-3}$	781	$3,95 \cdot 10^{-2}$	$3,33 \cdot 10^{-2}$						
338	$4,87 \cdot 10^{-3}$	$4,84 \cdot 10^{-3}$									

133. Отношения параметров уравнения Аррениуса при реакциях Меншуткина в бензоле и в различных растворителях

$k = A \exp(-E/RT)$; $\Delta \lg k = \lg(k_0/k_p)$; $\Delta \lg A = \lg(A_0/A_p)$; $\Delta E = E_0 - E_p$; ϵ — диэлектрическая проницаемость растворителя.

Растворитель	s	$(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{N} + \text{C}_2\text{H}_5\text{I} \longrightarrow (\text{C}_2\text{H}_5)_4\text{N}^+\text{I}^-$			$\text{C}_2\text{H}_5\text{N} + \text{CH}_3\text{I} \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{N}^+\text{CH}_3\text{I}^-$		
		$\Delta \lg k$	$\Delta \lg A$	$\Delta E/2,3RT$	$\Delta \lg k$	$\Delta \lg A$	$\Delta E/2,3RT$
Гексан	1,89	-2,6	0,7	3,3	—	—	—
Циклогексан	2,02	-2,3	1,7	4,0	—	—	—
Тетрахлорметан	2,24	—	—	—	-1,2	2,1	3,3
Изопропиловый эфир	3,88	—	—	—	-1,0	-1,0	0,0
Хлороформ	4,64	—	—	—	0,5	-0,2	-0,7
Толуол	2,38	-0,4	0,7	1,1	-0,1	0,1	0,2
Дифенилметан	2,57	0,1	0,3	0,2	—	—	—
Дифениловый эфир	3,70	0,4	0,6	0,2	—	—	—
Анизол	4,33	—	—	—	0,8	0,1	-0,7
Иодбензол	4,62	0,8	1,1	0,3	1,0	0,7	-0,3
Бромбензол	5,40	0,5	1,3	0,8	0,7	0,3	-0,4
Фторбензол	5,42	0,6	0,8	0,2	—	—	—
Хлорбензол	5,62	0,5	0,8	0,3	0,5	0,3	-0,2

134. Константы скорости реакций Меншуткина в растворах галогенпроизводных бензола

Реакция при 373 К: I. $\text{C}_2\text{H}_5\text{I} + (\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{N}$; II. $\text{C}_2\text{H}_5\text{I} + \text{C}_2\text{H}_5\text{N}$; III. $\text{C}_2\text{H}_5\text{Br} + \text{C}_2\text{H}_5\text{N}$. R — константы атомных рефракций заместителей при фенильной группе по Ингольду; ϵ — диэлектрическая проницаемость растворителя при 25 °C.

Растворитель	s	$R, \text{см}^3/\text{моль}$	$k \cdot 10^4$		
			I	II	III
Бензол	2,27	1,10	4,0	0,4	0,3
Хлорбензол	5,62	6,03	13,8	1,2	1,0
Бромбензол	5,40	8,80	16,0	1,7	1,2
Иодбензол	4,62	13,94	26,5	2,7	1,9

135. Корреляционные соотношения в ряду ароматических соединений

Обобщенное корреляционное уравнение для описания влияния заместителя Y, находящегося в мета- или пара-положении фенильного кольца субстрата, на реакционную способность последнего имеет вид:

$$\lg k/k_0 = \rho(\sigma + R\Delta\sigma_R^{\pm})$$

где k и k_0 — константы скорости (или равновесия) для замещенного и незамещенного ($Y = H$) субстратов соответственно; σ — константа заместителя, характеризующая полярное влияние заместителя Y на реакционный центр; величина σ положительна для электроакцепторных заместителей, отрицательна для электродонорных заместителей и равна нулю для $Y = H$; $\Delta\sigma_R^{\pm} = \sigma^{\pm} - \sigma$ — мера способности заместителя к прямому полярному сопряжению с электроакцепторным (σ^+) или электродонорным (σ^-) реакционным центром; для мета-заместителей $\Delta\sigma_R^{\pm} \approx 0$; ρ — реакционная константа, величина которой характеризует чувствительность реакционной серии к полярному влиянию заместителей, а знак зависит от характера реакции: $\rho > 0$ для нуклеофильных и $\rho < 0$ для электрофильных реакций; R — параметр чувствительности реакционной серии к эффекту прямого полярного сопряжения. При $R \approx 0$ корреляционное соотношение принимает вид уравнения Гаммета:

$$\lg k/k_0 = \rho\sigma \quad (1)$$

При $R \approx 1$ получается уравнение Брауна

$$\lg k/k_0 = \rho^+\sigma^+ \quad (2)$$

или его аналог для нуклеофильных реакций:

$$\lg k/k_0 = \rho^-\sigma^- \quad (3)$$

Наряду с константами σ , σ^+ , σ^- в корреляционном анализе применяют индукционные константы σ_I и так называемые нормальные константы заместителей σ^0 , в которых полностью исключен вклад эффекта прямого полярного сопряжения заместителей с реакционным центром.

Погрешность констант скорости, рассчитанных по уравнению Гаммета и другим корреляционным соотношениям, обычно не превышает $\pm 15\%$.

Константы заместителей, применяемых в корреляционном анализе

Заместитель	σ_I	Мета		Пара			
		σ^0	σ	σ^0	σ	σ^+	σ^-
—H	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
—CH ₃	—0,08	—0,07	—0,069	—0,15	—0,170	—0,301	—0,170
—C ₆ H ₅	—0,05	—0,07	—0,07	—	—0,151	—0,295	—0,151
—C ₆ H ₁₁	0,08	—	0,06	0,00	—0,01	—0,194	0,30
—F	0,52	0,35	0,337	0,17	0,062	—0,073	0,062
—Cl	0,47	0,37	0,373	0,27	0,227	0,114	0,227
—Br	0,44	0,38	0,391	0,26	0,232	0,150	0,232
—I	0,39	0,35	0,352	0,27	0,18	0,135	0,18
—CHO	0,31	—	0,355	—	0,45	0,465	1,126
—OH	0,35	0,13 *	0,127	—0,12 *	—0,37	—0,92	—0,37
		0,04 **	—	—0,13 **	—	—	—
—OCH ₃	0,29	0,06 **	0,115	—0,16 **	—0,268	—0,764	—0,268
—OC ₆ H ₅	0,27	—	0,1	—0,123	—0,24	—0,744	—0,24
—COOCH ₃	0,30	0,36	0,315	0,46 **	0,436	0,489	0,636
—COOC ₆ H ₅	0,21	—	0,37	—	0,45	0,482	0,678
—NH ₂	0,05	—0,14	—0,16	—0,38	—0,66	—1,40	—0,66
—NHCH ₃	—	—0,22	—0,302	—0,42	—0,84	—	—0,84
—N(CH ₃) ₂	0,10	—0,15	—0,211	—0,44	—0,83	—1,7	—0,83
—N(C ₆ H ₅) ₂	—	—	—0,231	—	—0,98	—1,93	—0,902
—N(CH ₃) ₃ ⁺	0,93	—	0,88	—	0,82	0,408	0,77
—NO ₂	0,60	0,70	0,710	0,82 **	0,778	0,790	1,270
—CN	0,58	0,62	0,56	0,69 **	0,66	0,659	1,000

* Данные только для водных растворов.

** Данные для растворителей, не имеющих гидроксильных групп, и для большинства смесей воды с органическими растворителями.

*** Данные для водных растворов и большинства смесей воды с органическими растворителями.

Параметры корреляционных уравнений для некоторых реакционных серий
Через X обозначен замещенный фенил C₆H₄—. Константа k выражена в л/(моль·с).

Реакция	Растворитель	t, °C	—lg k ₀	ρ	Корреляционное уравнение	Примечания
$X-COOH \xrightleftharpoons{k} X-COO^- + H^+$	H ₂ O	25	4,203	1,000	1	Стандартная реакционная серия
$X-OH \xrightleftharpoons{k} X-O^- + H^+$	CH ₃ OH C ₂ H ₅ OH H ₂ O C ₂ H ₅ OH (95%) Ацетон (60%) Ацетон (60%) Ацетон (95%) CH ₃ COOH (лед.) CH ₃ COOH (лед.) CH ₃ OH	25 25 25 20 25 50 25 25 25 25 25	6,514 7,206 9,847 12,572 2,075 1,247 2,557 4,200 — — 2,93	1,537 1,957 2,113 2,364 2,229 1,920 2,265 1,782 —12,4 —6,377 0,94	1 1 3 3 1 1 1 1 2 2 2	R = 0,9
$X-COOCH_3 + OH^- \xrightarrow{k} X-COO^- + CH_3OH$						
$X-COOC_2H_5 + OH^- \xrightarrow{k} X-COO^- + C_2H_5OH$						
$X-COCl + H_2O \xrightarrow{k} X-COOH + HCl$						
$X-H + Br_2 \xrightarrow{k} X-Br + HBr$						
$X-H + HNO_3 \xrightarrow{k} X-NO_2 + H_2O$						
$[C_6H_5]_2N- \xrightarrow{k} [C_6H_5]_2N^+-X + OH^-$						
$[C_6H_5]_2N- \xrightarrow{k} [C_6H_5]_2N^+-X + H^+$						
$X-O^- + C_2H_5I \xrightarrow{k} X-OC_2H_5 + I^-$						
$X-NH_2 + C_6H_5COCl \xrightarrow{k} X-NHCOC_6H_5 + HCl$						
$(X-NCH_3)_2 + CH_3I \xrightarrow{k} X-N(CH_3)_3^+ I^-$						

136. Константы скорости инверсии сахарозы в 0,05 M серной кислоте в зависимости от состава раствора и температуры

Состав раствора		$k \cdot 10^4, \text{с}^{-1}$		
$\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}, \text{г/л}$	$\text{H}_2\text{O}, \text{моль/л}$	20 °C	30 °C	50 °C
100	51,95	4,43	18,3	229
200	48,45	4,79	19,77	255
500	38,09	5,95	24,5	—

137. Константы скорости щелочного омыления сложных эфиров

$t, ^\circ\text{C}$	$k, \text{см}^3/(\text{моль} \cdot \text{с})$	$k, \text{л}/(\text{моль} \cdot \text{мин})$	$t, ^\circ\text{C}$	$k, \text{см}^3/(\text{моль} \cdot \text{с})$	$k, \text{л}/(\text{моль} \cdot \text{мин})$
Этилацетат $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$			Бутилацетат $\text{CH}_3\text{COOC}_4\text{H}_9$		
0	19,5	1,17	10	35,3	1,94
20	84,7	5,08	20	65,5	3,93
25	109,3	6,56			
Этилпропионат $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOC}_2\text{H}_5$			втор-Бутилацетат $\text{CH}_3\text{COOC}_4\text{H}_9$		
0	19	1,14	10	29,3	1,76
25	95,7	5,94	20	59	3,54
Пропилацетат $\text{CH}_3\text{COOC}_3\text{H}_7$			трет-Бутилацетат $\text{CH}_3\text{COOC}_4\text{H}_9$		
10	35,8	2,15	10	0,615	0,0369
20	70,5	4,23	20	1,35	0,0810


138. Константы скорости реакций нуклеофильного замещения



Весьма малая зависимость константы скорости от температуры объясняется малостью энергии активации. Константа k выражается в л/(моль·с).

Реакция	$\lg k$	
	298 K	323 K
<i>Растворитель — вода</i>		
$\text{C}_2\text{H}_5\text{COOCH}_3 + \text{OH}^- \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	7,21	7,21
$\text{C}_3\text{H}_7\text{COOCH}_3 + \text{OH}^- \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$	7,31	7,31
$\text{изо-C}_4\text{H}_9\text{COOCH}_3 + \text{OH}^- \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{изо-C}_4\text{H}_9\text{OH}$	6,80	6,80
$\text{C}_4\text{H}_9\text{COOCH}_3 + \text{OH}^- \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$	7,32	7,32
$\text{изо-C}_4\text{H}_9\text{COOCH}_3 + \text{OH}^- \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{изо-C}_4\text{H}_9\text{OH}$	7,47	7,47
$\text{втор-C}_4\text{H}_9\text{COOCH}_3 + \text{OH}^- \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{втор-C}_4\text{H}_9\text{OH}$	6,37	6,37
$\text{трет-C}_4\text{H}_9\text{COOCH}_3 + \text{OH}^- \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{трет-C}_4\text{H}_9\text{OH}$	6,88	6,88
$\text{CH}_3\text{Br} + \text{S}_2\text{O}_3^{2-} \rightarrow \text{CH}_3\text{S}_2\text{O}_3^- + \text{Br}^-$	12,81	12,81
$\text{CH}_3\text{I} + \text{S}_2\text{O}_3^{2-} \rightarrow \text{CH}_3\text{S}_2\text{O}_3^- + \text{I}^-$	12,33	12,33
$n\text{-NO}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{CH}_2\text{Br} + \text{Cl}^- \rightarrow n\text{-NO}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{CH}_2\text{Cl} + \text{Br}^-$	9,28	9,28
<i>Растворитель — ацетон</i>		
$\text{C}_3\text{H}_7\text{Cl} + \text{I}^- \rightarrow \text{C}_3\text{H}_7\text{I} + \text{Cl}^-$	8,07	8,07
$\text{C}_4\text{H}_9\text{Cl} + \text{I}^- \rightarrow \text{C}_4\text{H}_9\text{I} + \text{Cl}^-$	11,33	11,33

139. Константы скорости быстрых реакций между молекулами или между ионами



Кислота	$k_1, \text{с}^{-1}$	$k_2, \text{л}/(\text{моль} \cdot \text{с})$	$K_{\text{равн}}, \text{моль/л}$
<i>Растворитель — вода при 25 °C</i>			
H_2O	$2,6 \cdot 10^{-5}$	$1,3 \cdot 10^{12}$	$2 \cdot 10^{-16}$
NH_4^+	—	$3 \cdot 10^{10}$	—
CH_3COOH	$8 \cdot 10^4$	$4,5 \cdot 10^{10}$	$1,8 \cdot 10^{-5}$
HSO_4^-	$1,5 \cdot 10^9$	$1 \cdot 10^{12}$	$1,5 \cdot 10^{-2}$
$\text{C}(\text{CH}_3)_3\text{COOH}$	$1,4 \cdot 10^5$	$1,5 \cdot 10^{10}$	$9,3 \cdot 10^{-6}$

*Раствор LiCl (1M) при 20 °C**

HCOOH	$1,88 \cdot 10^7$	$5,0 \cdot 10^{10}$	$3,78 \cdot 10^{-4}$
CH_3COOH	$1,39 \cdot 10^6$	$3,8 \cdot 10^{10}$	$3,67 \cdot 10^{-5}$
$\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$	$4,0 \cdot 10^6$	$2,84 \cdot 10^{10}$	$1,41 \cdot 10^{-4}$
$m\text{-C}_6\text{H}_4(\text{OH})\text{COOH}$	$8,1 \cdot 10^6$	$4,44 \cdot 10^{10}$	$1,83 \cdot 10^{-4}$
$p\text{-C}_6\text{H}_4(\text{OH})\text{COOH}$	$1,78 \cdot 10^6$	$3,10 \cdot 10^{10}$	$5,75 \cdot 10^{-5}$

* Погрешность констант скорости, измеренных в растворах LiCl, составляет $\pm 30\%$.

140. Константы скорости реакций в газовой и в жидкой фазах

Растворитель — вода при 25 °C

Реакция	$\lg k_{\text{газ}}$	$\lg k_{\text{H}_2\text{O}}$	$k_{\text{H}_2\text{O}}/k_{\text{газ}}$
$\text{H} \cdot + \text{CH}_3\text{OH}$	4,9	6,2	20
$\text{H} \cdot + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	6,3	7,2	8
$\text{H} \cdot + (\text{CH}_3)_2\text{CHOH}$	5,3	7,7	80
$\text{H} \cdot + \text{CH}_3\text{COOCH}_3$	4,85	5,8	9
$\cdot\text{OH} + \text{H}_2$	6,6	7,6	10
$\cdot\text{OH} + \text{D}_2$	6,05	7,2	14
$\cdot\text{OH} + \text{CH}_2\text{O}$	7,7	9,0	20
$\cdot\text{OH} + \text{CH}_3\text{CHO}$	7,6	8,85	18
$\cdot\text{CH}_3 + \text{CH}_3\text{OH}$	1,7	2,34	4,4
$\cdot\text{CH}_3 + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	2,14	2,77	4,3
$\text{H} \cdot + \text{O}_2 + \text{M} \rightarrow \text{HO}_2 \cdot + \text{M}$	10,71 (300 °C)	10,3	0,39
$\text{H} \cdot + \text{CH}_2=\text{CH}_2 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_5 \cdot$	10,43	9,50	0,12
$\cdot\text{CH}_3 + \text{C}_2\text{H}_4 \rightarrow \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2 \cdot$	8,70	3,69 (85 °C)	$9,8 \cdot 10^{-4}$

Другие растворители




Реакция	Среда	$k \cdot 10^6$, с ⁻¹	Реакция	Среда	$k \cdot 10^6$, л/(моль·с)
Распад N ₂ O ₅ , 20 °С	Газ	1,65	Димеризация циклопентадиена, 50 °С	Газ	0,62
	CCl ₄	2,0		C ₂ H ₅ OH	2,0
	CHCl ₃	2,8		CH ₃ COOH	1,0
	CH ₃ NO ₂	1,55		CCl ₄	1,6
				CS ₂	0,7
				C ₆ H ₆	1,0
				C ₆ H ₅ NO ₂	2,2
				Циклопентадиен	0,7

141. Константы скорости продолжения и обрыва цепей в реакциях полимеризации при 25 °С

$$k = A \exp(-E/RT)$$

Мономер	Продолжение цепей		Обрыв цепей	
	A, л/(моль·с)	E, Дж/моль	A, л/(моль·с)	E, Дж/моль
Винилацетат	3,98·10 ⁷	26 400	3,98·10 ⁹	13 400
Метаметилакрилат	10 ⁶	19 680	1,26·10 ⁸	5 033
Метилакрилат	1,26·10 ⁸	29 300	10 ¹⁰	20 920
Стирол	10 ⁷	30 580	6,31·10 ⁷	7 965

142. Константы скорости реакций мономеров с ингибиторами полимеризации

Ингибитор	Мономер	k, л/(моль·с)
	CH ₂ =C(CH ₃)COOCH ₃ CH ₂ =CHCOOCH ₃	2,1·10 ³ 1,15·10 ³
	CH ₂ =C(CH ₃)COOCH ₃ CH ₂ =CHCOOH	1,2·10 ⁴ 1,6·10 ⁴
	CH ₂ =C(CH ₃)COOCH ₃ CH ₂ =CHCOOCH ₃ CH ₂ =(CH ₃)COOCH ₃	1,05·10 ³ 2,0·10 ³ 6,9·10 ³
	CH ₂ =CHCOOCH ₃ CH ₂ =(CH ₃)COOCH ₃	9,8·10 ⁵ 4,1·10 ⁵
	CH ₂ =CHCOOCH ₃	9,2·10 ⁴

143. Колебательное возбуждение в реакциях обмена

Условия проведения реакции: импульсный фотолиз, смешение реагентов в потоке, давление от 0,05 до 240 Па. ΔH — излучаемая при релаксации теплота. Время релаксации < 10⁻⁸ с. v — колебательное квантовое число возбужденного уровня. Звездочкой обозначено рассчитанное значение v для CO.

Реакция	Высший колебательный уровень		ΔH, кДж
	возможный	наблюдаемый	
H + Cl-Cl → HCl ^v + Cl	6	6	196
Cl + H-I → HCl ^v + I	4	4	142
Cl + H-Br → HCl ^v + Br	2	2	67
H + Cl-NO → HCl ^v + NO	9	9 (10)	272
Br + H-I → HBr ^v + I	2	2	67
H + Br-Br → HBr ^v + Br	6	6	180
H + F-F → HF ^v + F	9	9	377
O + H-H → OH ^v + H	2	2 (3)	184
O + H-OH → OH ^v + OH	2	2	121
O + H-NH ₂ → OH ^v + NH ₂	4	2	188
O + H-CH ₃ → OH ^v + CH ₃	5	2	201
O + O-ClO → O ₂ ^v + ClO	15	8	255
N + N-O → N ₂ ^v + O	12	1	314
CS + SO → CO ^v + S ₂	10 *	14	222

144. Критическая фотохимическая энергия разложения молекул

D — энергия (теплота) диссоциации.

Вещество	λ, нм	E _{фх} = N _A hν, кДж/моль	D, кДж/моль
HCl	215	556,8	431,4
HBr	326	367,2	366,5
HI	404	296,3	298,4
CsI	280	427,5	334,7
CH	275	435,3	333,0

Исходные вещества	Продукты реакции	Активируемая молекула	Реакционная среда	Длина волны λ , нм	Температура, °C	Выход
Br_2 , H_2	HBr	Br_2	В газообразном состоянии	5000—5780		0—2
Br_2 , C_6H_6	$\text{C}_6\text{H}_5\text{Br}$	Br_2	То же	4700	17—30	≈ 1
H_2 , Cl_2	HCl	Cl_2	»	3030—5000		10^4 — 10^5
Cl_2 , CO	COCl_2	Cl_2	»	4000—4360		10^3
C_2H_2	$(\text{C}_2\text{H}_2)_n$, полимер	C_2H_2	»	2150		9,2
CH_3CHO	H_2 , CO	CH_3CHO	»	3130	60	2
CH_3COCH_3	C_2H_6 , CO , CH_4	CH_3COCH_3	»	3130		0,2
HCHO	H_2 , CO	HCHO	»	2500—3660		≤ 1
HI	H_2 , I_2	HI	»	2070—2820	27	1,98—2,08
H_2S	H_2 , S	H_2S	»	2080		1,0
NO_2	NO , O_2	NO_2	»	<4000		2
N_2O	N_2 , O_2 , NO	N_2O	»	Ал-испектр		≈ 1
I_2 , Fe^{3+}	I_2 , Fe^{3+}	I_2	»	3600—5790		≈ 1
I_2 , HCOO^-	I^- , CO	I_2	То же	3450—3500		15—25
CH_3COOH	CH_4 , CO_2	CH_3COOH	»	1850—2300		0,5
HClO	HCl , HClO_2 , O_2	HClO	»	3660—4360		≈ 2
H_2O_2	H_2O , O_2	H_2O_2	»	2750—3660	10—21	20—500
$\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$	H_2SO_4 , O_2	$\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$	»	2537	17—50	0,58
Cl_2 , $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$	HCl , $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{Cl}$	Cl_2	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$	4050		27
$\text{C}_2\text{H}_4\text{I}_2$	C_2H_4 , I_2	$\text{C}_2\text{H}_4\text{I}_2$	CCl_4	4360		25
Cl_2O	Cl_2 , O_2	Cl_2O	CCl_4	4450		≈ 1
Br_2 , C_6H_6	$\text{C}_6\text{H}_5\text{Br}$, HBr	Br_2	C_6H_6	3000—5500		0,4—0,9

146. Среднее время жизни электронов возбужденных атомов

Атом	Переход	$\lambda_{\text{возб}} \cdot 10^3$, нм	t , с
He	$1^1S_0 \rightarrow 2^1P_1$	584	$4,4 \cdot 10^{-10}$
H	$1^2S_{1/2} \rightarrow 2^2P_{1/2} (1/2)$	1216	$1,2 \cdot 10^{-8}$
Li	$2^2S_{1/2} \rightarrow 2^2P_{1/2} (1/2)$	6708	$2,7 \cdot 10^{-8}$
Na	$3^2S_{1/2} \rightarrow 3^2P_{1/2} (1/2)$	5896	$1,6 \cdot 10^{-8}$
K	$4^2S_{1/2} \rightarrow 4^2P_{1/2} (1/2)$	7699	$2,7 \cdot 10^{-8}$
Cs	$6^2S_{1/2} \rightarrow 6^2P_{1/2}$	8521	$3,3 \cdot 10^{-8}$
Mg	$3^1S_0 \rightarrow 3^3P_1$	4571	$4,0 \cdot 10^{-8}$
Zn	$4^1S_0 \rightarrow 4^3P_1$	3261	$2,4 \cdot 10^{-8}$
Cd	$5^1S_0 \rightarrow 5^3P_1$	3261	$2,4 \cdot 10^{-8}$
	$5^1S_0 \rightarrow 5^1P_1$	2288	$2,0 \cdot 10^{-8}$
Hg	$6^1S_0 \rightarrow 6^3P_1$	2537	$1,1 \cdot 10^{-7}$
	$6^1S_0 \rightarrow 6^1P_1$	1849	$1,3 \cdot 10^{-8}$

147. Энтальпия образования радикалов

Радикал	ΔH_f° , 298, кДж/моль	Радикал	ΔH_f° , 298, кДж/моль	Радикал	ΔH_f° , 298, кДж/моль
C	716,7	CH_3CO	-18,0	Cl	121,3
CH	594,1	CBr_3	179,9	F	79,5
CH_2	382,0	CCl_3	82,4	I	106,8
CH_3	142,3	CF_3	-472,8	H	218,0
C_2H_5	107,5	CN	428,0	N	472,7
C_6H_5	322,2	Br	111,9	NH	377,4
CH_3OH	-36,4			NH_2	174,0
				OH	39,3
				O	249,2

148. Энергия активации реакций разложения в отсутствие или в присутствии катализатора

Реакция разложения	Катализатор	E, кДж/моль
Пероксида водорода	Без катализатора	75,4
	Иодид-ион	56,5
Трихлоруксусной кислоты	Коллоидная платина	49,0
	Вода (растворитель)	155,0
Диэтилового эфира в газовой фазе	Анилин (растворитель)	118,5
	Без катализатора	224,0
Уксусного альдегида	Молекулярный иод	143,6
Тринитробензойной кислоты в нитробензоле	»	136,1
	Без катализатора	146,4
Иодистого этила в газовой фазе	Примесь воды	90,8
	Без катализатора	154,8
Ацетондикарбоновой кислоты в водном растворе	Иод атомарный	52,3
	Без катализатора	97,07
Гидролиз сахарозы в водном растворе	Анилин	58,16
	Без катализатора	Не идет
	Ионы водорода	106,94
	Сахароза (энзим)	36,40

149. Энергия активации каталитических реакций

Спирт	Дегидрирование		Дегидратация	
	катализатор	E, кДж/моль	катализатор	E, кДж/моль
C ₂ H ₅ OH	Медь	62,8	—	—
C ₃ H ₇ OH	»	50,6	Оксид алюминия	119,5
изо-C ₃ H ₇ OH	»	25,1	То же	109,0
C ₄ H ₉ OH	Никель	73,2	—	—
	Медь	51,9	—	—

150. Энергия разрыва связей (энергия диссоциации) в молекулах и радикалах газообразных веществ при 298 К в основном состоянии

Энергию разрыва связей в некоторых двухатомных молекулах см. в табл. 107.

Вещество	Продукты диссоциации	Энергия диссоциации, кДж/моль	Вещество	Продукты диссоциации	Энергия диссоциации, кДж/моль
CH	C, H	338,9	CH ₃ Cl	CH ₃ , Cl	349,8
CH ₂	CH, H	430,1	CH ₃ F	CH ₃ , F	468,6
CH ₃	CH ₂ , H	457,7	CH ₃ I	CH ₃ , I	234,3
CH ₄	CH ₃ , H	435,1	C ₆ H ₅ Br	C ₆ H ₅ , Br	297,1
C ₂ H ₂	C ₂ H, H	502,1	C ₆ H ₅ I	C ₆ H ₅ , I	265,3
	CH, CH	962,3	C ₂ H ₅ OH	C ₂ H ₅ , OH	381,2
C ₂ H ₄	C ₂ H ₃ , H	443,5	CH ₃ NH ₂	CH ₃ , NH ₂	337,6
	CH ₂ , CH ₂	711,7	CH ₃ NO ₂	CH ₃ , NO ₂	256,5
C ₂ H ₆	C ₂ H ₅ , H	410,5	CH ₃ COOH	CH ₃ COO, H	461,5
C ₆ H ₆	C ₆ H ₅ , H	457,3	H ₂ O	OH, H	498,7
CH ₃ Cl	CH ₂ Cl, H	425,5	H ₂ O ₂	OH, OH	213,8
CHCl ₃	CCl ₃ , H	401,7	NH	N, H	351,0
CH ₃ Br	CH ₂ Br, H	410,0	NH ₂	NH, H	383,7
HCHO	CHO, H	364,0	NH ₃	NH ₂ , H	438,1
CH ₃ OH	CH ₂ OH, H	399,2	N ₂ O ₃	NO, NO ₂	40,6
	CH ₃ , OH	383,3	N ₂ O ₄	NO ₂ , NO ₂	57,4
CH ₃ CH ₂ OH	CH ₃ CHOH, H	377,4	N ₂ O	N ₂ , O	167,4
CH ₃ CHO	CH ₃ , CHO	338,9	O ₃	O ₂ , O	107,1
CH ₃ Br	CH ₂ , Br	291,6	SiO ₂	SiO, O	472,8

АДСОРБЦИЯ И ГЕТЕРОГЕННЫЙ КАТАЛИЗ

151. Адсорбция криптона на древесном угле при 193,5 К

Удельная поверхность сорбента 700 м²/г.

Количество адсорбированного (при нормальных условиях) на 1 г угля, см ³	Равновесное давление		Заполнение поверхности, л · 10 ⁻¹³ молекул на 1 см ²
	мм рт. ст.	кПа	
5,98	2,45	0,326	2,30
7,76	3,5	0,465	3,00
10,10	5,2	0,692	3,90
12,35	7,2	0,958	4,77
16,45	11,2	1,490	6,35
18,05	12,8	1,702	6,97
19,72	14,6	1,915	7,62
21,10	16,7	2,141	8,15

152. Теплота адсорбции газов при низких давлениях

Давление примерно 100 Па.

Газ	Адсорбент	Теплота адсорбции, кДж/моль	Газ	Адсорбент	Теплота адсорбции, кДж/моль
Ar	LiF	6,65	Hg	Уголь	37,24
	KCl	7,95	N ₂	»	19,04
	KI	9,79	CO ₂	KCl	24,81
	CsCl	14,14		KI	29,29
Kr	CaF ₂	12,13		Уголь	29,66
	KCl	10,04	NH ₃	»	33,18
	Уголь	9,33			

153. Скорость адсорбции водорода пленками железа

Температура спекания, К	Быстрая сорбция, моль/мг Fe	Медленная сорбция, моль/мг Fe	Отношение скорости медленной к скорости быстрой сорбции
78	8,0 · 10 ⁻⁷	1,3 · 10 ⁻⁷	0,16
306	1,4 · 10 ⁻⁷	0,25 · 10 ⁻⁷	0,18
431	0,87 · 10 ⁻⁷	0,18 · 10 ⁻⁷	0,20
638	0,43 · 10 ⁻⁷	0,11 · 10 ⁻⁷	0,26

154. Отравление катализаторов и структура адсорбирующихся веществ

Элемент	Соединения	
	токсичные	нетоксичные
N	$ \begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ \\ \text{HC} \quad \text{CH} \\ \quad \\ \text{HC} \quad \text{CH} \\ \quad \\ \text{N} \\ \text{..} \end{array} $	$ \begin{array}{c} \text{NH}_2^+ \\ \\ \text{HC} \quad \text{CH} \\ \quad \\ \text{HC} \quad \text{CH} \\ \quad \\ \text{N} \\ \\ \text{H} \end{array} $
P	$ \begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{P}-\text{H} \\ \text{..} \end{array} $	$ \begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{O}-\text{P}-\text{O} \\ \\ \text{O} \end{array} $
As	$ \begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{As}-\text{H} \\ \text{..} \end{array} $	$ \begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{O}-\text{As}-\text{O} \\ \\ \text{O} \end{array} $
S	$ \begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \left[\text{O}-\text{S}-\text{O} \right]^{2-} \\ \text{..} \end{array} $	$ \begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \left[\text{O}-\text{S}-\text{O} \right]^{2-} \\ \\ \text{O} \end{array} $
	$ \text{RCH}_2-\text{S}-\text{CH}_2\text{R} $	$ \begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{RCH}_2-\text{S}-\text{CH}_2\text{R} \\ \\ \text{O} \end{array} $
	$ \begin{array}{c} \text{S} \\ \quad \\ \text{HC} \quad \text{CH} \\ \quad \\ \text{HC} \quad \text{CH} \end{array} $	$ \begin{array}{c} \text{O} \quad \text{O} \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{S} \\ \quad \\ \text{CH}_2 \quad \text{CH}_2 \\ \quad \\ \text{CH}_2-\text{CH}_2 \end{array} $
	$ \text{:}\ddot{\text{S}}=\text{C}=\ddot{\text{S}}\text{:} $	$ \begin{array}{c} \text{O} \quad \text{H} \quad \text{O} \\ \quad \quad \\ \text{HO}-\text{S}-\text{C}-\text{S}-\text{OH} \\ \quad \quad \\ \text{O} \quad \text{H} \quad \text{O} \end{array} $

Литература

Общие справочники

1. Landolt H., Börnstein R. Zahlenwerte und Funktionen aus Naturwissenschaften und Technik. Neue Serie. Berlin.
2. Landolt H., Börnstein R. Zahlenwerte und Funktionen aus Physik, Chemie, Astronomie, Geophysik und Technik. 6 Aufl. Berlin. 1950—1980.
3. Справочник химика/Под ред. Никольского Б. П. Изд. 2-е. Т. I—VI и доп. изд., 1961—1968. Изд. 3-е. Т. I, II, 1971. Л.: Химия.
4. Техническая энциклопедия. Справочник физических, химических и технологических величин/Под ред. Мартенса Л. К. Т. I—X и XI (указатель). М.: Советская энциклопедия, 1927—1933.
5. Handbook of Chemistry and Physics/Ed. Hodgman Ch. O. V. 1—2, C. R. C. Cleveland (переиздания ежегодно).
6. Гордон А., Форд Р. Спутник химика. М.: Мир, 1976.
7. Рабинович В. А., Хавин З. Я. Краткий химический справочник. Л.: Химия, 1978.

Тематические справочники и монографии

Свойства растворителей и растворов

8. Ахадов Я. Ю. Диэлектрические свойства бинарных растворов. М.: Наука, 1977.
9. Вайсбергер А., Проскауэр Э., Риддик Д., Тунс Э. Органические растворители. М.: ИЛ, 1958.
10. Варгафтик Н. Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. М.: Наука, 1972.
11. Осипов О. А., Минкин В. И., Гарновский А. Д. Справочник по дипольным моментам. М.: Высшая школа, 1971.
12. Рид Р., Шервуд Т. Свойства газов и жидкостей. 2-е изд. Л.: Химия, 1977.

Термохимия, фазовые и химические равновесия

13. Белоусов В. П., Морачевский А. Г., Панов А. Г. Тепловые свойства растворов. Справочник. Л.: Химия, 1981.
14. Вол А. Е. Строение и свойства двойных металлических систем. Т. 1—4. М.: Физматгиз, 1959—1979.
15. Гурвич Л. В., Карачевцев Г. В., Кондратьев В. И. и др. Энергии разрыва химических связей. Потенциалы ионизации и сродство к электрону. М.: Наука, 1974.
16. Гурвич Л. В., Хачкуров Г. А., Медведев Н. А. и др. Термодинамические свойства индивидуальных веществ. Т. 1, 2. М.: Изд-во АН СССР, 1962.
17. Здановский А. Б., Лаховская Е. И., Шлеймович Р. И. Растворимость многокомпонентных водно-солевых систем. Т. I—III. Л.: Госхимиздат, 1953—1961.
18. Карапетьянц М. Х. Химическая термодинамика. М.: Химия, 1975.
19. Карапетьянц М. Х., Карапетьянц М. Л. Основные термодинамические константы неорганических и органических веществ. М.: Химия, 1968.
20. Карапетьянц М. Х., Чэн Гуанг-Юе. Температура кипения и давление насыщенного пара углеводородов. М.: Гостоптехиздат, 1961.
21. Киргинцев А. И., Трушников Л. Н., Лаврентьева В. Г. Растворимость неорганических веществ в воде. Справочник. Л.: Химия, 1972.
22. Коган В. Б., Огородников С. К., Кафаров В. В. Справочник по растворимости. Т. 1—3. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962—1969.
23. Коган В. Б., Фридман В. М., Кафаров В. В. Равновесие между жидкостью и паром. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960.
24. Мищенко К. П., Полторацкий Г. М. Вопросы термодинамики и строения водных и неводных растворов электролитов. Л.: Химия, 1968; id. Термодинамика и строение водных и неводных растворов электролитов. Изд. 2-е. Л.: Химия, 1976.
25. Наумов Г. Б., Рыженко Б. Н., Ходаковский Н. Л. Справочник термодинамических величин (для геологов). М.: Атомиздат, 1971.
26. Несмеянов А. Н. Давление пара химических элементов. М.: Изд-во АН СССР, 1961.

27. Справочник по плавкости систем из безводных неорганических солей/Под ред. Воскресенской Н. К. М.: Л.: Изд-во АН СССР, 1961.
28. Сталл Д., Вестрам Э., Зинке Г. Химическая термодинамика органических соединений. М.: Мир, 1971.
29. Сталл Д. Р. Таблицы давления паров индивидуальных веществ. М.: ИЛ, 1949.
30. Термические константы веществ. Справочник в 10 выпусках/Отв. ред. Глушко В. П. М.: Изд-во ВИНТИ АН СССР, 1965—1982.
31. Термодинамические свойства индивидуальных веществ. Справочное издание. Отв. ред. Глушко В. П. М.: Наука. Т. 1, 1978; т. 2, 1979; т. 3, 1981; т. 4, 1983.
32. Хансен М., Андерко К. Структуры двойных сплавов. М.: Металлургиздат, 1962.
33. Barin J., Knacke O. Thermochemical Properties of Inorganic Substances. Berlin, 1973, 1977.
34. Selected Values of Chemical Thermodynamic Properties. NBS, Circ. 500. Washington, 1952.
35. Timmermans J. The Physico-chemical Constants of Binary Systems in Concentrated Solutions. N. Y., 1960.

Явления переноса

36. Герцикен С. Д., Дехтяр И. Я. Диффузия в металлах и сплавах в твердой фазе. М.: Физматгиз, 1960.
37. Голубев И. Ф., Гнездилов Н. Е. Вязкость газовых смесей. М.: Изд-во стандартов, 1971.
38. Равдель А. А. Уточненный способ вычисления коэффициентов диффузии газа в газ. — Труды ЛТИ им. Ленсовета, 1960, вып. 60.
39. Равдель А. А., Шмуйлович Г. А., Самсонова А. С. и др. Измерение коэффициентов диффузии электролитов различного валентного типа и определение кинетических параметров диффузионного переноса. — Термодинамика и строение растворов/Межвузовский сборник. Ивановский химико-технологический институт. Иваново, 1978.
40. Франк-Каменецкий Д. А. Диффузия и теплопередача в химической кинетике. М.: Наука, 1967.

Электрохимические равновесия и кинетика

41. Альберт А., Сержент Е. Константы ионизации кислот и оснований. Л.: Химия, 1964.
42. Белл Р. Протон в химии. М.: Мир, 1977.
43. Глестон С. Введение в электрохимию. М.: ИЛ, 1951.
44. Дамаскин Б. Б., Петрий О. А. Основы теоретической электрохимии. М.: Высшая школа, 1978.
45. Добош Д. Электрохимические константы. М.: Мир, 1980.
46. Латимер В. Окислительные состояния элементов и их потенциалы в водных растворах. М.: ИЛ, 1954.
47. Ротинян А. Л., Тихонов К. И., Шошина И. А. Теоретическая электрохимия. Л.: Химия, 1981.
48. Робинсон Р., Стокс Р. Растворы электролитов. М.: ИЛ, 1963 (Robinson R. A., Stokes R. H. Electrolyte Solutions. 2ed. London, 1970).
49. Справочник по электрохимии/Под ред. Сухотина А. М. Л.: Химия, 1981.
50. Coefficients of Electrode Potentials. — J. Electrochem. Soc. 1959, v. 106, № 7, p. 623.
51. Martell A., Sillen L. Stability Constants of Metal-ion Complexes. London, 1964.
52. Parsons R. Handbook of Electrochemical Constants. London, 1959.

Строение молекул и спектры

53. Волькенштейн М. В. Строение и физические свойства молекул. М.: Л.: Изд-во АН СССР, 1955.
54. Герцберг Г. Спектры двухатомных молекул. М.: ИЛ, 1954.
55. Герцберг Г. Электронные спектры и строение многоатомных молекул. М.: Мир, 1969.

56. Глестон С. Теоретическая химия. М.: ИЛ, 1950.
57. Грей Г. Электроны и химическая связь. М.: Мир, 1976.
58. Дей К., Селбин Д. Теоретическая неорганическая химия. М.: Химия, 1976.
59. Иоффе Б. В. Рефрактометрические методы химии. 2-е изд. Л.: Химия, 1974.
60. Краснов К. С., Филиппенко Н. В., Бобкова В. А. и др. Молекулярные постоянные неорганических соединений. Л.: Химия, 1979.
61. Селзуд П. Магнетохимия. М.: ИЛ, 1949.
62. Хигаси К., Баба Х., Рембаум А. Квантовая органическая химия. М.: Мир, 1967.

63. Эткинс П. Кванты. Справочник концепций. М.: Мир, 1977.

Кристаллы

64. Бокий Г. Б. Кристаллохимия. М.: Наука, 1971.
65. Ормонт Б. Ф. Структуры неорганических веществ. М.: Гостехиздат, 1950.
66. Шаскольская М. П. Кристаллография. М.: Высшая школа, 1969.

Гомогенная и гетерогенная кинетика

67. Вудворд Р., Хоффман Р. Сохранение орбитальной симметрии. М.: Мир, 1971.
68. Гаммет Л. Основы физической органической химии. М.: Мир, 1972.
69. Денисов Е. Т. Кинетика гомогенных реакций. М.: Высшая школа, 1978.
70. Денисов Е. Т. Константы скорости гомолитических жидкофазных реакций. М.: Наука, 1971.
71. Жермен Ж. Гетерогенный катализ. М.: ИЛ, 1961.
72. Лейдлер К. Кинетика органических реакций. М.: Мир, 1966.
73. Пальм А. Основы количественной теории органических реакций. Л.: Химия, 1977.
74. Сайкс П. Механизмы реакций в органической химии. М.: Химия, 1971.
75. Тоуб М. Механизмы неорганических реакций. М.: Мир, 1975.
76. Трепел Б. Хемосорбция. М.: ИЛ, 1958.
77. Энтелис С. Г., Тигер Р. П. Кинетика реакций в жидкой фазе. М.: Химия, 1967.

Учебные пособия и руководства к расчетам

78. Даниэльс Ф., Олберти Р. Физическая химия. М.: Мир, 1978.
79. Драго Р. Физические методы в химии. М.: Мир, 1981.
80. Карапетянц М. Х. Методы сравнительного расчета физикохимических свойств. М.: Наука, 1965.
81. Кассандрова О. Н., Лебедев В. В. Обработка результатов наблюдений. М.: Наука, 1970.
82. Киреев В. А. Методы практических расчетов в термодинамике химических реакций. М.: Химия, 1975.
83. Коттон Ф., Уилкинсон Дж. Основы неорганической химии. М.: Мир, 1979. — Коттон Ф., Уилкинсон Дж. Современная неорганическая химия. Т. 1—3. М.: Мир, 1969.
84. Мелвин-Хьюз Э. А. Физическая химия. Кн. 1—2. М.: ИЛ, 1962.
85. Несмеянов А. Н., Несмеянов Н. А. Начала органической химии. Т. 1—2. М.: Химия, 1974.
86. Полинг Л., Полинг П. Химия. М.: Мир, 1978. — Полинг Л. Общая химия. М.: Мир, 1974.
87. Столярков Е. А., Орлова Н. Г. Расчет физико-химических свойств жидкостей. Л.: Химия, 1976.
88. Фридрихсберг Д. А. Курс коллоидной химии. Л.: Химия, 1974.
89. Эйтель В. Физическая химия силикатов. М.: Издательство, 1962.
90. Эммануэль Н. М., Кнорре Д. Г. Курс химической кинетики. М.: Высшая школа, 1974.
91. Эткинс П. Физическая химия. Т. 1—2. М.: Мир, 1980.

Информация в журналах

РЖХим
РЖБиохим

Реферативный журнал «Химия», ВИНТИ АН СССР (с 1953 г.).
Реферативный журнал «Биологическая химия». ВИНТИ АН СССР (с 1955 г.).

Поиск химической информации; номенклатура химических соединений; оформление статей, диссертаций, авторских заявок, материалов для депонирования; подготовка научных докладов, рефератов, отчетов и т. п.

С. А. (A., Chem.

Chemical Abstracts. США (с 1907 г.).

Abs.)

CAB

Current Abstracts of Chemistry, США (с 1960 г.).

Zbl. (Z.; Zb.;

Chemisches Zentralblatt. Берлин (с 1907 г., под др. назв. — с 1830 г.).

Chem. Zbl)

Л и т е р а т у р а к т а б л и ц а м

Номер в графе «Источники» соответствует номеру в списке литературы, приведенном выше. Треугольники служат знаками разделения между источниками

Источники

Номера таблиц

1—4

5

6

7—8

9—13

14

15—17

18

19

20

21—26

27

28

29 и 30

31—33

34 и 35

36

37

38 и 39

40 и 41

42

43, 45, 48

44

46

47

49

50

51

52

53

54 и 55

56

Бурдун Г. Д. Справочник по Международной системе единиц. М.: Изд-во стандартов, 1980. Фундаментальные физические константы. М.: Изд-во стандартов, 1979

6 Δ 7 Δ 9 Δ 45 Δ 59 Δ Гутман В. Химия координационных соединений в неводных растворах. М.: Мир, 1971

3 Δ 7 Δ 59

3—7

12

6 Δ 9 Δ 11 Δ 45

8

3

23

20 Δ 26 Δ 29

3

3 Δ 21 Δ 22 Δ 23 Δ 89 Δ Тонков Е. Ю. Фазовые диаграммы элементов при высоком давлении. М.: Наука 1979

3

30 Δ 34

24

13

Воробьев А. Ф. Некоторые вопросы термодинамики водных и неводных разбавленных растворов электролитов. — В кн.: Материалы Всесоюзного симпозиума по термодинамике растворов электролитов и неэлектролитов. Иваново, 1971

2 Δ 3

Вычислено по данным табл. 44

3 Δ 30

18

18 Δ 25 Δ 28 Δ 30 Δ 33 Δ 82

Karetnikov G. S. Examples of physico-chemical calculations. Indian Inst. of technology. Bombay, 1962

84

Вычислено по данным табл. 40 и 44

28 Δ 30 Δ 82 (интерполировано)

18 Δ Веннер Р. Термодинамические расчеты. М.: Издательство, 1950. Δ Kharasch M., Sher B. — J. Phys. Chem., 1935, Bd. 29, S. 625. Δ Лебедева Н. Д. К анализу формулы Д. П. Коновалова. — Труды ВНИИМ им. Д. И. Менделеева, вып. 34 (94), 1958

37

Kestin J., Sokolov M., Wakeham W. — J. Phys. a. Chem., Ref. Data. 1978, v. 7. № 3, p. 941—944

12

Пенкина Н. В. — ЖФХ, 1977, т. 51, № 3, с. 657; ЖПХ, 1972, т. 45, № 4, с. 880

57

58

59

60

61 и 62; 67

63 и 64

65

66

68 и 69

70

71 и 72, 74

73

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92—94

95

96

97 и 98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

38

69 Δ Johnson P. A., Babb A. L. Liquid diffusion of non-electrolytes. — Chem. Rev., 1956, v. 36, № 3, p. 387—454

39

36

2

52

48 Δ 49

Сборник физических констант/Под ред. Дорфман Я. Г. и Фриш С. Э. М.; Л.: ОНТИ, 1937

42 Δ Бродский А. И. Физическая химия. М.; Л.: Госхимиздат, 1948

5

48 Δ 5245 Δ 49 (интерполировано)

2

43

51 Δ Яцимирский К. Б., Васильев В. П. Константы нестойкости комплексных соединений. М.: Изд-во АН СССР, 1959. Δ Bjerrum J., Schwarzenbach G., Sillen L. Stability Constants of Metall-ion Complexes. London, 1957, 1958

Вычислено по данным табл. 42 и 81

46 Δ 49 Δ 50

58

45 Δ 47

См. литературу к табл. 70 и 71

84

Вычислено

Антропов Л. И. Теоретическая электрохимия. М.: Высшая школа, 1969

49 Δ Фрумкин А. Н. Потенциалы нулевого заряда. М.: Наука, 1979

47 Δ Tamamushi R. Kinetic Parameters of Electrode Reactions. Inst. Phys. a. Chem. Res. Saitama, 1972

52

Matheson M. S. Advances in Chemistry. Series № 50. Am. Chem. Soc. Wash., 1965. Δ Jortner J., Noyes R. — J. Phys. Chem., 1966, v. 70, p. 770. Δ Quayle O. R. — Chem. Rev., 1953, v. 53, p. 439. Δ Sugden S. — J. Chem. Soc., 1924, v. 125

59

84

9

3

15

78

56 Δ 5854 Δ 60

62

79

58

54 Δ Уитли П. Определение молекулярной структуры. М.: Мир, 1970. Δ Финч А., Гейтс П., Редклиф К. Применение длинноволновой инфракрасной спектроскопии в химии. М.: Мир 1973

54 Δ Barrow G. M. Introduction to Molecular Spectroscopy. N. Y.; L.: Internat. Student Edition.

54 Δ 6016 Δ 91

56

60

Вычислены

112	6 Δ К. Накаяиси. Инфракрасные спектры и строение органических соединений. М.: Мир, 1965
113 и 114	6
115	64 Δ Басоло Ф., Пирсон Р. Механизмы неорганических реакций. М.: Мир, 1971
116	58
117	61
118	Керрингтон А., Мак-Лечлан Э. Магнитный резонанс и его применение в химии. М.: Мир, 1970
119	64 Δ 66 Δ 91
120—122	64 Δ 65
123 и 124	86
125	48
126	Мищенко К. П. — ЖФХ, 1952, т. 26, с. 736
127	Кемпбелл Дж. Современная общая химия. М.: Мир, 1975. Δ Паулинг Л. Природа химической связи. М.; Л.: Госхимиздат, 1947
128	См. литературу к табл. 40
129	2
130 и 131	67 Δ Ингольд К. К. Механизм реакций и строение органических соединений. М.: ИЛ, 1959
132	84
133 и 134	77
135	68
136—138	69 Δ 72 Δ 90
139	Колдин Е. Быстрые реакции в растворах. М.: Мир, 1966
140	77
141 и 142	72
143	Каррингтон Т., Гарвин Д. Образование возбужденных частиц в химических реакциях. — В кн.: Возбуждение частиц в химической кинетике. М.: Мир, 1973
144	84
145	Калверт Дж., Питтс Дж. Фотохимия. М.: Мир, 1968
146	Воюцкий В. В. Физика и химия элементарных химических процессов. М.: Наука 1969
147, 150	15
148	75 Δ 84
149 и 150, 152	84
153 и 154	76

Указатель

Адсорбция (и)	Табл.	Стр.	Давление насыщенного пара	Табл.	Стр.
водорода	153	219	воды	21	28
газов	152	219	критическое	42	66
криптона	151	219	металлов	23	29
скорость	153	219	над кристаллогидратами	27	37
теплота	152	219	неорганических соединений	24	30
Активность			органических соединений	24	32
колебаний атомов	109	180	парциальное компонентов раствора	20	26
оптическая	96	159	ртути	22	29
электролитов в растворе	74	135	Диаграммы		
Величина			молекулярные	102	167
2,303 RT/F	84	149	фазовых равновесий	28	38
M_n для вычисления ΔG_T	45	92	Диамагнитная восприимчивость атомов и связей	117	194
Водородный показатель (рН) стандартных растворов	70	128	Диаметры кинетические атомов и молекул	129	203
Возбуждение колебательное	143	215	Дипольные моменты молекул		
Волновые функции			газообразных веществ	16	24
водородоподобных атомов	99	161	жидких веществ	17	24
молекулярных орбиталей	102	167		95	158
Волновые числа			растворителей органических	6	12
вращательных спектров	105	174	функциональных групп молекул	15	22
двухатомных молекул	107	177	Диссоциация		
многоатомных молекул	110	182	слабых кислот и оснований	75	136
тонкой структуры	106	176	твердых веществ	26	36
колебательно-вращательных полос			Диффузионный потенциал	82	148
Вращательная постоянная	107	177	Диэлектрическая проницаемость		
Вращательные спектры	105	174	вакуума	2	10
Вращение плоскости поляризации удельное	96	159	жидкостей	95	158
Время жизни электронов возбужденных атомов	146	217	растворителей органических	6	12
Вязкость			растворов	18	24
воды	53	111	Длина связи, см. также	113	191
газов	52	111	Межъядерное расстояние		
жидкостей	54	112	Донорное число органического растворителя	6	12
растворителей органических	6	12			
растворов	55	114			
	56	115			
Гибридизация	104	173	Единица (ы)		
Группы симметрии	103	170, 172	атомная массы	3	11
			измерения физических величин	1	9
			соотношения	4	11
			обозначения	1	9

Индекс свободной валентности	102	167
Индикаторы кислотно-основные	76	138
Интегральная теплота растворения		
иодида натрия в водно-диоксидных растворах	35	50
кислот и оснований в воде	32	48
солей в ацетоне, этиленгликоле, этаноле и метаноле	34	49
солей в воде	31	46
солей, образующих кристаллогидраты	33	48
Ионное произведение воды	67	126
Катализаторы		
влияние на энергию активации	148	217
отравление	154	220
реакций дегидратации и дегидрирования	149	218
Квантовые числа		
атомов	100	163
вращательные	105	174
	107	177
колебательные	107	177
	143	215
молекул	101	165
Квантовый выход фотохимических реакций	145	216
Кинетические диаметры атомов и молекул	129	203
Кинетические параметры реакций	131	204
Кислоты и основания, области существования в различных растворителях	69	127
Классы кристаллов	119	197
Константы		
двухатомных молекул	107	177
диссоциации слабых кислот и оснований	75	136
кислотности	69	127
многоатомных молекул	110	182
нестойкости комплексов соединений	77	139
равновесия газовых реакций	41	63
реакций образования сложных веществ из простых	49	97

Константы		
скорости быстрых реакций	139	213
скорости инверсии сахарозы	136	213
скорости продолжения и обрыва цепей при полимеризации	141	214
скорости реакций в газах	131	205
	132	208
в газовой и жидкой фазах	140	213
в растворах	131	207
Меншуткина	134	209
мономеров с ингибиторами	142	214
нуклеофильного замещения	138	212
скорости щелочного омыления сложных эфиров	137	212
Корреляционные уравнения	135	211
Корреляционный анализ	135	210
Коэффициент (y)		
абсорбции	19	25
активности		
реальных газов	43	69
сильных электролитов	72	130
	73	133
ангармоничности	107	177
взаимодействия колебания и вращения	107	177
диффузии гидратированного электрона	89	155
в жидкостях	58	117
в твердых телах	60	119
газов в воздухе	57	117
электролитов в водных растворах	59	117
осмотические	71	129
распределения	29	44
самодиффузии неэлектролитов	58	117
температурный		
э. д. с.	81	147
электрической проводимости	65	123
Кристаллическая решетка	119	197
параметры	120	198
постоянные	122	199
элементарные ячейки	122	199
энергия	125	202

Кристаллические вещества		
объем мольный	47	95
температура плавления	47	95
Магнетон Бора	2	10
Магнетон ядерный	2	10
Магнитная проницаемость вакуума	2	10
Магнитный момент		
ионов и молекул	116	193
протона	2	10
угловой	100	163
электрона	2	10
Масса		
атомная, единица	3	11
приведенная молекулы	107	177
Межъядерное расстояние	107	177
	110	182
Молекулярные орбитали по Хьюкелю	101	165
	102	167
Мольная доля	5	11
Молярность	5	11
Молярность	74	135
Молярность	5	11
Моменты инерции молекул	107	177
главные	108	179
Объем критический	42	66
Оптическая активность веществ	96	159
Орбитали		
атомные	101	165
	102	167
	104	173
молекулярные	101	165
	102	167
Осмотические коэффициенты	71	129
Параметры		
кинетические	131	204
критические	42	66
Парахоры атомов и связей	90	155
Перенапряжение при выделении водорода	88	153
Плотность		
воды	9	15
жидкостей	10	16
растворителей органических	6	12

Плотность растворов		
кислот и оснований	12	19
органических соединений	13	19
солей	11	18
электронная	102	167
Поверхностное натяжение		
жидкостей	14	20
растворителей органических	6	12
Показатель преломления		
жидкостей	7	14
растворителей органических	6	12
растворов	8	15
Поляризация жидкостей	95	158
Поляризуемость молекул	92	156
Порядок связи	102	167
Постоянная (ые)		
вращательная	107	177
кристаллических решеток	122	199
Маделунга	127	201
основные физические	2	10
силовые	111	187
Потенциал (ы)		
влияние ПАВ	83	149
диффузионный	82	148
ионизации		
атомов	97	161
молекул и радикалов	98	162
металлов в жидком аммиаке	80	147
нулевого заряда	86	150
электродные в водных растворах	79	143
Радиусы		
атомов и ионов в кристаллах	123	200
вандерваальсовы	124	201
ионов в растворах	125	201
ковалентные	123	200
первый Бора	2	10
«термохимические»	126	201
Растворимость		
газов в воде	19	25
произведение	78	142
растворителей органических в воде	6	12
Растворители органические, свойства	6	12
Растворы стандартные	70	128

Рефракция		
атомная	91	156
ионов в растворах	94	157
парциальная мольная растворов солей	93	157
Симметрия(и)		
кристаллов (пространственная)	119	196
молекул (точечная)	103	169
	104	173
	110	182
операции	103	169
реагентов и продуктов реакции	130	204
элементы	103	169
Спектр		
вращательный	105	174
инфракрасный, активность колебаний	109	180
колебательно-вращательный	106	175
комбинационного рассеяния, активность колебаний	109	180
микроволновой	105	174
Сродство к электрону		
атомов	97	161
молекул и радикалов	98	162
Степень		
вырождения	110	182
ионности связи	115	192
Структура адсорбирующихся веществ	154	220
Температура		
возгонки	24	30
	25	36
диссоциации твердых веществ	26	36
кипения	24	30
критическая	42	66
плавления	24	30
характеристическая кристаллических веществ	47	95
многоатомных молекул	110	182
Температурный коэффициент		
показатель преломления	7	14
э. д. с.	81	147
электрической проводимости	65	123
Тепловой эффект, см. Энтальпия, Теплота		

Теплоемкость		
истинная в интервале 10—298 К	39	54
коэффициенты уравнений	44	72
средняя	40	56
удельная растворов	38	53
эмпирические зависимости	51	108
Теплота(ы)		
испарения	51	109
образования, см. Энтальпия образования	147	217
радикалов		
плавления	51	109
растворения, см. Интегральная теплота растворения		
сгорания	30	45
	51	108
смешения жидкостей	36	51
Термодинамические свойства		
ионов	44	89
простых веществ	44	72
соединений	44	75
функции		
гидратированного электрона	89	155
кристаллических веществ (по Дебаю)	48	96
линейного гармонического осциллятора (по Эйнштейну)	46	93
Термы		
атомов	100	163
молекул	101	165
	107	177
Ток обмена	87	151
Угол между связями	104	173
	114	192
Уравнение(я)		
Аррениуса		
отношение параметров	133	209
параметры	131	204
	132	208
применимость	132	208
корреляционные	135	211
Физические постоянные, значения и обозначения	2	10
Фотохимические реакции		
квантовый выход	145	216

Фотохимические реакции		
критическая энергия разложения	144	215
Функции кислотности	68	126
Химический сдвиг протонов	118	195
Хиральность	96	159
Частоты характеристические	112	188
Числа переноса катионов	64	122
Электрическая проводимость		
молярная		
гидратированного электрона	89	155
ионов предельная	65	123
растворов слабых кислот и оснований	66	125
растворов электролитов	63	120
температурный коэффициент	65	123
удельная		
воды	61	119
растворителей	6	12
органических растворов KCl	62	119
Электродный потенциал		
в водном растворе	79	143
в жидком аммиаке	80	147
Электрон(ы)		
гидратированный	89	155
масса покоя	2	10
работа выхода	85	149
Электроотрицательность атомов	97	161

Энергия активации		
в отсутствие и в присутствии катализатора	148	217
гомогенных реакций	131	204
	132	208
каталитических реакций	149	218
Гиббса	44	72
приведенная	50	102
диссоциации молекул и радикалов	150	218
нионизации		
атомов	97	161
молекул и радикалов	98	162
кристаллических решеток	128	202
разрыва связей	150	218
фотохимическая критическая	144	215
Энтальпия, изменение при		
испарении	51	109
образовании ионов	44	89
образовании радикалов	147	217
образовании сложных веществ из простых	44	72
плавлении	50	102
сгорании	51	109
	30	45
	51	108
сольватации солей	37	53
Энтропия		
ионов	44	89
стандартные значения	44	72
эмпирические зависимости	51	109

ISBN 5-86457-116-4



Справочное издание

Составители:

Наталья Михайловна Барон, Ариадна Михайловна Пономарева
Адолф Аркадьевич Равдель, Зинаида Никитична Тимофеева

**КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН**

Ответственный редактор *В. Н. Шакиров*
Художественный редактор *В. А. Андреева*
Корректор *Н. Б. Петрова*

ЛР № 071099 от 09.11.94. Подписано в печать 10.12.98. Формат 60×90¹/₁₆.
Гарнитура Литературная. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 14,5.
Тираж 4000 экз. Заказ 1

Издательство «Специальная Литература» при участии ТОО «Мифрил»
198052, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 29

Отпечатано в типографии ООО «ИПК «Бионт»
Санкт-Петербург, Средний пр. д. 86.

