

Африканська чума свиней (АЧС): Біобезпека під час полювання



Food and Agriculture Organization of the United Nations



European Bank for Reconstruction and Development



АЧС — вірусне захворювання свиней з летальністю до 100%. Щоб не допустити інфікування, треба вчасно видаляти труп загиблих тварин з лісу.




В дикій фауні вірус поширюється дуже швидко




У ТРУПІ вірус залишається життєздатним протягом кількох місяців



МИСЛИВЕЦЬ може перенести вірус на взутті та одязі



ТРАНСПОРТ після полювання має бути продезинфікований




Не згодуйте свиням помий та харчові відходи




Кожна впольована тварина може бути переносником АЧС. Лише дотримання заходів з біобезпеки на кожному етапі полювання допоможе знизити ризик рознесення вірусу в дикій фауні



Діагноз на АЧС можна встановити лише за результатами лабораторного дослідження (ПЛР – полімерно-ланцюгова реакція)



Запам'ятайте! Упродовж 48 год. після полювання не контакуйте зі свійськими свинями.



Споживати страви з м'яса диких свиней до того, як буде отримано результати лабораторного дослідження на АЧС заборонено.



Не забувайте дезинфікувати всі поверхні, що можуть бути контаміновані вірусом АЧС під час полювання – одяг, взуття, зброя, транспорт та інше мисливське знаряддя.