

Індекс повсякденної діяльності Бартеля

ПІБ Пацієнта: _____

ПІБ Факівця: _____

Дата оцінювання: _____

ГОДУВАННЯ

0 = неможливо

5 = потрібна допомога в нарізанні, намазуванні масла тощо, або потрібна змінена дієта

10 = незалежний

КУПАННЯ

0 = залежний

5 = незалежний (або в душі)

Гігієна

0 = потребує допомоги в особистому догляді

5 = незалежне обличчя/волосся/зуби/гоління (інструменти надаються)

Одягання

0 = залежний

5 = потребує допомоги, але приблизно половину може робити без сторонньої допомоги

10 = незалежні (включаючи гудзики, блискавки, шнурівки тощо)



Індекс повсякденної діяльності Бартеля

ПІБ Пацієнта: _____

ПІБ Факівця: _____

Дата оцінювання: _____

КИШЕЧНИК

0 = нетримання (або потрібна клізма)

5 = іноді не тримає

10 = тримає

СЕЧОВИЙ МІХУР

0 = нетримання сечі або катетеризація, з якою неможливо впоратися самостійно

5 = іноді не тримає


10 = тримає

КОРИСТУВАННЯ ТУАЛЕТОМ

0 = залежний

5 = потребує допомоги, але може зробити щось сам

10 = незалежний (вмикання та вимкнення, одягання, витирання)



SAVING
LIVES

bazaznan.protezhub.com

@protezhub

bazaznan@protezhub.com

+38 0501 PROTEZ

Індекс повсякденної діяльності Бартеля

ПІБ Пацієнта: _____

ПІБ Факівця: _____

Дата оцінювання: _____

ТРАНСФЕР (ЛІЖКО ДО КРИСЛА І НАЗАД)

0 = неможливо, немає балансу сидячи

5 = основна допомога (одна або дві людини, фізична),
може сидіти

10 = незначна допомога (усна чи фізична)

15 = незалежний

МОБІЛЬНІСТЬ (НА РІВНИХ ПОВЕРХНЯХ)

0 = нерухомих або < 45 см

5 = крісло колісне незалежно, включаючи на поворотах, >
45 см

10 = незначна допомога (вербально або фізично) > 45 см

15 = незалежний (але може використовувати будь-яку
допомогу; наприклад, палицю) > 45 см

СХОДИ

0 = неможливо

5 = потрібна допомога (вербальна, фізична, допомога при
перенесенні)

10 = незалежний

Всього (0 - 100):



Індекс повсякденної діяльності Бартеля

1. Індекс слід використовувати як анотацію того, що робить пацієнт, а не того, що пацієнт міг би зробити.
2. Основна мета полягає в тому, щоб встановити ступінь незалежності від будь-якої допомоги, фізичної чи словесної, навіть незначної і з будь-якої причини.
3. Необхідність догляду чи підтримки робить пацієнта залежним.
4. Показники пацієнта повинні бути встановлені з використанням найкращих доступних доказів.

Опитування

друзів/родичів та медперсоналу є звичним процесом, але безпосереднє спостереження за пацієнтом та здоровий глузд також є джерелами важливої інформації. Іноді тестування не потрібне.

5. Зазвичай показники пацієнта протягом попередніх 24-48 годин є важливими, щоб розуміти, що пацієнт може зараз, але іноді аналіз довшого періоду є актуальним.
6. Середні категорії означають, що пацієнт докладє понад 50 відсотків зусиль.
7. Дозволяється використання допоміжних засобів для самостійності.

Махоні Ф.І., Бартел Д. «Функціональна оцінка: індекс Бартеля».
Медичний журнал штату Меріленд 1965; 14: 56-61. Використовується з дозволу.