

Лабораторне заняття № 1

Прокаріотичний план будови клітин.

Відділ Синьо-зелені водорослі – Cyanophyta.

Відділ Діатомові водорослі – Diatomeae,

Bacillariophyta

Ботаніка 2024-25


Завдання 1: Вивчити будову колонії роду мікроцистіс *Microcystis*

Зі склянки з фіксованими або живими водоростями узяти піпеткою краплю та приготувати тимчасовий препарат. При малому збільшенні мікроскопа знайти колонії мікроцистісу, вивчити одну з колоній. Визначити тип морфологічної структури, форму колонії. При великому збільшенні мікроскопа встановити форму клітин у колонії мікроцистісу та спосіб їх з'єднання, наявність газових вакуолей.

Рід *Microcystis* – мікроскопічна прісноводна водорість, що складається з великої кількості поодиноких клітин, які розташовані у слизових колоніях неправильної форми. Колоніальний слиз м'який, і тоді невиразний, або досить щільний, і в цьому випадку добре помітний у світловий мікроскоп навіть без спеціального забарвлення.

Кожна клітина має сферичну форму (окрім тих клітин, що знаходяться в стані поділу). Розмноження відбувається фрагментацією колоній та поділом клітин навпіл.

Вивчіть загальний вигляд колонії та при великому збільшенні 1-2 клітини з газовими вакуолями, зробіть підписи до малюнку.



А –

Відділ

Б –

Клас

1 –


Порядок



2 –

Рід

3 –

4 –






Завдання 2: Вивчити будову колонії носток *Nostoc*

Невеличкий шматочок шкірочки ностока ретельно розрівняти в краплі води на предметному скельці та вивчити при малому збільшенні мікроскопа.



Рід носток – *Nostoc* здебільшого водорості з макроскопічними слизовими колоніями. Колонії за консистенцією м'які або тверді, за формою різноманітні. Водорості розмножуються гормогоніями, акінетами, брунькуванням та фрагментацією колоній.

Колонія ностока складається з багатоклітинних ниток, переплутаних між собою. Окрема нитка складається з ланцюжка шароподібних клітин, що лежать у драглій масі. Оболонки клітин дуже ослизненні, тому клітини в ланцюжку здаються відокремленими. Крім вегетативних клітин нитки ностока мають більш крупні клітини з товстою двоконтурною оболонкою та майже незабарвленим гомогенним вмістом. Це гетероцисти по яких відбувається розрив нитки при вегетативному розмноженні ностока.

Вивчіть частину колонії, нитки, позначте вегетативні клітини та гетероцисти на малюнках.







1 –	Відділ
2 –	Клас
3 –	Порядок
4 –	Рід
5 –	




А –
Б –
1 –
2 –

Відділ
Клас
Порядок
Рід








Завдання 3: Вивчити будову ниткової водорості анабени *Anabaena*

Приготувати тимчасовий препарат, помістивши краплю рідини зі склянки з фіксованою або живою анабеною на предметне скельце. Нитки анабени походять на нитки ностока, але складаються з більших за розміром округлих клітин з газовими вакуолями. Гетероцисти округлі, незабарвлені з чіткими двоконтурними оболонками. Крім вегетативних клітин та гетероцист у нитках анабени спостерігаються спори округлої або еліпсоїдної форми із зернистим вмістом та дуже потовщеною оболонкою.

Вивчіть частину нитки анабени, позначте вегетативні клітини, гетероцисти, спори.



A –

1 –

2 –

3 –

Б –

1 –


2 –

Відділ


Клас

Порядок

Рід








Завдання 4: Вивчити будову ниткової водорості глеотріхії *Gleotrichia*

Приготувати тимчасовий препарат водорості. Вивчити препарат при малому збільшенні мікроскопа. Якщо в полі зору з'явиться колонія, то її спочатку слід розчавити голкою. При малому збільшенні видно, що колонія складається з окремих ниток, які розходяться від центру й оточені слизом. Нитки полярні: у основі нитки знаходиться гетероциста; при віддаленні від гетероцисти клітини стають дедалі меншими, їх вміст відмирає і на вершині знаходиться безбарвний волосок. В результаті злиття декількох вегетативних клітин у глеотріхії наприкінці вегетативного періоду утворюються спори. Вони розміщаються під базальною гетероцистою або відокремлені від неї 1-2 вегетативними клітинами.

Вивчіть схематичну будову колонії глеотріхії та одну нитку, позначте вегетативні клітини, гетероцисту, спору, волосок, слизову піхву.



А –

Відділ

Б –

Клас

В –

Порядок

Г –

Рід

1 –

4 –


2 –

5 –

3 –

6 –





Завдання 5: Вивчити одноклітинну прісноводну водорість *Pinnularia*


Приготувати препарат, взявши піпеткою небагато рідини із дна посудини, в якій містяться діатомові водорості. *Pinnularia* можна вивчати в обростаннях на *Cladophora* та інших нитчастих водоростях, що мешкають біля берегів водойми. Вивчення ведеться при великому збільшенні мікроскопа. У препараті можна знайти водорості різних розмірів і у двох положеннях: з боку стулки та з боку пояска.

З боку стулки *Pinnularia* має вид витягнутого еліпса. По середній лінії стулки можна бачити три блискучі кружечки, один посередині і два біжче до кінців. Це так звані вузлики, утворені потовщенням оболонки зсередини. Від кінцевих вузликів до центрального йде смужка, що являє собою щілину в оболонці і звуться швом. За допомогою шву протопласт з'єднується з зовнішнім середовищем, завдяки чому можливий активний рух клітини. По боках, на деякій відстані від шва, симетрично розташовані поперечні смужки, або реберця – це потовщені та тонші місця оболонки, завдяки ним здійснюється осмотичний та газовий обмін із зовнішнім середовищем. З боку стулки іноді можна побачити ядро, розташоване у центрі клітини.


Щоб розглянути цю ж особину з боку пояска, необхідно легенько постукати по покривному склу препарувальною голкою. З боку пояска *Pinnularia* має вигляд прямокутника із закругленими кутами. Необхідно уважно вивчити обидва кінця стулки, щоб відрізнити епітеку і гіпотеку. Уся порожнина клітини з пояску зайнята пластинчатим хроматофором. Якщо в дослідній рідині *Pinnularia* багато, можна знайти особини у тій чи іншій стадії вегетативного розмноження. Після поділу клітини деякий час не розходяться, а залишаються поряд, поки утвориться гіпотека, тому у полі зору часто можна бачити дві рядом розташовані особини, які щойно поділилися.

Збоку пояска на *Pinnularia* схожа навікула – *Navicula*, вона на відміну від *Pinnularia*, більш загострена.


Зробіть позначення до малюнків.



Відділ
Клас
Порядок
Родина
Рід
Вид



А –	Відділ
Б –	Клас
1 –	Порядок
2 –	Родина
3 –	Рід
4 –	Вид
5 –	Відділ
6 –	Клас
7 –	Порядок
1 –	Родина
1 –	Рід
1 –	Вид





Завдання 6: Вивчити колоніальні форми діатомових водоростей (обростання)

Найбільш різноманітними за видовим складом і кількістю діатомових водоростей є ценози обростання рослин. Вони складаються з колоніальних і поодиноких форм. В прісних водоймах в обростаннях розташовані *Synedra*, *Coccconeis*, *Gomphonema*, *Cymbella* та ін. На приготовленому препараті з *Cladophora* або іншої мікроскопічної зеленої водорості, при малому збільшенні мікроскопа знайти мікроскопічні епіфітні діатомові, вивчити їх при великому збільшенні мікроскопа.


Клітина *Coccconeis* широкоеліптична, прикріплюється до субстрату всією поверхнею нижньої стулки, що має вид шву, на верхній стороні шов відсутній.

Cymbella має стулки, що нагадають півмісяці з випуклим спинним та прямим або злегка ввігнутим черевним боком.



Клітини *Synedra* з пояску мають витягнуто-прямокутну форму, з боку стулки – паличикоподібну. Клітини розташовуються поодиноко або утворюють колонії.

Стулка *Gomphonema* має неоднакові кінці (один кінець вужчий за інший). З боку стулки гомфонема має гітароподібну форму, по середній лінії стулки проходить шов, а з боку пояску має форму трапеції, меншою стороною вона прикріплюється до субстрату.

Вивчіть та підпишіть діатомові водорости.





Відділ	Відділ
Клас	Клас
Порядок	Порядок
Родина	Родина
Рід	Рід
A –	1 –
Б –	2 –



Відділ	Відділ
Клас	Клас
Порядок	Порядок
Родина	Родина
Рід	Рід
A –	1 –
Г –	2 –









Завдання 7: Ознайомитися з колоніальною водорістю *Melosira*

Стулки водорості *Melosira* мають форму невисоких скляночок, попарно вставленіх одна в одну і з'єднаних основами стулок за допомогою слизу. З боку стулок клітини округлі. В клітині знаходитьться багато хроматофорів у вигляді лопатевих пластинок або дисків.

При розмноженні мелозіри утворюється ауксоспора. Ауксоспорою називають швидкоростучу зиготу, яка спочатку вкрита тонкою пектиновою оболонкою; яка надалі утворює стулки панцира. Утворення ауксоспор у *Melosira* відбувається в результаті автогамії, у деяких має місце оогамія. При дозріванні ауксоспора перетворюється в ініціючу клітину, яка за розміром значно більша за материнську.



А



Б

А –

	Відділ
	Клас
Б –	Порядок
1 –	Родина
	Рід

1 –

