

# ПІДКЛАС ДІЛЕНІІДИ

БОТАНІКА 2024-25



## ПІДКЛАС ДІЛЕНІДИ (DILLENIIDAE)

Охоплює 29 порядків, 94 родини і близько 60 підродин. Це один з найбільших підкласів, а у філогенетичному відношенні — одна з центральних груп, примітивні представники якої є сполучною ланкою поміж магноліїдами та розидами. До підкласу входять деревні і трав'янисті рослини, що мають частіше прості, рідше складні листки з прилистками або без них. Квітки різних типів, звичайно з подвійною оцвітиною, пелюстки вільні або віночок зрослолистий. Гінецей апокарпний або частіше ценокарпний з верхньою чи нижньою зав'яззю; плоди різних типів.



## **Порядок Актинідієцвіті (*Actinidiales*)**

Монотипний порядок. Прямостоячі, виткі або лазячі дерева і чагарники з черговими простими цілокраїми або пильчастими або зубчастими пірчасто-розсіченими листками, без прилистків. Квітки в пазушних або бічних, в основному цимозних суцвіттях, іноді редуковані до кількох або навіть до однієї квітки, маточково-тичинкові або рідше полігамні і дводомні (*Actinidia*), актиноморфні. Чашолистків п'ять, рідше менше або більше (до семи), черепичних, вільних або біля основи зрослих. Пелюсток звичайно п'ять, вільних або часто зрослих біля основи в коротку трубку, черепичних. Тичинки численні, в п'яти антипетальних пучках, які можуть бути прикріплені до основи пелюсток, рідше тичинок лише десять; піляки дрібні, рухомі. Гінецей з тьорх-п'яти або (в *Actinidia*) з багатьох (до 30 і більше) карpel, паракарпний. Зав'язь верхня, повністю чи неповністю три-п'яти гнізда, з численними або тільки приблизно десятьма насіннями зачатками в кожному гнізді. Плоди — ягоди або коробочки. *Actinidiales* займають проміжне положення між *Dilleniales* і *Theales*, але більші вони до останніх.



## **Порядок Чаєцвіті (*Theales*)**

Великий переважно тропічний і субтропічний порядок, що об'єднує 13 родин, 98 родів і 2020-2070 видів. Дерева, чагарники і трави, іноді деревовидні ліани, звичайно з черговими, рідше супротивними або кільчастими, переважно простими, звичайно цільними пірчасто-нервними листками, з прилистками або без них. Квітки середніх розмірів або великі, в різного роду суцвіттях, або поодинокі, звичайно маточково-тичинкові, переважно актиноморфні, з подвійною оцвітиною. Оцвітина спіральна або спіроциклічна (багато *Theaceae*), частіше — циклічна, здебільшого п'ятичленна. Чашечка часто підpirається двома-кількома брактеолями, які іноді поступово переходять у чашолистки. Чашолистки і пелюстки переважно вільні, черепичасті або рідше скручені. Пиляки звичайно численні, вільні або такі, що різною мірою зрослися нитками. Гінецей більш чи менш ценокарпний, паракарпний або несправжньо (вторинно) синкарпний, з двох-багатьох карpel; зав'язь верхня, рідко напівнижня чи нижня, звичайно з багатьма насінними зачатками. Плоди різних типів. Характерна наявність міжклітинних секреторних каналів. Порядок *Theales* стоїть близько до *Dilleniales* і особливо до *Actinidiiales* і має спільне з ними походження.





## **Порядок Вересоцвіті (Ericales)**

Порядок об'єднує 6 родин, 180 родів і близько 4000 видів. Невеликі дерева і чагарники, рідше багаторічні трави, часто більш чи менш мікотрофні. Листки чергові, рідше супротивні або кільчасті, прості, цілісні, без прилистків. Квітки звичайно в китицях, маточково-тичинкові або рідко маточкові і тичинкові, звичайно актиноморфні. Чашолистків від трьох до семи, частіше п'ять, зрослих у віночок з черепитчастими або згорнутими лопатями, рідко пелюстки відсутні. Тичинок стільки, скільки їх пелюсток, або їх вдвічі більше, рідко лише дві або до 20, вони прикріплені до квітколожа або рідше до трубки віночка. Гінецей ценокарпний (морфологічно паракарпний), з двома-десятьма карpelами, звичайно з простим стовпчиком; зав'язь верхня або нижня, одно-, десятигнізда, з численними , рідше кількома або одним насіннім зачатком у коленому гнізді. Плоди — коробочки, ягоди або кістянки. За рядом ознак (анatomією деревини, будовою насіння тощо) порядок *Ericales* близький до порядків *Actinidiales* і *Theales*, з якими він тісно зв'язаний через одну з своїх найпримітивніших родин.





## **Порядок Первоцвіті (*Primulales*)**

Об'єднує чотири родини, близько 65 родів та понад 2110 видів. Дерева, чагарники і трави з черговими або рідше супротивними чи кільчастими простими і звичайно цілісними або зубчастими листками, без прилистків. Квітки в різноманітних суцвіттях або рідше поодинокі, маточково-тичинкові, рідше маточкові і тичинкові, звичайно актиноморфні, переважно п'ятичленні. Чашолистки вільні або частіше більш чи менш зрослі. Віночок зрослопелюстковий, дуже рідко вільнопелюстковий або взагалі відсутній. Тичинок звичайно стільки ж, скільки пелюсток, вони супротивні до пелюсток, переважно прикріплені до трубки віночка або рідко майже вільні. У *Theophrastaceae* і деяких *Primulaceae*, крім внутрішнього кола протипелюсткових фертильних тичинок, наявне також зовнішнє коло пелюстковидних, схожих на залозки, або лусковидних стамінодіїв, супротивних до чашолистків. Гінецей зрослий з п'яти плодолистків, лізикарпний (очевидно, похідний від лізикарпного) з простим або лопатевим стовпчиком, часто з головчастою приймочкою. Зав'язь верхня, рідко напівнижня чи нижня, переважно з численними насінними зачатками. Плоди — ягоди, кістянки або коробочки. Порядок *Primulales* має багато спільного з *Ericales*; близькість до *Ericaceae*, а також до *Actinidiaceae* і *Theaceae* підтверджується серологічними даними. В Україні порядок представлений лише однією родиною Первоцвіті





## Порядок Фіалкоцвіті (*Violales*)

Включає 14 родин, близько 155 родів та понад 3100 видів. Дерева, чагарники і трави з черговими або рідше супротивними цільними або лопатевими листками, з прилистками, рідше — без них. квітки переважно в різного роду суцвіттях, маточково-тичинкові або рідше маточкові і тичинкові, актиноморфні іноді більш чи менш зигоморфні, циклічні, рідко із спіральною оцвітиною, переважно п'ятирічені, рідко безпелюсткові. Чашолистків від трьох до шести, рідко до 15, найчастіше — п'ять, вони вільні або більш чи менш зрослі, звичайно черепитчасті. Пелюсток 6-3, рідко до 15, частіше 5.. вільних або біля основи коротко зрослих, переважно черепчастих.' Кількість тичинок переважно дорівнює кількості пелюсток, рідко їх більше чи менше, вільних або більш чи менш зрослих; піляки звичайно відкриваються поздовжньо. Гінецей паракарпний, з двох-п'яти або десяти; але частіше трьох карpel, зі стилодіями, вільними або більш чи менш зрослими; зав'язь верхня, рідко напівнижня або нижня, з численними або рідше кількома чи лише одним-двома насінніми зачатками на парієтальних плацентах. Плоди різного типу, переважно коробочки або ягоди. *Violales* дуже близькі до *Theales* мають спільне з ними походження від предків типу сучасних *Dilleniaceae*.





## **Порядок Тамариксоцвіті (*Tamaricales*)**

Дерева, чагарники або рідше трави з черговими (*Tamaricaceae*) або супротивними листками, звичайно дрібними, ерикоїдними лусковидними; прилистки відсутні. Квітки звичайно дрібні, поодинокі або частіше зібрани в суцвіття, звичайно маточково-тичинкові, актиноморфні, з подвійною оцвітиною. Чашолистків від чотирьох до семи, вони вільні або рідше більш чи менш зрослі, черепитчасті або стулчасті. Пелюсток стільки ж, як і чашолистків, вони вільні, черепитчасті. Тичинок від чотирьох до десяти (рідко 12-14), вільні або зрослі біля основи; піляки відкриваються поздовжньо. Гінецей паракарпний, з двох-п'яти (частіше трьох-чотирьох) карпел, з вільними або зрослими .біля основи стилодіями (*Tamaricaceae*) або зрослими в стовпчик. У *Miricaria* приймочка сидяча; зав'язь верхня, звичайно з численними насінніми зачатками. Плоди — коробочки. Ймовірно *Tamaricales* походять від *Violales*, а за будовою насіння вони близькі до *Salicaceae*.



## Порядок Вербоцвіті (Salicales)

Дерева або чагарники, іноді чагарнички (деякі арктичні та субарктичні види *Salix*) з черговими цілісними або лопатевидними листками, з прилистками, які часто опадають. Квітки в густих прямостоячих (майже всі види *Salix*) або висячих (*Populus i Chosenia*) маточкових та тичинкових сережках (колосках чи рідше китицях з дуже короткими квітконіжками), розміщені в пазуках брактей, але без брактеолей, дводомні, безпелюсткові. В роду *Populus* чашечка має вигляд пластинки в тичинковій квітці і блюдцеподібного чи пліскоподібного утвору в маточковій. У *Salix* вона представлена однією або двома (рідше трьома-п'ятьма) дрібними нектарними залозками, а в *Chosenia* відсутні навіть залозки і лише іноді маточкові квітки мають дві маленьки бічні залозки. Тичинок у *Populus* (4) 6-40 (рідко до 70), у *Salix* — одна-дві, рідко три або п'ять (до 12), а в *Chosenia* — від трьох до шести; нитки вільні (*Populus i* частина видів *Salix*) або зрослі тільки основами, дуже рідко по всій довжині. Гінецей паракарпний, звичайно з двох поперечно розміщених карпел, рідко з трьох-четирьох (деякі види *Populus*), з двома-четирма звичайно сидячими приймочками; приймочки кари пальні (розміщені над спинкою кожної карпели), як у *Populus* і багатотичинкових видів *Salix*, або ж комісуральні (розміщені над лінією зростання сусідніх карпел), як у більшості видів *Salix*. Зав'язь верхня, сидяча або на короткій чи рідко довгій ніжці з численними (*Populus*) або двом а-десятьма насінніми зачатками, в *Salix* дуже рідко лише з одним насіннім зачатком. Плоди — дво-, чотиристулчасті коробочки. Насіння дрібне, з базальним пучком волосків. Порядок *Salicales* дуже близький до *Violales*. Зв'язки настільки тісні, що родина *Salicaceae* без особливих труднощів могла б бути включеною до порядку *Violales*. Деякі автори виводять *Salicaceae* від *Tamagisaceae* або від їхніх ближчих предків.





## **Порядок Гарбузоцвіті (*Cucurbitales*)**

Багаторічні або рідше однорічні виткі чи сланкі трави, рідко напівчагарники та чагарники, і лише рід *Dendrosicias* представлений невеликими деревами з м'яким і соковитим стеблом. Трав'янисті види звичайно мають вусики (часто розгалужені), які являють собою видозмінені пагони; іноді вусики перетворені на колючки або взагалі відсутні. Листки чергові, звичайно пальчасто- або (рідше) перистолопатеві чи роздільні, без прилистків. Квітки в пазушних суцвіттях, іноді редукованих до однієї квітки, маточкові і тичинкові (однодомні або дводомні), дуже рідко маточково-тичинкові, звичайно актиноморфні, найчастіше п'ятичленні. Оцвітина разом з основами тичинкових ниток утворює квіткову трубку, прирослу до зав'язі. Чашечка три-, п'яти- або шестилопатева, лопаті черепитчасті чи відкриті. Віночок більш або менш глибоко три-, п'яти- або шестилопатевий, стулчастий. Тичинок від трьох до п'яти, які чергаються з лопатями віночка, дуже рідко дві, вони прикріплені до гіпантія або рідко навколо верхівки зав'язі, між собою більш або менш вільні і часто різним чином зрослі. Гінецей паракарпний, з трьох (чотирьох-п'яти) карпел, але в окремих родів з однієї карпели, (ймовірно, в результаті редукції). Стилодії звичайно більш чи менш зрослі в стовпчик, приймочки комісуральні. Зав'язь нижня, дуже рідко напівнижня, здебільшого майже повністю заповнена розрослимі-ірлатгвнтами, іноді в результаті зростання плацент у центрі порожнини стає тригніздою, звичайно з численними насіннimi зачатками і лише рідко з одним насіннiм зачатком. Плоди — ягоди або гарбузини, соковитi або сухi коробочки, або шкірястi і нерозкривнi; у представникiв деяких родiв вiдкриваються кришечкою або трьома загорнутими назовнi стулками; зрiдка плоди — коробочки. Насiння звичайно численне, з великими плоскими сiм'ядолями. Парiєтальне (пристiнне) прикрiплення насiнних зачаткiв у зав'язi i двопокривнiсть. їх дали пiдставу деяким ботанiкам-систематикам вiднести порядок Гарбузоцвiтi до колишнього порядку Пристiннонасiннi (*Parietales*). Проте морфологiя вегетативних органiв (зокрема, вушок) i будова квiтки свiдчать про спорiдненiсть їх з *Passifloraceae*. До Гарбузоцвiтих належить тiльки одна родина Гарбузових





**Порядок  
*Datiscales*)**

**Бегонієцвіті**

**(*Begoniales*,**



Об'єднує 2 родини, 8 родів та близько 1000 видів. Трави, або рідше — чагарники і дерева з черговими простими або іноді складними листками з прилистками (*Begoniaceae*) або без них. Квітки в пазушних або рідше термінальних суцвіттях, звичайно маточкові і тичинкові, одно- або дводомні, більш чи менш актиноморфні або зигоморфні, з подвійною оцвітиною чи безпелюсткові. Тичинки звичайно численні, вони вільні, іноді більш або менш зрослі; піляки розкриваються поздовжньо, рідко — порами. Гінецей з трьох-восьми карpel, паракарпний, з вільними або рідше зрослими біля основи стилодіями; зав'язь нижня, рідко — напівнижня, одно- або багатогнізда (у разі зростання інтрузивних плацент), (більшість *Begoniaceae*) з численними насінними зачатками. Плід — коробочка, рідше — ягода. Порядок *Begoniales* відносно найбільш близький до *Cucurbitales*.



## **Порядок Каперцевоцвіті (Capparales)**

Включає 4 родини, близько 430 родів та біля 4130 видів. Дерева, чагарники або частіше трави. Листки чергові або зрідка супротивні, прості або рідше складні, звичайно без прилистків. Квітки здебільшого зібрани в термінальні китиці, іноді у волоті або змішані волоті; маточково-тичинкові або іноді маточкові і тичинкові, актиноморфні чи зигоморфні, переважно з подвійною оцвітиною, іноді безпелюсткові, з нектарниками. Оцвітина чотиричленна або рідше п'ятирічленна, члени оцвітини вільні. Тичинок дві-четири або багато, які в більшості виникають з обмеженої кількості (найчастіше чотирьох) примордіїв. У деяких *Cappagaceae* і більшості *Brassicaceae* два медіальних примордії розщеплюються, і кількість тичинок через це досягає шести. В інніх випадках одноразово або багаторазово розгалужуються всі чотири примордії, і андроцей виявляється утвореним з восьми або багатьох тичинок, причому в останньому випадку частина їх перетворюється на стамінодії. В деяких *Brassicaceae* лише дві тичинки. Гінецей паракарпний, складений з двох, рідше трьох-шести (12) карпел, із зрослими стилодіями. Зав'язь верхня, з кількома або численними насінними зачатками, іноді лише одним насіннім зачатком. Плоди — коробочки, стручки та стручечки або ягоди, іноді горіхи або кістянки. Порядок *Capparales* походить від примітивних *Violales*, найімовірніше за все від примітивних *Flacourtiaceae*. Цей порядок поділяється на чотири родини, 420-430 родів та близько 41 30 видів. Крім загальновідомої у нас родини Капустяні, слід назвати ще родини Каперцеві та Резедові, що теж представлені в Україні.





## **Порядок Чистоцвіті (*Cistales, Bixales*)**

Невеликий порядок, об'єднує 3 родини, 11- родів і близько 240 видів. Дерева, чагарники, напівчагарники і трави з черговими або супротивними (більшість *Cistaceae*) простими цілісними або пальчасто-лопатевими листками, з прилистками або без прилистків. Квітки у різноманітних суцвіттях або, рідше, поодинокі (деякі *Cistaceae*), маточково-тичинкові, актиноморфні або зрідка злегка зигоморфні (деякі *Cochlospermaceae*): Чашолистків п'ять або рідше три (деякі *Cistaceae*), вільних, черепитчастих або скручених (*Cistaceae*), опадаючих або таких, що залишаються при плодах (*Cistaceae*). Пелюсток 5 рідко 3 (рід *Lechea* з *Cistaceae*), вільних, черепитчастих або скручених. Тичинки багаточисельні або рідко 6-3 (деякі *Cistaceae*), вільні, розвиваються в центрифугальній послідовності. Гінецей паракарпний, з 5-3 або лише 2 карпел (*Cistaceae*), зі стилодіями, які більш-менш зрослі в стовпчик. Зав'язь одногнізда або в результаті зростання інtrузивних плацент іноді 3- або 5-10-гнізда з багатьма насіннimi зачатками на кожній плаценті, рідко (у деяких *Cistaceae*) з 2 або 1 насінним зачатком. Плоди — локуліцидні коробочки. До порядку відносять три родини, які найчастіше включали до порядку *Violales*, а деякі дослідники перенесли їх до порядку *Malvales*, що підтверджується і анатомією насіння. Але А.Л.Тахтаджян вважає найбільш правильним розглядати ці три родини в межах самостійного порядку Чистоцвіті.





## **Порядок Мальвоцвіті (*Malvales*)**

Дерева, чагарники і трави з черговими або (рідко) супротивними простими чи (рідше) складними листками, звичайно з прилистками. Молоді частини рослин часто вкриті численними зірчастими волосками або лусочками, а в паренхімних клітинах наявні слизові клітини, порожнини або канали. Квітки зібрани в різні цимозні суцвіття, але нерідко поодинокі, переважно маточково-тичинкові, звичайно актиноморфні, здебільшого п'ятичленні, звичайно з подвійною оцвітиною. Чашилистки вільні або зрослі, стулчасті. Пелюстки вільні (зрослопелюстковий віночок відмічений тільки в представників новокаледонських родів), у бутоні часто скручені. Тичинки, як правило, в двох колах, причому члени зовнішнього кола часто відсутні або перетворилися на стамінодії, а членів внутрішнього кола звичайно більше, вони зрослися нитками в колонку навколо гінеця або ж в кілька пучків. Гінецей ценокарпний, очевидно, морфологічно паракарпний, але звичайно вторинносинкарпний, складається з багатьох карpel. Зав'язь верхня, здебільшого багатогнізда, з одним або багатьма насіннями зачатками в кожному гнізді чи на кожній плаценті. Плоди звичайно сухі, розкривні або нерозкривні, іноді кістянковидні чи ягоди. Порядок *Malvales* близький до порядку *Bixales*, який в системі розміщується безпосередньо перед ним. Порядок об'єднує 11 родин, що дуже відрізняються за об'ємом (від одного-кількох до 1600 видів), які включають біля 270 родів та близько 4290 видів.





## **Порядок Кропивоцвіті (*Urticales*)**

Дерева, чагарники і трави, здебільшого з черговими і завжди простими листками, звичайно з прилистками, які часто зростаються і утворюють ковпачки. Для багатьох *Urticales* характерна наявність цистолітів. Дуже часто нечисленні молочники. Квітки зібрани в цимозні суцвіття іноді дуже складної будови, рідко поодинокі, циклічні, безпелюсткові, з маленькою чашечкою, переважно двочленні, рідше три-, п'ятичленні, маточкові і тичинкові, інколи маточково-тичинкові. Тичинки протиставлені чашолисткам, найчастіше їх стільки, скільки й чашолистків, зрідка їх більше. Гінецей псевдомономерний, з двох карпел; зав'язь верхня або нижня, звичайно одногнізда. Плоди різного типу, в деяких представників утворюють складні і спеціалізовані супліддя.

Характерними ознаками для цього порядку є одно- або безпокривність квіток, халазогамія, анемофілія тощо. Тепер систематики вважають ці риси не первинними, примітивними, а вторинними. Кропивоцвіті зближують нині не букоцвітими, а з мальтовими та липовими. Основним аргументом проти зближення з букоцвітими є те, що в останніх зав'язь нижня, а в кропивоцвітих найчастіше верхня. Порядок *Urticales* об'єднує п'ять подібних між собою родин (124 роди та понад 2650 видів).





## **Порядок Молочаєцвіті (*Euphorbiales*)**

Дерева, чагарники або (рідше) трави, часто із соком білого кольору, що нагадує молоко, або забарвленим. Листки вичайно чергові, прості або рідше складні, з перистим або пальчастим жилкуванням, переважно з прилистками. Квітки ібрані в суцвіття різних типів, маточкові і тичинкові, звичайно актиноморфні, з подвійною оцвітиною або часто «пелюсткові», нерідко зовсім без оцвітини. Оцвітина п'ятироздільна, рідко три- або чотирироздільна. Чашолистки і пелюстки звичайно вільні. Тичинок п'ять, може бути багато або, навпаки, одна. Вони вільні або різним чином і різною мірою зрослі, в родини *Dichopetalaceae* іноді прирослі нитками до віночка. В багатотичинкових квітках звичайно розвинутий інтрастамінальний диск. Маточкові квітки із стамінодіями (вільними біля основи чи зрослими) або без них. Гінецей синкарпний, похідний від паракарпного, дуже рідко псевдомономерний, звичайно складається з трьох, рідко двох або чотирьох, іноді багатьох карpel; зав'язь звичайно верхня, тригиізда, рідко дво-, чотири або багатогнізда, з одним-двома повислими насіннями зачатками в кожному гнізді. Плоди різних типів, але в більшості —коробочки. За рядом ознак примітивні представники молочаєцвітих виявляють зв'язок з Мальвоцвітими, особливо з родиною Стеркулієвих, а також з Фіалковими. Припускають, що молочаєцвіті виникли від якоїсь давньої групи, проміжної між фіалкоцвітими і мальвоцвітими. Порядок охоплює чотири родини і п'ять підродин, 308 родів і біля 700 видів. В Україні представлена лише одна родина.





## Порядок Тимелієцвіті (*Thymeliales*)

Чагарники або рідше дерева, рідко напівчагарники або трави. Листки чергові або супротивні, прості, цілісні, цілокраї, перистонервні, без прилистків або тільки зrudиментарними прилистками, біля основи членованими. Квітки в різноманітних рацемозних суцвіттях або іноді поодинокі, маточковотичинкові або іноді маточкові і тичинкові, актиноморфні або рідко зигоморфні, 4-5-членні, рідко 6- або 3-членні. Чашолистки зрослися в чашеподібну, дзвоникоподібну або циліндричну трубку, рідко майже вільні. В зіві чашечки або рідко трохи нижче розміщені вільні або зрослі один з одним і звичайно більш чи менш редуковані пелюстки, які чергуються з лопатями чашечки або їх вдвічі більше і вони розміщені попарно супротивно лопатям чашечки; іноді пелюсток багато і їх розміщення не пов'язане з чашолистками; пелюстки переважно дрібні і лусковидні, м'ясисті або перетинчасті, іноді зрослі в кільце; часто вони зовсім відсутні. Деякі дослідники вважають, що це не пелюстки, а особливі вирости на трубці чашечки. Тичинок однакова кількість з чашолистками і супротивних їм або частіше вдвічі більше, рідко тичинок менше (до 2), іноді їх багато. Нитки тичинок короткі або навіть майже відсутні, повністю чи частково прикріплені до квіткової трубки під пелюстками. Гінецей вторинносинкарпний (морфологічно паракарпний), із 2-12 карpel; стовпчик довгий і нитковидний, короткий або відсутній; приймочка голівчаста або інших типів; зав'язь верхня, 2-5 (12)- гнізда або частіше 1-гнізда з 1 висячим насіннім зачатком в кожному гнізді. Плоди — коробочки або частіше нерозкривні, сухі або соковиті, ягодоподібні або кістянкоподібні. *Thymeliales* без сумніву споріднені з порядком *Euphorbiales* і мають спільне з ним походження. Вони мають також багато спільного з *Malvales*, зокрема з *Tiliaceae*. Безперечно, *Thymeliaceae* виявляють подвійний зв'язок як з *Euphorbiales*, так і з *Malvales*, проте вся сукупність ознак говорить про значну більшу близькість до *Euphorbiales*, ніж до *Malvales*. Порядок монотипний.





# Щиро дякую за увагу!

